

中國古典醫籍新解叢書

外科正宗新解

朱士宗 編著

NRICM

國立中國醫藥研究所

中國古典醫籍新解叢書

外科正宗新解

朱士宗 編著

NRICM

國立中國醫藥研究所

中國古典醫籍新解叢書

徐之才



編纂緣起

中醫典籍，浩如瀚海，昔時太醫院為培育醫學學生，考試醫官，每指定若干書籍，作為必修範本，諸如內經、難經、傷寒論、金匱要略、本草經、甲乙經、脈經等書，莫不視為經典，奉為圭臬，歷代相襲，無不皆然。即今考選部規定中醫師考試必試書目，仍舊大都採用，海內外中醫學府，亦列為必修課程。

究竟上述諸書何以被人如此重視，誠以內經為我國醫學之祖，分為靈樞與素問兩部，其內容包括臟象生理、脈學診法、病機治則、藥理方劑、針灸導引，以及運氣攝生，可謂包羅萬象。難經闡解內經，創論命門、原氣、三焦功能，實補內經之未備，發內經之所未發，尤強調獨取寸口為切脈之標準部位，為後世所宗，是以內難二經，同為中國醫學理論之基礎。張仲景著傷寒論與金匱要略二書，前者總論外感，後者概論雜病，詳分六經辨證，善用八法治則，為後世辨證論治之法奠定基礎。神農本草經為最早之藥學專書，以四氣五味概括藥性及功能，以有毒、無毒分別藥物為上中下三品，倡七情合和，君臣佐使之說，為後世藥物學及方劑學發展之基礎。皇甫謐甲乙經乃撰用靈樞、素問及明堂孔穴針灸治要，將三書所之經絡腧穴，針灸治療，分門別類，整編成書，是為針灸之專著。王叔和脈經乃歸納內經、難經、傷寒、金匱諸書中平脈辨脈之法，定出二十四種脈象，是為脈學之專書。以上八書，業經歷代醫家公認，為傳統之中醫典籍，不論家傳師授，咸賴薪火遞傳，可見其對後世醫學之影響，既深且鉅。

唯上列諸書，均係出自晉朝以前，上古文字，詞意深奧，言簡意赅，故向稱難讀、難解、難用，雖歷代醫家已有不少註解或整編，以利後學，然掛漏闕疑，爭議仍多。況時代進步，日新月異，必須隨時增刪補正，始克趨於完備，是以整理中醫典籍之工作，實屬刻不容緩之事。

中國醫藥學院董事長陳資政立夫先生，一向熱心提倡中醫學術，不遺餘力，於民國七十八年，乃商請中國醫藥學院院長陳梅生博士，及國立中國醫藥研究所所長陳介甫教授，擬訂工作計劃，成立編纂委員會總理其事，敦聘對中醫典籍研究有素之專家學者二十人為編纂委員，濟濟一堂，共襄盛舉，復以中醫典籍除上述八種巨著外，唐宋以後又有不少名著，詳分內、外、婦、幼、針灸各科，同為習醫者不可不讀，遂遴選其精要者，連前共計十五種，列為首期整編對象，並定書名及主編人如下：

| | |
|-------------|---------|
| 二、難經新解 | (黃維三主編) |
| 三、金匱要略新解 | (何東燦主編) |
| 四、甲乙經新解 | (梅 翔主編) |
| 五、脈經新解 | (陳欽銘主編) |
| 六、巢氏病源新解 | (曾德祥主編) |
| 七、金元四大家著述新解 | (陳紺藝主編) |
| 八、針灸大成新解 | (林昭庚主編) |
| 九、溫熱病論述新解 | (馬光亞主編) |
| 十、外科正宗新解 | (朱士宗主編) |
| 十一、濟陰綱目新解 | (陳榮洲主編) |
| 十二、小兒稟證直訣新解 | (魏開瑜主編) |

進行整編中醫典籍工作之步驟與方法，採分工合作制，每書聘請主編一人，助理編纂一至二人，分別擬訂工作進度，定期完成初稿後，再邀請有關專家共同審查定稿，為求體例格式劃一，並商訂編輯凡例，以資遵循，其內容分為提要、原文、考正、注釋、語譯、深究、按語、討論等項，附錄作者傳略，有關本書著作，以及本書名詞索引等項。

整編工作自民國七十八年九月開始，預期於民國八十一年八月編纂完竣，書成後堪供中醫學院及自修中醫之學生，充作各科教材，可供考選部列為中醫師考試之必讀書籍，亦可作為開業中醫師於臨症診療時之重要參考書，或為有志深造者，當作攻讀研究之階梯，承先啓後，溫故知新，實踐發揚傳統中醫學術者，其在斯乎。是役也參與工作之編纂委員，多係開業醫師，每日門診忙碌，僅能於診餘執筆，焚膏繼晷，備嘗辛勞，尤感參考資料，難以搜集齊全，復以稿成之後，校對時間匆促，以致舛誤疏漏之處，在所難免，尚乞方家不吝指正，以匡不逮，是所企禱。

整理中醫典籍編纂委員會

民國八十一年五月廿四日

目 錄

卷一

| | |
|---------------|----|
| 癰疽原委論第一 | 1 |
| 癰疽治法總論第二 | 15 |
| 癰疽陽症歌第三 | 35 |
| 癰疽陰症歌第四 | 35 |
| 癰疽半陽半陰症歌第五 | 37 |
| 癰疽五善歌第六 | 37 |
| 癰疽七惡歌第七 | 37 |
| 治病則例歌第八 | 39 |
| 癰疽炙法并禁炙瘡穴第九 | 40 |
| 論病生死法第十 | 41 |
| 察形色順逆十一 | 43 |
| 病有三因受病主治不同論十二 | 43 |
| 調理須知十三 | 44 |
| 雜忌須知十四 | 46 |

卷二

| | |
|---------|----|
| 瘡瘍看法十五 | 47 |
| 腫瘍治法十六 | 47 |
| 腫瘍主治方十七 | 47 |
| 潰瘍治法十八 | 58 |
| 潰瘍主治方十九 | 59 |

卷三

| | |
|---------|----|
| 癰疽諸名歌二十 | 63 |
| 腦疽二十一 | 64 |

卷四

| | |
|-------|----|
| 發背二十二 | 71 |
| 疔瘡二十三 | 74 |
| 脫疽二十四 | 81 |

卷五

| | |
|-------|----|
| 瘰疬二十五 | 87 |
| 癰疽二十六 | 95 |

卷六

| | |
|-------|-----|
| 咽喉二十七 | 99 |
| 時毒二十八 | 104 |
| 瘻瘤二十九 | 107 |
| 肺癰三十 | 112 |

卷七

| | |
|--------|-----|
| 流注三十一 | 119 |
| 乳癰三十二 | 123 |
| 附骨疽三十三 | 127 |

卷八

| | |
|---------|-----|
| 腸癰三十四 | 135 |
| 臘毒三十五 | 138 |
| 痔瘡三十六 | 140 |
| 下疳三十七 | 146 |
| 魚口便毒三十八 | 149 |

卷九

| | |
|-------|-----|
| 囊癰三十九 | 153 |
|-------|-----|

| | |
|--------|-----|
| 懸癰四十 | 156 |
| 脣癰四十一 | 158 |
| 楊梅瘡四十二 | 159 |
| 結毒四十三 | 163 |
| 多骨疽四十四 | 166 |
| 陰瘡四十五 | 168 |

卷十

| | |
|-----------|-----|
| 傷寒發頤四十六 | 173 |
| 癰發四十七 | 173 |
| 癰疽四十八 | 174 |
| 小腹癰四十九 | 174 |
| 鶴口疽五十 | 175 |
| 龍泉疽虎鬚毒五十一 | 175 |
| 石榴疽五十二 | 176 |
| 穿踝疽五十三 | 177 |
| 大麻風五十四 | 177 |
| 翻花瘡五十五 | 179 |
| 腋癰五十六 | 180 |
| 脣癰五十七 | 180 |
| 鼻痔五十八 | 181 |
| 骨槽風五十九 | 182 |
| 紫白癥風六十 | 183 |
| 齒病六十一 | 184 |
| 腦漏六十二 | 186 |
| 破傷風六十三 | 187 |
| 跌撲六十四 | 188 |
| 金瘡六十五 | 189 |
| 杖瘡六十六 | 189 |
| 竹木刺六十七 | 190 |
| 湯潑火燒六十八 | 190 |
| 甲疽六十九 | 192 |

| | |
|---------|-----|
| 繭唇七十 | 192 |
| 痞癰七十一 | 193 |
| 天蛇毒七十二 | 194 |
| 頭痛七十三 | 194 |
| 合谷毒七十四 | 195 |
| 鼻出血七十五 | 196 |
| 牙縫出血七十六 | 196 |
| 血箭血痣七十七 | 197 |

卷十一

| | |
|------------|-----|
| 鵝掌風七十八 | 199 |
| 腎囊風七十九 | 199 |
| 疥瘡八十 | 200 |
| 臘瘡八十一 | 201 |
| 血風瘡八十二 | 203 |
| 頑癬八十三 | 203 |
| 膿窠瘡八十四 | 204 |
| 火丹八十五 | 205 |
| 天泡八十六 | 206 |
| 肺風粉刺酒 鼻八十七 | 207 |
| 雀斑八十八 | 208 |
| 汗斑八十九 | 208 |
| 油風九十 | 209 |
| 白屑風九十一 | 209 |
| 耳病九十二 | 210 |
| 漆瘡九十三 | 211 |
| 痤瘡瘡九十四 | 211 |
| 痄癰九十五 | 212 |
| 痰包九十六 | 213 |
| 癩風九十七 | 213 |
| 濕腫九十八 | 214 |
| 女人面生黧黑斑九十九 | 214 |

| | | | |
|------------|-----|----------------|-----|
| 鋸釦風一百 | 215 | 陰蝨一百三十 | 232 |
| 枯筋箭一百一 | 215 | 葡萄疫一百三十一 | 233 |
| 婦人腳丫作癢一百二 | 216 | 咬傷一百三十二 | 234 |
| 手足破裂一百三 | 216 | 瘋犬傷一百三十三 | 234 |
| 眼丹一百四 | 216 | 惡蟲叮咬一百三十四 | 235 |
| 眼胞菌毒一百五 | 217 | 百蟲入耳一百三十五 | 237 |
| 黑子一百六 | 218 | 誤吞針鐵，骨哽咽喉一百三十六 | |
| (狐)體氣一百七 | 218 | | 237 |
| 白禿瘡一百八 | 219 | 人面瘡一百三十七 | 238 |
| 奶癬一百九 | 219 | 陰毒一百三十八 | 238 |
| 蟻拱頭一百十 | 220 | 失榮症一百三十九 | 239 |
| 小兒遺毒爛斑一百十一 | 221 | 中砒毒一百四十 | 240 |
| 蠟蛇串一百十二 | 221 | 落下頷擎法一百四十一 | 240 |
| 小兒痘風瘡一百十三 | 222 | 救自刎斷喉法一百四十二 | 241 |
| 小兒赤遊丹一百十四 | 222 | 試知百病死生法一百四十三 | 242 |
| 走馬瘖一百十五 | 224 | 仙方活命飲今古不同論第一百四 | |
| 重舌一百十六 | 225 | 十四 | 242 |
| 胎瘤一百十七 | 226 | | |
| 鵝口瘡一百十八 | 226 | | |
| 痘癰一百十九 | 227 | | |
| 痘疔一百二十 | 227 | | |
| 黃水瘡一百二十一 | 228 | | |
| 卷十二 | | | |
| 大人口破一百二十二 | 229 | 方劑 | |
| 脣風一百二十三 | 229 | 一劑 | 243 |
| 臭田螺一百二十四 | 230 | 二劑 | 243 |
| 牛程蹠一百二十五 | 230 | 三劑 | 244 |
| 蟻螂蛙一百二十六 | 231 | 四劑 | 244 |
| 田螺泡一百二十七 | 231 | 五劑 | 245 |
| 皴痛一百二十八 | 232 | 六劑 | 247 |
| 凍風一百二十九 | 232 | 七劑 | 248 |
| | | 八劑 | 249 |
| | | 九劑 | 250 |
| | | 十劑 | 251 |
| | | 十一劑 | 253 |
| | | 十二劑 | 255 |
| | | 十三劑 | 258 |

| | |
|------|-----|
| 十四割 | 259 |
| 十五割 | 260 |
| 十六割 | 260 |
| 十七割 | 260 |
| 十八割 | 261 |
| 十九割 | 261 |
| 二十割 | 261 |
| 二十一割 | 262 |

序

吾國醫藥於古代治病，向以祝由與砭石解除民瘼，自黃帝與臣岐伯，君臣問答，始有內經，繼之經由歷代研進，各科名醫著作不斷問世，確保人民健康，並解除疾苦，已有五千年歷史，謂之「國粹」、「國寶」，名實相符。

惜吾國醫藥命運不佳，自清代遭八國聯軍攻打北京，民衆見洋槍洋砲，比國有槍砲可畏，始有崇外心理；自與歐美通商，西藥進口，國人感覺比中藥省時好服，中藥煎熬費時，又多苦難下嚥，故將其治病效果置諸腦後，加上政府衛生機關執政者多係西醫，致傳統中醫藥前途多艱。

民國十八年衛生部要消滅中醫藥，經全國中醫師齊起反抗始而保留；民國七十七年衛生署指責中醫不科學，要取消中醫學系，改為中醫研究所，又以密件建議教育部，限制中國醫藥學院招收中醫學系的名額，並建議考選部停辦中醫師特種考試（立法院公報七十六卷四十八期刊載），其消滅中醫藥之用心，尤過於前而無不及，中醫藥曾面臨斷薪滅火之境地。所幸美國前總統尼克森訪問中國大陸，驚見醫師剖腹用針刺麻醉治療，病人談笑自如、毫無痛苦，復回美宣揚，使得中國傳統醫學又得以在世界上大放光明。

根據民國七十六年的統計，美國有十五所針灸大學，亞歐美澳等各大州亦均設有中醫學院及醫院，而目前韓國約有九所中醫大學，大陸每省至少有一所中醫學院，世界各國對中國醫藥之重視，不言可喻矣。

國立中國醫藥研究所為發揚傳統醫藥，特別聯絡中國醫藥學院，發起組織中國醫藥典籍委員會，將各科典籍加以整理發揚，「外科正宗新解」一書，聘由朱士宗委員編輯；朱委員係江蘇省籍名醫，家學淵源，現任中國醫藥學院外科教授，關於外科病因病狀，先後變化及處方用藥等，無不瞭如指掌，又於病患疼痛症狀嚴重時，特別提及可用西藥協助鎮痛，可謂是中西醫一元化之正途；朱委員將外科正宗去蕪存精，將深奧詞意化為通俗易解，外科正宗一書因而得以更上一層樓。

外科診病貴在審查詳盡，細查內因七情，外因六淫；外瘍之發生必先受於內，而後表於外，醫者能熟方識藥，性味分清，熟讀此書於患者解除痛苦，必能桴鼓相應。

中國醫藥典籍整編委員會審議委員

王彥

自序

中國傳統醫藥博大精深，歷代所傳典藉浩瀚，加諸文字艱澀，不僅一般人士難窺堂奧，欲從事於研究者亦難入門。

私立中國醫藥學院董事長陳公立夫，院長陳公梅生，國立中國醫藥研究所所長陳公介甫諸位先生有鑑於此，創議將中國醫藥著述擇優整理，建立系統以嘉惠後學，擬自古書今注著手，每科擇一著作，以現代語文加以注釋，務求去蕪存菁，深入淺出，使一般讀者能增廣醫藥知識，有志研習者並可依循入門。余從事中醫外科教學經年，諸公囑咐負責外科部份，因有同感，不揣所能，欣然從命。

中醫外科古籍已知約六十餘種，初習必讀且較實用者，有外科證治全生集，瘍科心得集以及醫宗金鑑外科心法要訣等。各書自有其特點，成書年代雖晚，然或立論偏頗，或內容涵蓋未廣及繁雜瑣碎，皆不若外科正宗完善，其書論治精微，內外並重，刀針兼施，不偏執一法，乃實際臨床經驗心法，為修習外科者必讀書本。書中部份治法已不合時代所需，僅保留以供參考。原著方劑未列入，按語新增者附列於後。治驗門計二十五項一百五十四例，多記述不詳，故略而未注。

余早年於上海追隨先師朱治吉先生習醫十載，宗於正宗一派，涵泳其中五十餘年，臨診運用，每每收效，深知其參考價值。寫作中蒙二叔朱仁康慨贈所主編之中醫外科學一冊，蓋其脈絡同出一宗，參證良多。

平時側重臨診少涉論述，余拾筆方知學養不逮，於兩年間匆促成稿，自有疏漏之處，尚祈海內外方家，各界賢明不吝指正，付梓之前，承學棣陳豪民醫師繕寫定稿及長子朱樞醫師校訂，於此一併申謝。

民國八十二年十月 朱士宗謹識

作者小傳

陳實功字毓仁，明朝崇川（今江蘇南通）人，從父親授業、家學淵源、臨床四十餘年、復廣集前人之學說，於一六一七年著「外科正宗」，將所得經驗、家傳手法供諸於世。以外治必本於內治之旨，不偏執一法、提倡內外整體同治；刀針併用、膿成剖切、位宜偏下、以利膿血暢泄，口宜大、以防留毒生變；腐肉不脫則割、肉芽過長則剪；沖洗瘡口、換藥時要淨几明窗、注意衛生，手術計有十四種之多。內治於清熱解毒之外，尤重托裏；由於受脾胃論思想之影響，故有瘡瘍全賴脾土之說，此對瘡瘍用藥，對康復有莫大之效益，故有列證詳明、論治精微之評價。全書共集一五七論，是研習外科必修之善本。作者謙虛謹慎，每遇疑難重症輒邀衆醫會診，又重醫德，且每勸人向善，為後世所推崇。

卷一

癰疽原委論第一

【原文】

癰疽發背爲何生。好好身軀出此形。凡人處世而無疾病者。水升火降。精秘血盈也。養生篇曰。毋搖爾精。毋勞爾形。皈心靜默。可以長生。益靜則生水。動則生火。水能生萬物。火能剋萬物。故百病由火而生。其發於外者爲癰疽。瘡者壅也。爲陽。屬六腑。毒騰於外。其發暴而所患浮淺。因病原稟於陽分中。陽氣輕清而浮。浮故易腫易膿易腐易歟。不傷筋骨而易治。疽者沮也。爲陰。屬五臟。毒攻於內。其發緩。而所患深沉。因病原稟於陰分中。陰血重濁而沉。沉故不易腫易膿易腐易歟。傷筋蝕骨而難治。又年壯氣血勝毒則順。年老毒勝氣血則險。治法載於第二論中。宜詳觀之。

內被七情干臟腑。憂愁思慮難關心。七情六欲者。皆盜人元氣之賊也。喜傷心。怒傷肝。憂傷肺。思慮傷脾。悲傷於魂魄。恐傷腎。驚傷膽。是爲七情。能傾人之身命。耳聽聲音。眼觀物色。鼻聞香氣。舌貪滋味。心惟大地。意幄萬方。是爲六欲。能損人之真性。百病諸瘡。皆由於此。醫者病者。咸宜慎察。

外又六淫傷氣血。風寒暑溼火相臨。六淫者。風寒暑濕燥火也。風爲四時不正。浩蕩肅殺之氣。發而最能中人。寒乃節候不調。疾風暴雨。冰雪嚴寒所傷。或口貪生冷之物。暑因亢陽烈日。燥火流金。酷熱所逼而中。濕因坐臥久陰卑濕之地。或驟遇風雨潮氣所侵。燥爲陰虛內熱。消燥津液。不能滋潤臟腑。以致皮膚枯槁而便乾。火生於心緒煩擾。醇酒膏粱。慾事不節。此六淫者。皆從外而入。體實之人。或不能中。體虛之人。隨感即發。亦有客於臟腑經絡關節之內。積久始發者。當隨其寒熱溫涼邪正勝負而治之。

膏粱厚味多無忌。勞傷房慾致虧陰。膏粱者。醇酒肥鮮諸物也。皆不離乎厚味。厚味之物。其製法則炙燉煎炒。加以厚料濃湯。其食性則香燥甘美。雜以鹹酸辛辣。但取適口充腸。不顧消陰爍臟。兼之未飢先食。未

冷先棉。爐火圍烘。縱慾無度。猶嫌未足。服藥興陽。祇知片刻歡娛。詎識陰精虧損。故百病多起於膏粱房慾。知命者當節飲食。慎起居可也。

故將五臟多乖變。自然六腑不調勻。五臟分屬五行。相生則無病。相剋則五臟不和。而六腑不通。則九竅痰癰。而結爲瘡疽。蓋瘡疽多由臟腑乖變。關竅不得宣通而發也。治之之法。因寒邪而痛者。以溫熱散之。濕腫強痛者。滲而導之。燥搐攀痛者。滋而潤之。泄而痛者溫之。塞而痛者通之。虛而痛者補之。實而痛者瀉之。陰陽不和者調燮之。經絡閉塞者沖和之。膿脹而痛者開之。惡肉侵蝕者去之。勞而痛者逸之。損而痛者續之。凡諸治法用者詳之。

發於心上多危險。五臟相干事可明。五臟者。心肺肝脾四臟皆係於背。惟腎經一臟獨居於下。然其精華津液元氣元神。灌溉榮注於上。四臟之火。皆賴一臟之水以濟之。故五臟根本。皆係於背。背乃太陽膀胱督脈所主。太陽者。六經之首領也。督脈者。十二經絡之統脈也。所以瘡生於背。毒犯五臟。心又屬君主之位。豈容毒相犯。故多成危險難治之症。醫者不可不察。

心之已下多成順。六腑之因亦許評。凡瘡生於心之下者。除腎俞一穴外。餘皆爲緩。六腑者。足陽明胃經。手太陽小腸經。足太陽膀胱經。手厥陰心包絡經。手少陽三焦經。足少陽膽經。此六經其名屬腑。其形在下。其氣主表。其病爲瘡。故病發於五臟者爲重。生於六腑者爲輕。此表裏臟腑輕重之別也。

脾家積毒生肩背。生於肩下脊上者。乃因飲食膏梁積毒所致。高腫鮮明。根腳不過兩肩者爲順。先宜解毒護心爲主。次宜內托清心。間用蠟礬丸。護心散。防毒攻心。如腫平堅硬。漸大漸開。攻注兩肩胸項。腫而不定者危。

心經火毒對心臨。對心發者。乃心火妄動。熱極而發也。心爲主宰。周身蘊熱。流會於此。結而爲患。是爲毒剴君位。最易傷人。刑截督經。害更非淺。況此穴背脊多坑。難於起發。瘡形落陷。腫不高尖。治當大降心火。急疏蘊熱。頂用針通。隨行拔法使毒氣內外流通。各從門出。庶不內攻。保至十五日後。內無變症。得膿爲解。倘是期變症漸生。堅硬漸大。不作腫者。死在二十二朝先後。此症貴在早治。十中可保三四。

兩肩左右雙生發。肺肝積受不虛名。左搭屬肝。右搭屬肺。俱在於左右肩骨移動之處爲可治。古云左搭串右。右搭串左。俱爲難治。然余每醫

左右相串者。未嘗見其死。惟在治法得宜耳。凡患此者。先用萬靈丹發汗。疏通內外。次用清肝解鬱湯。柴胡清肝湯。氣用四君子湯。血用四物湯。潰後八珍湯。俱兼六鬱湯參治爲妥。蓋此症起於痰凝氣滯火鬱。氣血不調。所謂鬱者開之。滯者行之。如誤用解毒泄氣。及誤補誤攻之藥。必致危殆。

蓮子蜂窠防毒陷。蓮子者。突如蓮子。蜂窠者。孔似蜂窠。多生於背。與心相近。與脊中平。輕者形長高腫。或偏半背。重者形斜平塌。兩脇俱傷。瘡形雖似可畏。然危險常得奏功。老弱亦能取效。所患者非純陽之症耳。治法不外護心護膜。參以方藥活法。

腰間腎俞發難生。腎俞發者。生於兩腰內腎陷肉之間。或正中亦發。最爲險候。蓋內腎爲性命之本。藏精藏氣藏神。凡生男育女壽命短長。皆由於此。故房勞過度。氣竭精傷。真陰內消。亢陽外越則腎臟空虛。諸火諸邪。乘虛而入。致生是症。倘本臟稍有真陰制火。瘡形自可紅活。高腫爲膿。治以人參養榮湯。加山萸 五味子 黃芩 知母，及加減八味丸。以救其源。若瘡形紫，黑乾枯堅硬，不作膿者。爲真陰內敗。再無生理。必死在五十日前後也。

督脈經虛從頂發。俗名對口故相稱。對口者。生於項後。而對前口也。有偏正之不同。發於正者。屬督脈所主。發於偏者。乃太陽膀胱所司。皆起於濕熱上攻。凝結而成也。屬督脈者。瘡雖正而反爲易治。因督脈起於下而貫脊上行。故毒氣得之。反能沖突高腫使發於外。不致下流低陷。故多易治。屬膀胱者。瘡雖偏而反爲難治。因膀胱之脈起於巔頂。貫頂兩旁順下而行。乃與瘡毒交會下流。故瘡多平塌。又太陽膀胱主司寒水。爲冷爲沉。故瘡形多難起發。色難紅活。堅硬難潰。又易流注。兩肩胸項作腫十五日外者無膿。必然變黑歸陰。故多不治。俗以正爲重。以偏爲輕。未知其理故也。治以黃連消毒飲主之。餘以降火化痰。解毒清心托裏爲要。

何期耳後多生發。天疽銳毒亦非輕。生於耳後一寸三分致命之處。左爲天疽。是屬肝木。右爲銳毒。是屬肺金。皆爲險惡之候。二者皆起於積想在心。謀慮不足。致火旺而又鬱。鬱而又旺以成此疾也。故形多堅硬。頭多隱伏。未潰先黑。未膿先腐。臭穢易生。元氣易敗。不得外發。多致內攻而死。此症初起。隱微不覺。及至已覺。則毒已入內矣。如紅活高腫。易膿易腐者無妨。

又有脫疽生手足。丹房補術孽根因。脫者落也。疽多黑腐。此毒皆起於丹石補藥。房術秘法。興陽澀精。行幸不覺。藥性暴烈。或洗或嚼或噙於口。或藏臍下。霸阻精道。久戰不弱。取樂一時。恣情戲謔。毒積膿腫真陰枯灼。積禍在身。終久必發。此是根因。發者難生。多生手足。發在骨筋。初生如粟。色似棗形。漸開漸大。筋骨伶仃。烏烏黑黑。痛割傷心殘殘敗敗。污氣香人。延至踝骨。性命將傾。此非天命。自傷其身。古人有法。截割可生。其法具在。詳註後文。

漫腫難治掀腫易。總論中間法可憑。漫腫者。肉腫瘡不腫也。掀腫者。瘡肉不腫也。瘡之陰陽於此分。症之順逆於此決。凡瘡初起。理當升發。潰膿之後。不宜內消。宜用托藥。如不應者。乃毒勝氣血。死在旬日。或已發出而不腐潰。根腳堅硬。或掀而散漫者。急投托藥兼補脾胃。不應死在二旬。若已潰而色不紅活。亦不生肌收斂。瘡口暈大。腫痛不減。胃氣不回。急須峻補。不應者乃脾崩。死在月餘。諸瘡另自分門說。豈許輕干紊此呈。

【探究、按語】

火爲邪氣，水即正氣，腎爲先天之本，位在下而統水，腎水足，則邪火無從入侵，故平時應節慾節勞，以達強身卻病。

凡言外科，必先論述癰疽，凡稱癰疽，亦即代表外科，緣由是此兩種疾病發源最早，範圍最廣，早於內經成書以前，帛書五十二病方，據考由春秋戰國所留，已記載有頤癰、股癰、骨疽、肉疽等病名，其中甚多病名是內經所無。現存方書中，論述癰疽之專門著作，亦以兩晉南北朝之鬼遺方爲最早、最完備，內治已有清熱解毒，活血化瘀，尤其偏重補托等，外治已有灸法、薄貼、洗湯、煙薰、針烙排膿，腐蝕生肌等法。臨床亦認爲能掌握癰疽，其他症候，有觸類旁通之用。

以往論述癰疽都謂：發於肉脈之間，名癰，壅也，屬陽易治，發於筋骨之間名疽，阻也，屬陰難治，只僅指外癰陰疽而言，較爲狹義，不夠詳盡。

癰，其特點爲發病迅速，初起焮腫，色赤作痛，潰膿稠黃，範圍都在二三寸左右，如治療得當，初起易消，成則易潰，易斂而易治。病因大抵由於外感六淫，內傷七情，飲食不節，房勞所傷。源於火毒，由於氣滯血瘀，經絡阻隔所生，又有頭面挾風，身軀多鬱，下部偏濕之分。其治宜詳審病因，初起內消，火盛宜清，熱壅宜下，風淫于上宜疏，濕受於下宜利，行其氣血，使之條達，杜絕病源，以消爲貴，外治忌用大寒大涼之品，以免鬱遏而使氣血冰伏凝滯，及至腫高勢成釀膿時，若脈沉數無力，局部散漫，色現暗紅，痛不甚劇者，爲氣虛不能托毒外達，應宜補

托，能使移深就淺，透膿外泄，外治則以收速根盤，用調和氣血之品敷貼，若毒聚膿熟，應及時剖切引流，免使膿毒旁竄深潰，後用提膿去腐，蓋以薄貼，膿盡換用生肌長肉藥品，瘡口則自歛告愈。若潰後身熱不退，局部紅腫不消者，為正虛邪戀，宜清而補之。若遲不收歛則補氣益血，隨其變遷調治，自然平復也，但如防患部位特殊如臍癰，肛門癰等，如未能及時施治，或本元虧損者，常會造成透膜、漏管等後遺問題，又如內癰（肺癰、胃癰、肝癰、腸癰等），其證候每都不一，若不及時治療，皆可危及生命。

疽，臨床可分為陰寒為病，鬱火為病及濕火為病三種。

(一)陰寒為病者，如附骨疽、脫疽等，其發於筋骨之間，病源深沉（深在裏），且都在關節附近，初起隱隱痠楚，但覺某處或有不自在之感，漫腫色白，不紅不熱，未成難潰，已成難歛，損傷筋骨，重則不治，習稱之陰疽，即專指此等症候也。其因都屬寒邪為病，且每見氣血兩虛或脾胃陰虛者多，病程進展緩慢，因附筋著骨，初起即推之不移，早期平塌，根盤散漫，縱有潰膿，亦在數月以後，且濃水清稀，潰後不易收歛，色紫或蒼白、初起應即用溫經散寒、宣導解凝，如見寒戰高熱面紅脈數有力者，屬風熱熾甚，宜用清熱解毒，疏表通絡，若掀腫日增，疼痛不減，寒熱往來者，屬濕熱鬱滯，宜清營托毒、化濕開鬱，若面色蒼白或萎黃，唇色淡白，全身倦怠，或見心悸自汗食少者，即屬氣血兩虛，宜調補氣血、滋陰健脾，如全身及局部證狀反增不退，食少難安，疼痛日增，久不見減者屬敗症。外治，如在由寒化熱，瘡面烘熱時，可酌用如意金黃散等圍敷。

(二)鬱火為病者，如偏腦疽，發背疽等，範圍較大者又稱發，如發背、發頤等，初起瘡頭即現粟米小泡，根盤闊大，掀熱紅腫疼痛，大都伴身熱等全身症候，另向周圍擴張腐潰，小者如杯口，大者如碗盤（盆），膿頭多如蜂窩，膿水綿綿不絕，如體質單純，膿得暢泄，都可痊愈，如年高體衰，體質複雜，尤以有消渴病者，則不易釀膿，膿頭難脫，較難處理，甚者會現內陷變症。病因多為七情所傷，內傷臟腑，臟腑功能失調，致使營衛不和，氣血凝結而成。此症因起即有頭，不能消散，祇可勿使範圍擴大，托毒外達，得膿即安，膿暢即日漸痛減腫消而愈。初起局部腫塊，其形不顯，有粟粒狀膿頭，癢痛紅腫堅硬，日漸擴大，痛增身熱，此時治宜清熱解毒，化滯瀉火，約經二候左右，開始化膿，瘡頭漸腐，膿出而不暢，腫勢日大，膿頭增多，狀如蜂窩，全身症候亦增，此時改用苦寒清熱、排膿托毒，隨症調治，月餘始得膿盡而愈，如見瘡形平塌，根盤散漫，皮色紫暗，麻癢微痛，惡寒微熱，脈象細弱者屬陰液不足，宜滋陰生津，清熱解毒，嚴寒季節，若年高陽虛者，酌可溫補，半月以後尚根盤堅硬，膿水稀少，瘡陷平塌，或高熱不退，疼痛加劇，

心煩嘔吐，或現神昏瘙厥等象者，即為內陷變症，有消渴病者兼而治之。外治以拔毒消腫為主，膿盡瘡面過大者，改用生肌長肉藥。

(三)濕火為病者，如臀疽、腿疽等，範圍都在二、三寸之間，初起瘡頭如粟米膿泡，根盤局限，掀熱紅腫疼痛，大都不伴全身證狀，易潰易腐，膿盡則收斂而愈，為疽之最輕，屬純陽之症。病因都由外感風熱火邪，或濕熱蘊積而成，起即不消散，患部先起粟米膿頭，隨即高大，膿頭亦日漸增多，皮色紅潤、疼痛日益，此時宜清熱托解，和營理濕，如瘡面日大，膿出稠黃，改用托毒排膿，快者旬日慢者半月，往往膿盡之日亦即收斂之時。外以收束根盤，提膿去腐為主要治法。

內被七情干臟腑

七情是人在日常生活環境中，對客觀事務所產生之精神意識活動，一旦有劇烈之精神創傷，或長期之刺激，則會影響臟腑功能失調，抗力降低而發病，大抵過度憂思會產生氣鬱，過度煩怒會產生火鬱，外症因火者居多，氣鬱則血逆，久則亦能化火，阻於經絡，達於體表，則百病諸瘡生焉。

六欲亦不離七情，亦能影響精神意識活動。古人養生（性）有：耳不聽淫聲，眼不觀邪色，鼻不聞異味，舌不貪口腹，心安默靜，意定存真之戒。

當今社會複雜，生活緊張，競爭激烈，臨床上新病不斷在產生中，亦應注意及之。

六淫是自然界隨著節令氣候變化之六氣，太過不及均能侵害人體而生患外科疾病，人在氣交之中，體強者不致為害，體弱者則留而成病，是以外症都與季節時令有關。

風邪無微不入，如經絡受之，則由皮毛經肌肉入臟腑，口鼻受之則入胃腸或骨空肢節，如人體腠理不密，衛氣不固，邪即乘虛而入，內不得通，外不得泄，致使營衛不和，氣血運行失常，經絡阻隔，是以外科疾患由風邪所感者多。感而隨發者淺多患於膚腠，久留始發者深，都客於經絡關節之間，且常兼挾寒、濕、燥、熱之邪而發病，故有風為百病之長之稱。

寒為陰邪，易傷陽氣，外寒侵入自肌膚而腠理，不能及時煦解，陽氣不得宣通透泄，則邪入筋絡筋骨，邪愈深，陽愈虛，症亦嚴重，故寒症都見於陽虛之體，氣血循行受阻所致，由於寒邪大多深入於內，經絡阻隔，久著緩發，使正氣日虛而成大患。寒性收引（熱脹冷縮），常會影響氣血循行，又因感邪深淺不一，而有患於肌膚與筋骨之別。如寒邪久留內著，不得外解，必寒化為熱，熱則內腐成潰。

暑為熱邪，行於盛夏，具季節性，暑必傷氣，氣虛則邪易感受，其性急直，加之盛夏膚腠常開，感觸暑熱之氣即生熱瘡，又熱蒸其濕是為暑，故夏季常兼濕熱為

患，天候炎熱，空氣潮濕，汗出過多，衛表不固，抗病力減弱，則諸瘍叢生，是以夏季易患外科疾患。

濕性下趨，是以濕邪為患，在身半以下居多，濕為粘膩之邪，發病緩慢，每多纏綿反覆發作，且常與風、寒、熱邪兼挾為病。濕性停滯，常犯於經絡關節，能使活動不利，更有風、寒、濕三氣合而成患者。如外浸水濕，長期冷濕，則由皮肉而筋脈，濕流關節固疾難療。潮濕除居處低窪外，常與季節如雨季、霉雨、及地區如沿海、海島等有關。

燥邪行於深秋，久晴不雨則燥生，亦與季節有關，或與地區有關，如西北地區高燥，故多燥少濕。燥勝則乾，乾即唇口，肌膚開裂成瘡，若不及時治療，久則肌膚失養，營衛不和，由表入裏，傷陰耗津，常能導致血燥血熱變症。

火為陽邪，熱甚則生火，五氣過極，邪積不散，皆能生熱化火，火有虛實之分，又因體質強弱，感受不同而有輕重之別，外感所致，皆為實火，故云“癰疽原是火毒生”。火性暴烈，是以陽熱之症，大都身熱不解，紅腫熱痛，或熱勝肉腐，甚者火毒熾盛，症多兇猛。陰虛大都與慾事不節有關，陰虛則火旺，俗稱虛火，亦即腎水不能制火之謂，陰虛火炎於上，則陽氣大發，易患外科重症。

膏梁厚味，房飲勞傷

飲食為人體維生要件之一，適其所宜，足以營養全身，飲食不節，則有損腸胃、所謂炙燙生熱，醇酒助火，膏梁厚味則營養多餘，油脂堆積，易使管道阻塞，暴飲暴食則脾胃受損，濕熱蘊積，常致火毒內熾，外發於肌腠則都為熱毒壅盛重候。

當今時代不斷進步，科技日新月異，飲食問題隨之複雜，且日益嚴重，諸如：水質、飲料、食品、香料、色素、人工甘味、防腐劑，添加物，化學（人工）飼料、農藥、清潔劑、殺蟲劑以及化學藥品等，均能導致脾胃受損，肝腎毒化，影響正常功能活動，從而生濕生熱，積毒化火，蘊結而患外科疾病。社會電器化之後，飲冷機會加多，尤以盛暑，更傷脾胃，都不能不注意及之。

勞是勞累過度，勞即傷脾，脾傷能致元氣虛弱，元氣為人體生化動力，一旦致虛，助百病生焉，如衛氣虛則外邪易襲，中氣虛則脾胃運行不利，脾虛則下陷，營氣虛則血行阻礙，負重久站則更易患下垂曲張等症，勞力階級則有各類職業病，其中亦不乏外科疾患。

房室是指性生活超過個人限度而言，過度易致腎枯不足，腎氣虧損，陰虛火熾，或命門火衰而使陰寒入骨，腎虛骨質失養等等，虛則外邪易乘虛而襲，患則也都為虛症。房室不節偏於腎虛，勞累過度則主脾虛，腎為先天之本，脾為後天之

本，是以常相提而並論。

臟腑失調、疼痛辨證

五臟五行即心——火、肝——木、脾——土、肺——金、腎——水相生相剋，即臟腑失調之謂也。經云，五臟藏精氣而不瀉，六腑傳化物而不藏，臟主封藏，腑主通達，一動一靜，相互配合，相互制衡，以維正常生理活動，臟腑失調，即起種種病理變化，臟腑病變，可使外達體表為瘍，體表患瘍，亦能影響臟腑功能，使之失調，由於臟腑功能各有特性，病邪性質亦復不同，是以所見失調情況亦各不相同。由五臟不和，六腑不通，關竅不得宣導而體表為瘍時，則痛生焉。

疼痛是氣血凝滯，經絡阻隔所致，大都與腫不可分，是故可分為先痛後腫，先腫後痛或祇痛不腫，祇腫不痛之別，先痛後腫者，病源深在，先腫後痛者，病源淺顯，但腫久後痛者都為惡候，祇痛不腫者，病在筋膜或內臟腹腔，祇腫不痛則屬不易釀膿之慢性疾患。

痛之證狀：熱痛——局部痛而灼熱，喜冷惡熱，涼藥圍敷則痛減或止。

寒痛——痛而畏冷，遇風受涼則痛加，溫藥熱敷則痛減。

虛痛——痛勢緩和，不脹不悶，揉按撫摩則減。

實痛——痛勢緊張，脹悶而痛，輕重都拒按，外科以實痛較多，虛者少見。

氣痛——流走不定，常因情志變動時，或加重或減輕。

血痛——外症皆由氣血凝結，經絡阻隔所致，是以痛點固定不移，痛而拒按。

風痛——大都突然而至，痛無定點，或游走甚速。

膿痛——跳痛如雞啄或脹痛，手指則痛劇，其他部位則緩。

治之之法：以通為用，通則不痛，至理名言也，但通之之法，各不相同。調氣以和血，調血以和氣通也，下逆者使之上升，中結者使之旁達亦通也。熱者涼之使通，寒者溫之使通，實瀉虛助皆通之法，審證求因能瞭解病因，則施治不致有誤也。

發於心上～五臟相干

此段即臟腑經絡辨證，分經論治之說。外科辨證除八綱，管衛氣血，臟腑之外，尚有經絡及局部部位之症狀辨證，以及引經藥物等。

經絡分佈全身，內源臟腑，外行體表，在人之體表臟腑之間，相互連貫，將人體內臟與皮毛、血脉、筋骨、四肢、百骸、五官聯成整體，是氣血運行，周流於臟腑、皮肉、筋骨之絡道通路，能濡養及維護人體各項功能，使人體內外上下保持平衡協調之用。人體一旦受邪，或臟腑有變，則氣血不和，局部經絡閉塞，鬱結不通，即成外瘍。外來邪毒侵犯人體，經由經絡氣血之傳變，能引致臟腑功能失常或

病變，內在因素引起之臟腑功能失常或病變，亦可經由經絡氣血反應於體表，導致某處氣血壅滯而發生瘡瘍，是以可藉經絡臟腑之辨證，了解瘡瘍與臟腑之間之關係，進而得知疾病之本質，始能達到治病必求其本，用藥直到病所之目的，此乃外科基本理論之一，習外科者，不可不察。但理論往往與臨床有某些距離，臨床須根據不同之疾病，選用不同之辨證，經絡部位辨證非唯一之辨證，亦非每一病例所必用之辨證法，必須依據疾病類別病種，綜合運用有關之辨證方法，始能完整無缺。當今還可通過照相、檢驗求證，茲將有關經絡臟腑與局部部位之關係，以及引經藥物等一一詳例，以供參考。

瘡瘍所在之組織，器官，部位與臟腑之關係：

組織：皮膚是肺之病變，肌肉是脾之病變。筋腱是肝之病變。血脈是心之病變。骨骼是腎之病變。

器官：目、乳頭、陰囊是肝之病變。鼻、喉是肺之病變。耳、陰莖、睪丸是腎之病變。舌是心之病變、口腔是脾之病變。唇、咽是胃之病變。乳房是女胃男腎之病變。尿道是小腸病變。肛門是大腸病變。

部位：頭頂屬膀胱經。頭側頸側屬三焦、膽兩經。額、顴、頤、髭都屬胃經。項後、背、正中都屬督脈，兩側都屬膀胱經。缺盆屬任脈。胸屬肺經。脇屬膽經。腋屬肝經。腹屬脾經。臍屬小腸經。上肢外側屬小腸。三焦、大腸三經、內側屬心、肺、心包三經。下肢前、外、後側屬胃、膽、膀胱三經、內側屬脾、肝、腎三經。

瘡瘍所在部位之經絡與臟腑之關係

患於少陽經者，屬心經火毒。患於手厥陰經者，屬心包絡積熱。患於手少陽經者，屬三焦相火。患於手太陽經者，屬小腸經風熱。患於手陽明經者，屬大腸濕熱。患於手太陰經者，屬肺經積熱。患於足少陽經者，屬膽經鬱火。患於足厥陰經者，屬肝經火毒。患於足太陰經者，屬脾經積熱。患足陽明經者，屬胃經火毒。患足太陽經者，屬膀胱濕熱。患足少陰經者，屬腎虛濕熱。

臟腑功能失常毒邪侵犯五臟之證象

毒邪擴散或內陷時如見高熱煩躁，神昏譫語、面色紅赤或發斑疹，舌質紅絳，是謂邪毒犯心。咳嗽胸痛、咳唾膿血、氣喘鼻煽、喉中痰鳴是邪毒薰肺，脇肋腫痛、狂躁易怒、驚厥抽搐、或角弓反張，是邪毒傷肝。嘔吐不止、肚腹脹大，屎氣全無，或腹痛便泄，是邪毒傷脾。尿少或閉，身體浮腫或目暗肢冷，舌卷叢縮，是邪毒入腎。邪入六腑亦各有見證。

引經藥物

- 太陽經——羌活(上)黃柏(下)。
- 陽明經——白芷、升麻(上)石膏(下)。
- 少陽經——柴胡(上)青皮(下)。
- 太陰經——桔梗(上)白芍(下)。
- 少陰經——獨活(上)知母(下)。
- 厥陰經——柴胡(上)青皮(下)。
- 手少陰——獨活、細辛、燈心、龍眼肉。
- 足少陰——獨活、肉桂、牛膝、鹽、酒。
- 手太陰——白芷、升麻、白、生薑。
- 足太陰——白芍、麻黃、蓮肉、大棗。
- 手厥陰——柴胡、川芎、青皮。
- 足厥陰——柴胡、川芎、青皮、烏梅。
- 手少陽——柴胡、川芎、青皮。
- 足少陽——柴胡、川芎、青皮。
- 手太陽——羌活、藁本、黃柏。
- 足太陽——羌活、藁本、黃柏。
- 手陽明——葛根、升麻、白芷。
- 足陽明——葛根、升麻、白芷。
- 顱頂——羌活。頭腦——藁本。鬢——川芎。面額——白芷。胸部——桔梗。
- 頸——夏枯草。項背——羌活。乳房——蒲公英。鼻——辛夷。耳竅——菖蒲。脇肋——柴胡、青皮、腹部——香附。腰骶——杜仲、獨活。上肢——桂枝、薑黃。手指——桑枝、忍冬藤。下肢——牛膝。睪丸——橘核。肛門——枳殼、槐米。

生於肩下脊上者

如以疽而言，根腳不大，症候輕淺者，為濕火為病居多，或因膏梁厚味而成，濕火為病者，初用清熱祛濕，繼用托毒排膿，如腫本堅硬，日漸開大而延及兩肩胸項者，屬鬱火為病，初用清熱解毒，化滯瀉火，繼用排膿托毒，虛則兼用生津滋陰，見有毒犯內臟傾向，當即護心解毒，以防內陷變證。

心經火毒對心臨

對心發者，亦是指大疽而言，因位在對心，且又居督脈中心點，由於部位特殊，常引人注意，又因背部皮肉堅固，是以古人在治療時，除內服外，如見瘡不起發，漫腫堅硬，或膿深不得外潰時，常兼施導引法“針通、拔法”，近時因社會生活改善，中藥治療亦時有發明日臻完善，已改用外敷，或薄貼即效，除兼消渴病患

者外，大都可霍然而愈。

導引法：拔筒，俗稱拔火罐，古人以獸角故稱角法，今用竹筒，且加藥物，是實功所倡用，取口徑略大於瘡口之鮮嫩竹筒一節（八~十厘米）一端留節作底，刮去青皮，筒壁約厚二~三毫米，筒底中心鑽一小孔，以杉木條塞緊，另配拔筒方藥物，裝入筒內，橫置鍋內，用物壓住勿使浮起，水煮五至十分鐘，取出竹筒，倒去筒內藥物，乘熱急對瘡口壓緊，利用氣體熱脹冷縮筒內負壓原理，自會吸住，吸取五~十分鐘，待溫度已減，拔除筒底木塞，竹筒自會脫下，每天視體質強弱及病情需要，拔一~五次不等，可使溫通氣血，拔毒泄熱，拔膿去腐。拔前先用三稜針對準瘡刺孔數處或將瘡口擴大，以利抽吸膿血。

兩肩左右雙生發

稱搭者，即搭手或搭手疽發背，亦是指疽而言，古人左肝右肺之說（隱指交叉神經），屬理論之一，如照鬱火、濕火、臟腑功能療法論治，皆可應手全愈，治法詳發背。

用藥新論：今人之體質與昔不同，正宗成書於明，至今將四百年，中國是農立社會，尤以農業地區，民衆生活在大自然中，日出而作，日入而息，風雨不避，寒暑須擋，身體抗力強壯，且醫者都集中城市大邑，較不普及，往往小癟不醫，大病始治，是故古昔用藥較猛。今日已是工業社會、電化世界，生活奢侈，人在嬌生慣養之環境中生長，體質抗力日趨衰退中，是以論症用藥，亦得適應時代之所改變，真所謂“盡信書不若無書也。”

蓮子蜂窩防毒陷

蓮子蜂窩亦指疽，凡發背、搭手大症，其症根盤較大，腫處明顯，頭多膿多，潰後狀如蜂窩蓮蓬，故有蜂窩發，蓮蓬發之稱，如在正不勝邪，毒不外泄，反陷入裏，客於營血內傳臟腑而引起之全身危險症候者，稱為疽毒內陷，毒陷或內陷。又可分火陷、乾陷、虛陷三種，習稱“三陷變局”。

火陷者，都由陰液不足，火毒熾甚，或治療失時失誤，致氣不能引血外腐成膿，火毒反陷入營，漸至神迷瘻厥。疽發十日左右，見瘡頭不高，根盤散漫，瘡色紫暗，瘡口乾枯無膿，灼熱劇痛，身現壯熱、口渴、便秘、溲赤、煩躁不安、神迷譫語，或脇肋隱痛，苔黃或糙，舌絳，脈象洪數或弦數等。

乾陷者，都由氣血兩虧，正不勝邪，營衛已傷，釀化成膿，不能托毒外達，瘡頂乾枯，根盤紫滯，以致正氣愈虛，毒熱愈熾，漸致神昏不爽，而成內閉外脫現象。疽發二十日前後，瘡面膿腐不透，瘡口中央腐爛，膿少而稀，瘡色晦暗，腫勢平塌，散漫，脹痛或微痛，身熱或惡寒，神情疲倦，飲食減少，自汗，脇痛，神昏

譫語，氣息粗促，舌苔黃膩質淡紅，脈象虛數，體溫反低，四肢厥冷，便溏洩數，或脈象細沈等。

虛陷者，毒邪雖退，而氣血大傷，脾氣不復，腎陽衰弱，生化乏源，陰陽兩竭，而成膿腐雖脫，新肉不生，飲食日減，形神俱削，漸至昏迷厥脫。痘發月許，應見腫勢雖退，腐肉亦脫，膿水稀薄而新肉不生，光白板亮，狀如鏡面，不知疼痛。虛熱不退形神萎頓，穀食日少，或見腹痛便秘，自汗肢冷，氣息低微短促，舌淡紅，苔薄白或無苔，脈象沈細或虛大無力，或陷昏迷厥脫，為脾腎陽衰。若舌光如鏡，口舌生瘡，舌絳脈細而數，則為陰傷胃敗。

治法

火陷證宜清營解毒，滋陰泄熱，藥用生地丹皮赤芍清營，地丁連翹銀花蒲公英解毒，元參首烏石斛滋陰，角刺山甲攻擊。如神昏譫語，為毒火犯心，宜牛黃清心丸，或紫雪丹以清心解毒。咳吐痰血為火毒犯肺，宜加鮮茅根，鮮蘆根，淡竹茹，痰多用竹瀝冬瓜子，痰紅帶腥或膿，用石膏、沙參、象貝、魚腥草、薏米仁清養肺陰，發瘡抽搐為毒犯肝經，輕者石決、鈎藤、僵蠶、白芍、牡蠣，重者全蠍、蜈蚣、羚角平肝熄風。如胸悶納呆，嘔苔膩為火毒犯脾，宜加陳皮半夏蒼朮厚朴以健脾醒胃。如腹脹便結當用枳實、大黃等通裏瀉實。如便溏納呆加山楂、穀芽、神曲、腹皮調胃整腸，如尿少或閉，或尿血為火毒犯腎，尿少加竹葉、滑石、赤苓、通草利尿泄熱，尿閉加琥珀活血化瘀，利尿通淋，尿血宜大小薊，側柏炭，田七粉清熱止血。渴甚加麥冬、花粉、石斛，以養陰生津。濕熱甚者卻併發黃疸，宜加茵陳、山梔、柏皮清利濕熱，如熱甚壅遏，則熱極生寒，突見寒顫，高熱或厥冷時，宜清泄裏熱，桂枝白虎湯等選用。

乾陷證宜補益氣血，托毒透膿，佐以清心安神，托裏消毒散等選而用之，另送安宮牛黃丸等安神清鎮。

虛陷如脾腎虛者，附子理中湯補脾腎，如自汗肢冷者加肉桂，昏迷厥脫者加別直、龍骨牡蠣等。陰傷胃敗者沙參、麥冬、生地、穀芽、砂仁少許。三陷症危險嚴重可酌用抗生素，以補中藥不足之處。

腰間腎俞發難生

腎俞發亦屬疽，稱發即為大疽，背部患疽，大者統稱發背，但背中間與旁生，都分別命名，中屬督脈，習稱發背，旁屬膀胱經，習稱搭手，因此處目視不能及，反手搭之即能觸摸病所故名，且分上中下三部，上稱上搭，中則中搭，下為下搭，腎俞發亦名腰疽，即指下搭，因位在肓門，自古即認為此處生大疽，必與腎陰有關，都云此症因酒色過度，怒氣相干，寒熱雍盛而成。此節再次提出本症應密切注

意與腎陰虧損有關，且認為腎乃藏精、藏氣、藏神，生男育女、壽命短長皆由於此。此乃由於當時社會純樸，當今社會發展迅速，事業競爭激烈，用腦過度，精神損耗等等。皆能引致腎陰不足，已不限於房勞之過也。其他參考發背。

督脈經虛從頂發

對口即腦疽，亦稱腦後發，習分正對口與偏對口，雖皆由濕火上攻，但正對口反易治，偏對口都見四向蔓延，較不易處理，且常起內陷變端，臨床確乎如斯，緣由除督脈與膀胱經屬不同外，正對口常因濕火為病，偏對口都由鬱火成患。其他證治等參考腦疽。

何期耳後都生發，夭疽銳毒亦非輕

疽生患於耳後高骨（乳突）者，左稱夭疽，右為銳毒，亦稱耳後發，夭者不盡天年之謂，銳者利如鋒刃之銳，言其毒甚症兇，古稱左肝右肺之說，隱指交叉神經之意也。亦分濕火鬱火兩型。

濕火為病者，由火毒外襲，又因肺經蘊熱，火性上炎，且挾風助勢，凝於耳後所致，初起結塊高腫，皮色鮮紅，根盤收束，灼熱疼痛時，先以清熱解毒，行氣活血，疼痛加劇，潰膿之時，用托裏消毒，透膿排托，待膿潰腐脫，漸生肌肉時，雙補氣血，不難全功而愈。

鬱火者，由於情志內傷，恚怒傷肝，氣鬱血逆，鬱久化火而成。初起腫堅塊硬，皮色紫暗，根盤散蔓，先宜清火解鬱，柴胡清肝湯，加味逍遙散、越鞠丸都可選用，外潰見膿後宜托裏透膿，溫補氣血、神功內托散選用，如膿水不暢、腐肉難脫、或精神不振，食少倦怠者，為氣血兩虛，生肌緩慢，不易收斂，此時選用十全大補等助生氣血。若見神昏譖語者，即內陷變證，預後不良，調治參考內陷變證。

脫疽生手足

脫疽為肢端缺血壞死、趾節脫落之慢性疾病，正宗對此病之症狀、治療、預後等，有詳細記述，對切除患趾之方法，亦有明確之記載，主張先在患趾上方“拈線纏紮”止血之意，然後用利刀順節切取患趾，所倡方法與現代所用之原則一致，更謹慎謙和以會診方式，博取衆議，徵得患者同意之後，始行之，且行低位截肢治療，至今仍為臨床所遵循。至清朝部份醫家對脫疽發病之原因等有更進步之記述，直至近數十年，統計發病之原因，如文所述之丹房補術外，還有寒冷受凍，情志刺激，飲食不節、脾胃失調。勞累體弱或久病虧損。外傷、甚則發現飲水（含砷）等都有關連。

腎為先天之本，藏陰精而寓元陽，腎氣旺盛則五臟充沛，氣血暢順，若房室不節或服補陽之藥，致陽精燔惑，淫火猖狂，蘊積臟腑，消灼陰液，毒聚肢端，筋歛

髓枯。

嚴寒涉水，步履冰雪，久居濕地，寒濕外受，或受凍後驟然取暖，以致寒凝絡痺，血脈阻滯，肢體失卻溫煦濡養。

怒傷肝、思傷脾，均能使五臟不和，功能失秩，以致氣血失調。肝主筋、怒傷肝、肝氣鬱結、鬱而化火，暗傷肝陰，筋失所養。脾主肌肉四肢，思傷脾，則運化失職，不能正常輸布精微於血脈，漸至氣血虧損，血不充盈，脈道不利。

飲食不節，過食厚味，脾胃受傷，生濕化熱，積毒下注。

體弱或久病，消渴等虧損，則氣血損耗，運行無力，肢體筋脈失養，加之外邪所襲等，都能罹患此症。詳細參考脫疽。

漫腫難治掀腫易

漫腫掀腫是指局部辨腫，治法即消、托、補三法之意。腫是外科疾病之特點，能辨別腫，即能了解病源所在，及其性質與可能之變化。腫由營氣不從而起，但原因不同，大致可分實、虛、火、寒、風、濕、痰、鬱、氣、血、膿、腫。

實腫：腫形高突（氣盛），根盤收束（血盛），屬氣血盛，正氣充足，能勝毒邪之象。

虛腫：腫形平塌（氣虛）根盤散漫（血虛）屬氣血虛弱，正氣不足，不能勝毒邪之象。

火腫：皮膚焮熱、顏色紅赤，腫塊表淺者，紅熱明顯，病根深在者，則微紅微熱，以紅為火之象，熱為火之性，故紅、熱為火腫特徵。

寒腫：皮膚發涼、怕冷、顏色蒼白（寒凝氣滯）、或青暗（寒冷血瘀）或皮色與溫度不變。

風腫：腫勢宣浮（表淺柔軟）、微熱、微痛、腫勢急速，蔓延甚快。

濕腫：皮膚起黃、白水泡，破則糜爛滲水（為水濕溢於皮表）、如囊裹水，甚則皮膚光亮如晶（為水濕積聚），肢體腫脹，按之凹陷如泥（為水濕滲於腠理）。

痰腫：腫軟如棉，或腫硬如饅，不紅不熱，無痛而不易釀膿。

鬱腫：皮膚不仁不熱，腫塊堅硬如石，甚則如岩，高低不平。

氣腫：皮緊而內軟，遇喜則緩，遇怒則長。

血腫：即瘀血腫，淺者可見青紫斑點，深則腫塊按之應指，或見皮膚紫黑。

膿腫：頂軟，按之應指，作痛陣陣。

腫、潰之治法見腫瘍之治法（內治）潰瘍之治法（外治）。

癰疽治法總論第二

【原文】

癰疽發背怎生醫。不論陰陽先灸之。不痛灸至痛。痛至不痛時。凡看癰疽大症。先要從容立定主意以見標日期爲始。到今幾日。瘡形與日期。是否相應。相應則多吉。不相應則多險。次看受病之源。發於何臟腑。出於何部位。再看身體之上下。部位之險否。形色之順逆。精神之有無。年紀之老壯。血氣之盛衰。發陰發陽。毒深毒淺。陽爲易治多生。陰爲難治多死。然後診脈之虛實。以決其險順。未潰前脈要太過一二。至已潰後。又宜不及二三分。是爲脈病相應。自不變生。如其相反須防不測。以上看法。務要一一參明。表裏透澈。方定治法。凡瘡七日以前。形勢未成。元氣未弱。不論陰陽表裏。寒熱虛實。俱當先灸。輕者使毒氣隨火而散。重者拔引鬱毒。通徹內外。轉陰爲陽。凡能發腫作痛。可汗可攻。或消或托。兼求標本參治。必以病合脈。以藥合病。庶不誤治。而首尾俱不可損傷元氣。脾胃尤爲至要。

內服蟾酥丸一服。外將神火照三枝。凡瘡初起十日之前。如已灸之後。未服他藥。宜用蟾酥丸一服。得汗解爲妙。或萬靈丹發汗亦可使毒氣隨汗而散。最爲捷徑。如二藥服後。汗不出。此乃表裏秘密之故。其毒不輕。當用神妙拔根方施治。如神燈照法甚妙。此法解毒活血消腫散瘻。然不可早用。如瘡只四五日。形未聚。毒未出。若早用之。恐火鬱而內毒反致難出。須八九日之後。瘡勢已定。毒氣已聚。未成膿腐之時。用此照之。能消者自消。不能消者自高。不潰者自潰。不脫者自脫。真良法也。

用膏貼頂上。敷藥四邊圍。凡瘡最忌風寒侵襲。初起或已灸之後。俱當用太乙膏。蓋貼頂上。此膏拔毒提膿。兼以防禦風寒。如七日以後。焮痛高腫。瘡頭有黃色穢膜。黏在膏上。餘腫紅色光亮鮮明。每日宜用葱湯洗淨。換膏貼之。其正膿定在十一日前後出也。此爲陽毒已治。如七日之後。瘡不大高腫。四邊又不焮痛。瘡頭無膿。急宜用化腐紫霞膏。塗於瘡頂。外用太乙膏益之。換至十日外。瘡頂漸腐。餘腫漸高。似有膿意。其正膿定在十五日後可出也。此乃半陰半陽之症。化險成順。如二十日以後無膿者。乃純陰之症。治亦無效矣。至瘡之四圍餘腫。須用敷藥。收束根

腳使不開大。初起用金黃散敷之。拔毒消腫止痛。潰後用鐵桶膏箍之。使瘡根漸收漸緊。諸瘡皆因氣血凝滯而成。切不可純用涼藥。冰凝肌肉。以致難腐難斂。當用溫煖。散滯行瘀。拔毒活血之藥為妥。

氣盛兮頂自高而突起。血盛兮腳根束而無疑。人之氣血稟賦不同。或老而有餘。或少而不足。故不論老少。總以氣血為主。關係不淺。腫瘍若無正氣衝托。則瘡頂不能高腫焮痛。潰瘍若無真陰滋潤。則瘡色不能紅活。根亦不能收斂。其頂高根活者。皆可知氣血有餘也。又宜交會明白。交會明白者。瘡根與好肉交界處。高低自然分明。皮肉自然各別也。

高腫起者忌用攻利之藥。以傷元氣。平塌漫者。宜投補托之劑。以益其虛。凡瘡初時即高起者。此為陽症。毒發於表。內臟原無深毒。便宜托裏以速其膿。忌用內消攻伐之藥。以傷臟氣。致膿反難成。不能潰斂。其初起不高不赤。平塌散漫者。此乃陰症。元氣本虛。急宜投托裏溫中健脾之藥。催托毒氣在外。須無變症。

內熱甚者量加消毒清劑。便閉燥者。必須通利相宜。使臟腑得宣通。俾氣血自流利。腫瘍時。內熱口乾。脈實煩燥。便秘喜冷者此為邪毒在內。急與寒涼攻利。宜內疎黃連湯。四順清涼散。內清沃雪湯。可以選用。兼有表症者。防風通聖散。去麻黃。或雙解散。加桔梗天花粉又或小便不利者。兼入天水散。或五苓散。務使二便通利。以清其源又有元氣素虛者。恐不勝前藥。以托裏消毒散。加蜜炒大黃。或兼豬膽套法。亦得通利為度。首尾俱要秘而不結。通而不泄。臟腑和平。表裏透徹方可用托裏排膿內補之藥。又如潰瘍時雖有口乾便閉。臟腑不和。小水不利等症。但因潰後膿水出多。內亡津液氣血虛耗。不能榮潤臟腑所致者。其人必脈細而數。口和而乾。飲食減少。好飲熱湯。此乃虛陽之火為病。非有餘可比。只宜養氣血。滋津液。和臟腑。理脾胃。則二便自和。亦無變症。倘誤行攻利。多致不救。

十日之間瘡尚堅。必用披針。當頭點破。凡瘡十日以後。自當腐潰為膿。如尚堅硬不作膿者。此屬半陰半陽之症。瘡根深固。若不將披針當頭點入寸許。開竅發泄。則毒氣無從而出。必致內攻。倘有內膿。針之亦令易出。譬如開門逐賊也。亦有十日外。瘡雖不腐潰。形尚紅活。焮熱腫痛者。此乃膿遲之故。不必針之。凡元氣不足。或失用補托之藥。又誤用寒涼。或覆蓋未煖多致膿遲。宜用補托健脾之藥。以得膿為度。又以十五日至二十一日為期。如過期但有稀膿者。元氣與毒相持日久。以致耗散難以

奏功。

半月之後膿亦少。須將藥筒對頂拔提。有膿血之交黏。必腐肉之易脫。如瘡至半月後。仍不腐潰。不作膿者毒必內陷。急用披針。當頭頂點開三孔如品字樣。隨瘡之深淺。一寸二寸。皆可入之。入針不痛。再深入不妨。隨將藥筒預先煮熱。對孔合上良久。候溫取下。如膿血交黏。膿則黃而帶鮮。血則紅而微紫。此爲活瘡。氣血內運。腐肉易脫用藥可全。如拔出瘀血紫黑。色敗氣穢。稀水無膿者。此爲死瘡。氣血內敗。神仙不治。一月必死。

且如斯時。內有膿而不得外發者。以針鈎向正面。鈎起頑肉。用刀翦當原頂。翦開寸餘。使膿管得通流。庶瘡頭無所閉塞。已用藥筒拔膿之後。外既有孔。內竅已通。又當大膿發泄之期。如尙膿少。此乃瘡頭有瘀腐塗塞。內肉亦有頑瘻阻隔。以致膿管不通。自然難出。須用針鈎。鈎起瘡頭頂頑肉。用披針利翦。隨便取去寸餘頑硬之肉。則微痛血出。亦自不妨。隨用兩手輕重得宜。從瘡根漸漸捺至中間。內有聚膿。自然湧出。以黃色稠厚而日漸多者爲吉。反此爲凶。

頻將湯洗。切忌風吹。凡瘡未潰前。或已用照藥後。俱要煎葱艾湯。每日淋洗一次。甚者早晚二次。使血氣疏通。易於潰散。至已潰時。及藥筒提拔之後。尤宜避風。洗以豬蹄湯。用方盤在瘡下放定。隨用軟帛將湯淋上。併入孔內。輕手按捺。使敗腐內膿隨湯而出。以淨爲度。再以軟帛疊成七八重。勿令大乾。隨湯覆於瘡上。兩手輕盈。旋按片時帛溫再換。如此洗按四五次。自然淤滯得通。毒氣得解。腐肉得脫。疼痛得減。此手功之要法。大瘡不可缺也。候腐脫已見紅肉時。洗後搽以玉紅膏。用抿腳將膏挑在手心上。搽化搽之。蓋太乙膏。四邊根腳已消處。不必罨藥。每日如此。不數日間。膿腐盡脫。新肉頓生。更加內補調理得宜。輕瘡只在月餘。大瘡不過七十日。必完口全愈矣。

又關節在於斯時。變生出於此候。關節者。陽瘡以十四日爲關。陰瘡以二十一日爲節。此時務要膿出勢定。由膿出而腐敗。由腐敗而肌生。由肌生而收斂。亦瘡之次序關節也。過期不得膿者。後必有變。故一關順則多順。一關逆則多逆。不可不知。

治當大補。得全收斂之功。切忌寒涼。致取變生之局。潰膿之後。五臟虧損。氣血太虛。法當純補。但見發熱惡寒。膿多自汗作痛者。便進十全大補湯。虛熱少睡。飲食不甘者。便進黃耆人參湯。皮寒虛熱。咳嗽有

瘍者。便進托裏清中湯。四肢倦怠。肌肉消瘦。面黃氣短者。便進人參養榮湯。膿多心煩少食發燥不睡者。便進聖愈湯。脾虧氣弱。身涼脈細。大便溏泄者。便進托裏溫中湯。飲食不甘。惡心嘔吐者。便進香砂六君子湯。脾虛下陷。食少虛熱間作者。便進補中益氣湯。腎虛作渴。不能制心火者。便進加減八味丸。蓋托裏則氣血壯而脾胃盛。使膿穢自排。毒氣自解。死肉自潰。新肉自生。飲食自進。瘡口自斂。若不務補托而誤用寒涼。則真氣虛而益虛。邪氣實而益實。往往瘡毒內陷。膿多穢臭。甚則脈洪大渴。面紅氣短而死矣。

蓋瘡全賴脾土。調理必要端詳。脾屬土而上受胃積。故胃爲水穀之海。脾爲瘡廩之官。胃主容納。脾主消導。運行不息。生化無窮。凡周身氣血。偏體脈絡。四肢百骸。五臟六腑。皆藉此以生養。是謂得土者昌。失土者亡。蓋脾胃盛則多食而易飢。其人多肥。氣血亦壯。脾胃弱則少食而難化。其人多瘦。氣血亦衰。故外科尤以調理脾胃爲要。善養生者。節飲食慎寒暑。戒喜怒。省勞役。則脾胃不傷。不然則精神氣血。由此而日虧。臟腑脈絡。由此而日損。肌肉形體。由此而日削。則百病生矣。

冬要溫床煖室。夏宜淨几明牕。人之氣血。喜煖而惡寒。遇寒則結。遇熱則散。瘡乃肌肉破綻之病。風寒最爲易襲。凡看瘡時。冬宜溫床煖室。爐火逼盡餘寒。夏宜淨几明牕。外風不令得入。方可揭膏洗貼。常見病者。夏則縱意當風取涼。或睡臥陰濕之處。冬又不知溫煖。以致寒侵。輕則不能生肌收口。重則變爲不膿不斂陰症。可不慎哉。

飲食何須戒口。冷膩硬物休餐。飲食者。人之所賴以生。方腫瘍時。痛傷胃氣。自然諸味不喜。及潰後膿毒一出。胃氣便開。方欲思食。但所喜者。便可與之。以接補脾胃。如思此物而不與。恐逆其胃氣。而反致不能食也。但不可太過。又生冷傷脾。硬物難化。肥膩滑腸。所當禁耳。

癰疽雖屬外科。用藥如同內傷。凡癰疽如腦項疔毒大瘡。形勢雖出於外。而受病實在於內。故當內外兼治。外不起者。內加托藥。表熱甚者。內必清解。血虛宜用四物湯。氣虛宜用四君子湯。脈虛足冷溫中。脈實身熱涼膈。蓋以癰疽言之爲外科。以氣血言之即內傷。理無二致。業外科者。不可不視明內科也。

脈虛病虛。首尾必行補治。表實裏實。臨時暫用攻方。丹溪云。凡瘡未破。毒攻臟腑。一毫熱藥不可用。凡瘡既破。臟腑已虧。一毫涼藥不可用。此未盡然。假如未破時。脈得微沈緩濶細數浮空。又兼身涼自汗便利。

。嘔吐少食。瘡形又不起發。不掀不痛。不潰無膿。此皆氣血虛弱之故。若執未破毒攻臟腑之說。攻以寒涼。復損元氣。豈能得生。余則不論首尾。不拘日數。但見脈症虛弱。便與滋補。虛弱甚者。須用參木膏八仙糕。陽虛自汗食少者。單人參膏。或六君子湯。加砂仁木香。甚者加附子。泄瀉腸鳴。胃虛嘔逆者。參苓白朮散。加荳蔻山藥木香柿蒂。脾虛下陷溏泄。及肛門墜重者。補中益氣湯。加山藥山萸五味子。隨症選用。虛而受補者多生。虛而不受補者不治。至如表實而身體發熱。無汗惡寒。裏實而脈大身熱。便燥口乾。表症急則宜先用荆防敗毒散。以解其表。裏症急則宜先用四順清涼散。以攻其裏。表裏相兼者。宜用防風通聖散。發表攻裏。凡此治法。亦在臨時酌用。不可執泥。

病要論久新法。莫善於寬治猛治。人之病有新久。勢有緩急。如受症之初。元氣未弱。有當用猛藥者。切忌養癰貽患。所謂若藥不瞑眩厥疾不瘳。如表症甚者。用萬靈丹大加表散。裏症急者。以內疏黃連湯。急與通行。求本而後調之和之散之。使病勢漸退。元氣漸復。飲食漸進根本漸實。則餘患再無不愈之理。常見醫者。不論病當中病。即已不可太過耳。又如受病日久。邪正相距。其元氣未有不衰弱者。縱有餘症誰症壞症。俱當先視其病之新久。本之盛衰。又當悟因虛致病。因病致虛。其中又有虛熱虛寒之別。一例妄行攻治。如盲人騎瞎馬。夜半臨深池。豈不危哉。

藥必求標本。功莫於先醫後醫。若一概以攻補。恐兩途之誤用。凡物理皆有標本。而身病之標本。尤不可不察。五臟爲本。六腑爲標。五臟主裏主血。六腑屬氣屬表。此氣體之標本也。初病爲本。傳病爲標。元氣爲本。病氣爲標。此疾病之標本也。凡治病者。當先治其本。後治其標。又緩則治其本。急則治其標。假如先得瘡疾。而後得泄瀉嘔吐食少等症。則當舍本從標俟瀉止嘔定食進。始治其瘡。餘倣此。

又說陽變爲陰。內外被寒涼克伐。瘡發於陽。爲痛爲熱爲疼爲實。本屬易治。但起初或視爲小恙。不早求治。又外受風寒。內傷生冷。或醫者失於補托。而又以涼藥圖其內消。以合病者之意。多致氣血冰凝。脾胃傷敗。瘡毒不得外發。遂成內攻之候。往往不救。如瘡變在十一日。未出膿之前。形勢與好肉相平。不疼不熱。軟漫相兼。瘡口止流清稀膿水。更兼身體不熱。脈亦細微。不欲飲食。精神昏短。此陽變爲陰。雖強投溫中健脾之藥。而不應者。百無一生。如瘡變在十五日之後。已出膿時。毒已外發。偶因調攝失宜。誤食冷物忽變爲陰者。急投托裏溫中湯。十二味異功

散。輕者十全大補湯。俱倍加參耆桂附以救。須得瘡熱作痛。膿出身溫脈起食進者吉。因原屬陽症。故可轉危為安。

豈期陰變為陽。首尾得辛熱扶養。病分真假。理究陰陽。瘡發於陰。為疽為冷為硬為虛。原屬難治。病者覺之。而用辛香酒煎大方熱藥服之。醫者又敷以熱藥。冀其發起高腫。掀熱作膿。於是瘡得熱藥。而轉陰為陽矣。若其瘡雖得微腫微熱微痛微膿。而形勢終不似真陽之紅活。亦不能得真厚之黃膿。則仍歸陰症多死。凡值此等陰症。倘病者方寸不雜。聽命於醫。醫者治法得宜。先後中節。十中亦有二三可生。其急如救焚拯溺可施者。毋緩須臾。其慎如臨淵履冰。應禁者切忌鹵莽。如此而不得生。則天命矣。

既有針工之異說。豈無線藥之品詳。凡瘡毒已成。當托其膿。膿成當用針通。又必驗其生熱淺深上下而針之。假如腫高而軟者。發於肌膚。膿熟用針。只至四五分。腫下而堅者。發於經脈。膿熟用針。只至六七分。腫平肉色不變。毒氣附於骨也。膿熟用針。必深入寸許。方得見膿。又輕按便痛熱甚者。膿淺而稠。重按方痛微熱者。膿深而細。按之陷而不起者。膿未成。按之軟而復起者。膿已成。按之尚硬不痛者無膿。否則瘀血也。按之都軟不痛者有膿。否則濕水也。凡瘡有膿。即當針膿。孔宜順下。膿未熟而遽針。則氣血泄。而膿反難成。膿已熟而不針。則腐漬深。而瘡必難愈。膿深而針淺。則內膿不出。而外血徒泄。膿淺而針深。則內膿雖出。而良肉亦傷。元氣虛者。必先補而後針。則諸症悉退。又有氣癟。腫而綿軟不痛者。血癟。腫而肉壘成塊者。頑毒積之日久。皮腐肉紫根軟。四邊紅絲纏繞者。及己結核之漸大漸痛漸腐者。以上四症。俱不可輕用針刀掘破。若妄用之。必出血不止。而立危矣。用針之妙。在膿隨針出。而病者寂無所知。至於癰瘤瘰癧諸痔諸漏疔毒。堅硬頑瘡。非線藥之功。不能刻期取效。線藥有五六種。分附各門。以便隨症選用。此不贅及。

湯散丸丹。要在發而必中。神聖工巧。誠為學者機關。醫之用方。猶將之用兵。須調度得法。要在知人之強弱。識症之內外。究病之淺深。察時之順逆。然後可汗可攻。或吐或泄。或宜和解。或宜補益。某湯善汗。某散善攻。某丸善和。某丹善補。因病用方。如矢發機。投之必中。而病無不愈矣。神聖工巧。須從望聞問切四字體會。此又學醫者之機關也。

至於千方百症。難將說盡短長。方不在多。心契則靈。症不在難。意會則明。方不心契。症不意會。而欲藥與病相應。難矣。

治在活法貴在審詳。嘗謂昔者承平。今時攘擾。動靜不同。逸勞亦異。昔之受病。從外而來。今之受病。從內而發。又古者多實。設方宜散宜宣。今者多虛。治法宜滋宜補。醫者不識古今。一概施治。安能奏效。

用之必得其當。醫斯可以稱良。詞雖近於粗鄙。可為後學提綱。

【探究、按語】

論治先從診斷開始，外科之診斷，亦不離望聞問切四診，但外科疾病生於體表，與其他各科不同。基於“外必本於內。知乎內以求於外”之立場，瘡瘍之生，應視為屬整體失調，是以用四診檢查全身外，還得用四診檢視體表局部。辨證外又須辨病，因一病有一病之特點，尤以大症，先以見標目為始，至今已幾日，看與瘡形是否相符，須看受病之源，出何部位，屬於何臟，再辨陰陽老幼及氣血之盛衰，再次方診脈之虛實順逆，加以參考分析，作出施治方向。但如瘡面塗敷月黃、碘酒，以及過用消炎藥、抗生素後，一般瘡瘍之消散或釀膿日期會後延數天至數十天之久。

望診是觀察病人全身及局部狀況。一望神，望神是觀察生命活動之表現，精氣足則神旺，精氣虛則神疲，神藏于心，外候于目，目光明亮為有神，雖病而正氣未衰，臟腑功能正常。目光失神，則正氣已傷，臟腑功能失常，外症亦然。二望面色，面色青主寒、主痛，黃色主虛，白色主虛主寒，面色皎白常見于慢性病，如瘡瘍等。蒼白常見于痛厥、失血，晦暗或黑常見于惡候晚期。三望瘡色，瘡色青常見血瘀，赤色常見于急性瘡瘍如紅絲疔、丹毒等。白色常見于皮膚斑病，黑色常見于脫疽、瘡等。四望舌色，陽性腫瘍，舌都正常，如熱毒熾盛，舌質漸紅，苔亦漸黃，繼則質紅赤，苔深黃，火毒傷陰則舌苔乾燥碎裂，年高陰血不足者，火毒尤易傷陰，常乾絳無苔。舌若黃膩或粗糙者，為濕熱壅盛，多見內癰。如舌苔乾而黑，為濕熱火化。舌苔光剝而潤者，為陰液微耗或胃氣受傷。光剝而乾者，是熱極傷陰，或嘔吐禁食，水津乏源所致。又舌質之變化，常因個人體質、嗜好及病情變化而異。

問診除年齡、職業等外，主要問起病時間，主要症狀，病情變化，隨伴症狀，治療經過，以及以往病史，甚則個人之習慣、嗜好等。特別注意症狀及特點，婦女有經產特點，總之越詳細，越對診療有利，且應一一記錄，以防遺漏，且可作複診時參考。

聞診是耳聽鼻嗅，凡聽到與疾病有關之聲音，如咳嗽、喘急、痰聲，嗅到膿痰臭穢、濁涕腥異等，都是診斷治療之資料。

切診，外科疾病，不管腫瘍、潰瘍，都要按摸，腫瘍按位置、範圍、深淺、熱度、探測疼痛情形，及有膿無膿等，潰瘍按瘡口四周之溫度。其次是切脈，外科切

脈，始自「金匱要略」，至元以後，因已重視整體治療，外科方書亦都例脈法，脈有三十餘種，如能掌握八脈，皆可了然矣。

浮脈——腫瘍脈浮，主毒邪在表在上，都見急性腫瘍初起時。潰瘍見浮脈可能瘡瘍流竄，或大瘍惡化，浮而無力，是正氣耗散之象。

沉脈——偶見陰頑之證，屬寒凝絡滯，毒邪深痼，是氣血壅塞之象。

遲脈——常與患者體質有關，如瘡瘍之後，脈遲有神，則與病無礙，遲而軟弱無力，則屬正氣衰弱，難以勝邪。

數脈——腫瘍是病在進展，急性瘡瘍常見。熱勝肉腐，釀膿時，脈常洪大而數。慢性疾患則細而數。如在潰瘍，瘡潰膿泄，脈以靜為吉，若數脈不減，是毒邪未衰，初潰尚無大礙，久則正氣日虛，形神必憊，則見脈數虛細，預後多不良。

弦脈——腫瘍主痛，潰瘍乃邪去正傷，脈應柔和，如弦而不軟，是毒邪未衰。

澀脈——慢性腫瘍，腫塊堅硬時，脈多澀滯有力，大都不易消散。陽性腫瘍釀膿時，如過用寒涼，則氣血冰凝，腫塊僵硬，亦見澀脈。

虛脈——包括微、弱、細、軟、腫瘍見脈弱，乃正氣虛弱，若非大瘍，微見虛軟，尚無大害，重大腫瘍如見虛弱，是脈證相反，病情必重。如重大潰瘍，因毒去正傷，脈應虛弱。如毒邪未衰而脈已虛軟不起，乃正氣難支，每多毒陷生變。

實脈——包括洪、大、滑、緊。腫瘍在毒邪方盛，正氣未傷時，見實脈是脈證相合，如過于堅大搏指，則無論何種瘡瘍，皆非所宜。是毒邪熾盛，正氣難支之象也。初潰之後見實，是餘毒尚盛，氣血未和，經絡未暢，脈應漸漸和緩，否則屬毒邪留戀不去，應加注意。

有餘之脈——浮、芤、滑、實、弦、緊、洪、大、長、數。宜見腫瘍，不宜見潰瘍。

不足之脈——微、沉、緩、澀、遲、伏、軟、弱、結、細。宜見潰瘍，不宜見腫瘍。

瘡瘍有輕重之不同，體質有先天後天強弱之區別，脈象亦各有差異，況病在不斷演變，應綜合各方情況，分析研判，不能單純以脈象為依據。

治法

外科之治療，亦以整體為目標，分內治與外治。內治持內科之理，加以外科特具之消散、托毒，透膿等法，顧及整體。外治則重外消、去腐、生肌、圍敷等處理局部，兩者相互並用，但部分輕症淺瘍，又可專以外治而竟全功，而如面皰、內癰等症，則亦可專用內治告痊者，總之應辨別患生部位之經絡所屬，症候之特點，發展，以及屬虛、屬實，是陰是陽，然後決定內外同治，或是內治、外治。

內治：外科內治法始自「靈樞癰疽篇」、「金匱要略」已備部份施治法則，治療大要謂：須明托裏、疏通，行榮衛三法；由外之內，恐邪氣極而內行，故先托裏，由內之外，其邪氣深于內，故施疏通，以絕其原，由外之中的，其痛在經，當和營衛，用此三法之後，雖未差，必無變證，亦可使邪氣頓減而痊愈，其以邪在表在裏，與半表半裏而定下汗、下、和等三大治瘡法則，重在審證求因，以制其偏勝，衰其病勢，以使平衡、兼顧正氣為原則，俾使初起能消，潰則易歟，或是以大化小，不致生變，其法影響深遠，今仍適用。

元人“齊德之”綜合前人之說，訂立內消法、托裏法。認為瘡瘍之生，皆由陰陽不和，氣血不流所致，初起氣血鬱滯，可以內消，依據症候，用疏瀉風熱，通利臟腑等施治。氣已結聚，則宜托裏，膿未成者，使膿早成，膿已潰者，使新肉早生，血氣虛者，托裏補之，陰陽不和，托裏調之。從治病必求其本著手。外科正宗乃宗“齊德之”之說而更有所發揮，以初起宜消，已成宜托，潰後宜補，以確定外科消、托、補三大法則，並謂脈虛病虛，首尾必行補治，表實裏實，臨時暫用攻方，是三法之外，更具活用與實用。

消法——三大法則中，消法是外科主要治法，當腫瘍初起，尚未形成膿之時，應及時以內消方法配合外敷處理，使腫消之無形，可免去一切痛苦，由於致病之因不同，所見症狀亦各異，應審因辨證，靈活以不同之法，如有表邪者宜解表，裏實者通裏，濕阻者，理濕，熱毒蘊結者清熱，寒邪凝結者，溫陽通絡，痰凝堅結者化痰軟堅，氣滯者理氣，血瘀者化瘀和營，去其因，治其源，皆屬內消方法。又如患者體質之強弱，瘡瘍所在之經絡所屬亦須兼顧，如體虛凝滯不消者，則兼補益之法，藉以推動氣血之力，使氣血暢行而凝滯化解，外科中消法用處極廣，初用得當大都能消，即使消之不去，釀膿未熟之時，亦可應用，能使移深就淺，由大化小，提早局部化以利剖切引流。

托法——腫瘍初起失於早治，或消之不去，則氣已結聚，勢將化膿，此時若患生日久而氣血漸虛，則毒邪深沉散漫，不能起發高突，難于潰膿，或則蒸膿緩慢，均為正虛邪戀現象，應用托法，以扶正托毒，使邪盛者不致膿毒旁竄，正虛者得免毒邪內陷。

膿為氣血所化，腫瘍膿成之時，如正氣旺盛，則易膿易潰，祇須助以透托，使膿暢泄即安。如正氣不足，則蒸膿緩慢，難潰難腐，是以正虛不能蒸腐成膿，而難于起發者，見局部平塌，腫勢散漫，或潰後堅腫不退，膿水清稀，或身熱食少，神疲面㿠等虛象者，皆應扶正去邪托毒消腫，且每多與清熱和營等法同用，正氣虛甚者，又須酌加參耆以扶正氣，使膿毒外泄，邪去正復。

補法——外科中無虛象者，甚少用補，一般瘡瘍潰後，配合外治，膿去即安，如腸胃正常，稍事休養即能復原，不須用補，尤以毒火未清而見虛象者，亦不宜補，補則助邪復燃，或留邪生變。慢性症候或年高體弱，潰後如見面白神疲，膿水清稀，新肉不長，瘡口難斂者，皆為正虛現象，如氣虛者益其氣，血虛者補其血，陽虛助陽，陰虛滋陰，肝腎不足者滋養，脾胃虛弱者調理，論證用藥，益其不足，使氣血充沛，助養新肉生長，加速痊愈，亦是一法。

外治：外治之法發源最早，在人類尚未了解人體構造，內科學識以前，即有若干外治方法，周禮已有祝藥剗殺外治方法，內經成書時，已有剖切膿腫之專用工具鉞針。以後隨著醫學之發展，外治法不斷增加，達數十種之多。基於外必本於內，知乎內以求乎外之說，除輕淺之瘡瘍單靠外治即可收效外，大症重候，都必內外同治或數法并用，約略舉之，可分為：膏藥、藥膏、圍藥、止血、薰洗、以及手術治療等等。

膏藥，古稱薄貼，是將配方之藥物，經煎熬或搗搗而成，瘡瘍之消腫、潰瘍之提膿拔毒，去腐生肌，保護瘡口，都不可缺少，甚則外貼去風寒、和氣血、止疼痛等。膏藥之種類繁多，如太乙膏性偏寒涼，能清熱解毒，都用于陽症，陽和解凝膏性偏溫熱，能溫經散寒，祛風和絡活血，都用于陰症，千搗膏性涼，能消腫止痛，提膿去腐等。余則用麻油一斤，紅丹六至八兩（冬六夏八），煎熬成單純膏藥，攤製後，視病情之需要，腫加消散藥物，如雄麝散、紅靈丹，潰加生肌散等，臨用時摻于膏上貼用，冀求消散或生肌收斂。

藥膏是以動物油脂，植物油，蜂蠟或凡士林，加入配方藥物調合而成，如沖和膏，消腫軟堅，疏風祛寒，活血止痛。回陽玉龍膏能溫經散寒，活血化瘀，都用于陰症。生肌玉紅膏用于腐未脫、新肉未生，或日久不愈等症。生肌白玉膏都用于膿腐已盡、瘡口難斂。黃連膏能退熱消腫，潰瘍都用之。藥膏與膏藥功用一致，甚則可以替代膏藥，尤以鼻竇、耳竇、肘膝高突部位及凹陷處所、大面積瘡瘍等，用藥膏較為妥貼，近年來，有日漸替代膏藥之趨勢。

圍藥，又名敷藥，最為普及者，乃如意金黃散，見瘡瘍主治方，論如意金黃散說。

止血，潰瘍出血用桃花散，創傷出血則如聖金刀散、鐵扇散等。

薰洗都由具有清熱解毒消腫止痛、疏通腠理、調和氣血或祛腐生新作用之藥物配合組方，如瘡瘍初起，冀其消散，可選用歸湯腫湯、洗毒湯。潰後則宜疏通氣血、祛腐生肌，用豬蹄湯，痔瘡亦可薰洗，皮膚亦可薰洗。手術另詳。炙參考炙法。

內服蟾酥丸，外將神燈照

凡瘡初起，經診斷，能炙則炙，禁炙則不可。得汗解是指解表之法，蟾酥丸解毒發汗，疔瘡都用之，萬靈丹截解風寒，惡寒身熱，表症未盡者皆可用，一般解表參考解表法。

神燈照法是實功首創之一種補助治療方法，屬炙治範圍，當時民間一般居室簡陋，尤以天寒地凍季節，深具實用需要，類似現代之局部照射治療，近今治法日趨完善，生活環境亦已改變，此法亦隨之淘汰。

用膏貼頂，敷藥四邊

凡陽性腫瘍，一般都用太乙膏蓋貼，功能清熱解毒，活血止痛。六七天後，如濕火為病之疽，應都已見膿，換膏一日一二次，膿多時可增至三四次。葱湯溫洗，一日一二次，葱，氣味芳香，能殺菌而助消腫，當時已注意到局部消毒，都屬正治之法。六七天後瘡仍不高腫，瘡頭無膿，乃屬鬱火為病，“化腐紫霞膏”性烈含砒，有腐蝕作用，體質皮肉堅厚處，偶而可用。今都習用“雄麝散”“九一丹”等性較緩而亦能提膿拔毒。若二十日以後尚無膿者，可能已現內陷諸證，按照內陷治法，亦可能回生。

瘡之四周應否需用敷藥，端視須要與否而定，腫瘍應防化膿，以消散為優先，如四周熱度較高者，酌可用敷，如溫度不高，則須防冰凝肌肉，不可涼敷，潰後膿去即安，腫熱即退，往往不須圍敷，非化膿性之瘡瘍，如流火、天泡瘡等，初起用敷藥退熱散邪，乃外治法中之主要治法也。用溫煖時，亦得注意，癰疽皆係火毒生，不能用溫以助火。

氣盛兮頂高而突，血盛腳根束

氣血盛即正氣足，正強邪弱則病得消散，或自深移淺而愈，外科疾病之發展，正氣不足是主要因素，正氣不足則衛表不固，臟腑虛弱，從而外感內傷之邪得以侵害，導致氣血不行，營衛不從，隨著陰陽之偏勝偏衰所屬，出現臟腑失調，經絡阻隔、氣血凝滯等變化，而有病發表裏內外之別。

衛氣營血辨證是引用溫病學說以治療外症中之疔、疽、熱瘡等急性化膿性疾患，癰疽原是火毒生，與內科治療急性熱病類同。營衛氣血是富有營養精微之物質與動力基礎，是維護人體生命機能之泉源。氣有先天之元氣與水穀生化之精氣，充養全身，推動及維持人體各種組織機能正常活動之動力。衛氣有溫煦臟腑、肌腠、啓閉毛竅之功能，具有捍衛肌表，抗御外邪作用，營氣為運行于脈管中之精氣，與血共行脈中，化生血液，營養全身，血則賴氣之動力循行全身，以營養臟腑、肌腠、筋骨等，為人體進行各種活動之物質。且營衛氣血之間關係密切，衛以助營，營以

資衛，氣以生血，血以養氣，相互生化，相互依存。故氣道通，則營衛不失于常，營衛不和，則氣血運行不暢，而臟腑以至肌腠，筋骨失于濡養，必將影響各種組織功能活動而致病。

衛分證候——發熱、微惡風寒、無汗、頭痛、全身痠楚，脈浮數。局部腫痛，皮膚微熱，都見于急性瘡瘍初期，毒邪在表之際。如不能及時消散，即可轉入氣分。

氣分證候——發熱重、不惡寒、或寒戰高熱、汗出不退、口渴煩躁、呼吸氣粗、溲赤便結，舌紅苔黃，脈象洪數，局部腫痛加重，皮膚紅熱明顯，化膿時較為顯著。一般在膿泄之後，即能熱退身涼、證候消失，不再傳入營分血分。

營分證候——高熱稽留不退、口渴反不甚、煩躁不安、皮膚斑疹，甚則神昏譫語、舌紅絳、苔黃糙、脈細弦數。此症常見于邪毒熾盛，正氣不能支持，而邪毒擴散或內陷，或因正氣虛弱，邪毒乘虛內陷。

血分證候——則見高熱、面赤油紅、煩躁不安、譫語發狂、痙攣抽搐、斑疹顏色深紅或有吐血、便血、衄血等證，舌質乾絳、無苔或灰黑、脈細數，此症見于急性瘡瘍邪毒擴散或內陷，甚則由於熱極傷陰，陰傷陽竭，邪毒內閉，陽氣外脫。治療之法，近多採辛涼解表，清氣泄熱、清涼解毒，涼營清熱，清心開竅等法。

高腫起者，忌用攻利，平塌者，宜投補托。

凡瘡初起時即高起者，為陽症，發于表，應托裏促其快速排膿，忌用攻伐之藥，是指濕火為病之痘，是正治，若屬癰，則初起正氣未虛可用攻伐，以消為貴。初起不高不赤，平塌散漫者，應視症候之類屬而定治法，屬寒則溫中托裏，脾虛則健脾，正氣虛者酌可扶持正氣，可使邪去而不傷正。有變症時，視變症之情形而改治療之法。

內熱甚者，量加消毒清劑。

外科內治法以消托補三大法為疾患初期、中期、後期之主要治法，但受病之原因不一，所見症狀各異，因而治法亦多，近代外科醫家總結前人之法，以內治八法為綱，加以整理，作出常用法有解表、通裏、清熱、理濕、和營、祛瘀、理氣、溫經、通絡、化痰、軟堅、補益、和胃等十二種。

(一)解表即汗法，是以發汗之藥物，用以開泄腠理，使留于肌表之邪，隨汗而解，即『經云』“汗之則瘡已”之意，常用于因外感表邪所患瘡瘍初期，邪實在表之時，能解表邪，且具消散作用。可分辛涼解表及辛溫解表兩種，如外感風熱所致，證見發熱、微惡寒，局部紅腫焮痛，兼有口渴、無汗或有汗不暢、溲赤，舌薄白脈浮數，宜辛涼解表，常用方銀翹散，牛蒡解肌湯。如外感風寒所致，證見惡寒甚而

熱較輕，局部腫痛，伴有頭痛身疼，無汗不渴，舌薄白脈浮緊者，宜辛溫解表，方用荆防敗毒散。腫瘍膿成及已潰之後，有外感表證者，亦可用解表之法，但此時應從正虛挾表論治，以顧正氣為先，稍用輕疏之品，中病即止，使邪去而不傷正，如過汗，能使正氣更虛，導致亡陽損衛或引起瘻厥之變，即『傷寒論』所云“瘡家不可發汗，汗出則瘻”之義。

(二)通裏即下法，實則瀉之之義，用通腑瀉下之藥物，通利大便，蕩滌腸胃，使蘊積臟腑體內之邪毒，得以疏通而出，常用于瘡瘍早期而有熱毒入裏，內結便秘之實熱陽證，以達內消或衰其燎原之勢為目的。分攻下與潤下兩種，如確為裏證實證之瘡瘍，症見高熱煩躁，口渴飲冷，腹脹便秘，脈沉數有力，舌苔黃膩或糙，為瘡瘍毒熱熾盛，邪熱在裏，宜攻下通裏以清熱瀉火，方用內疏黃連湯或大承氣湯，大黃牡丹湯。如見津液不足，脾約腸躁，大便秘結，患者陰虛火旺，口乾食少，舌乾面紅，脈象細數，是為津枯便秘之證，則宜潤下通裏，增液泄熱，方用潤腸湯，或兼塞法。又如表邪未解而裏實已成，則表裏同病，此時宜先解其表，或表裏雙解，防風通聖散為汗下兼施之方，選而用之。瀉下之法，以邪去為度，又須注意年高體弱，婦女妊娠，經產等等，免傷正氣。

清熱是以寒涼之藥物，用以瀉火解毒，屬實火熱毒之瘡如疔瘡癰疽皆可用之，約分清熱解毒、清熱瀉火、及清熱涼血三種。如症見紅腫熱痛、惡寒發熱、或高熱不退，舌薄或黃，脈數火盛之證，宜清熱解毒，方用五味消毒飲，如見高熱而汗出不解、口渴喜飲，舌苔黃膩或糙，脈象洪數者，為熱毒熾盛，宜清熱瀉火法，以苦寒瀉火，清氣分之熱，方用黃連解毒湯。如瘡瘍焮紅灼熱，高熱煩躁、口渴少飲，舌質紅絳，脈數者，為毒入營血，宜清熱涼血法，以涼血解毒，清血分之熱，方用犀角地黃湯。因實火熱毒之證，證狀不一，常可數法相互配合施用，又如疔瘡走黃，大疽毒陷時，其勢鶻張而變化極速，熱入營血，於涼血清熱之中，應重用解毒之品，始能挫其熱勢，透其毒邪，至於并見神昏譫語，昏厥不醒者，則於大劑涼血之中，加用安宮牛黃丸，或紫雪丹以清心開竅，除心肝之熱。如火熱之邪不能速解，則內灼傷陰，陰液損傷，能見虛熱，則選用增液湯之類，以養陰清熱生津，外瘍中之瘰疬等陰虛疾病，常見舌光脈細，虛火上炎，并有潮熱不退，虛煩不眠等症，則以清骨蒸潮熱，滋陰降火調攝。清熱解毒之藥，苦寒傷胃，中病即止。

(四)利濕是以化濕或淡滲藥物，以祛除濕邪為目的。濕邪粘膩而凝滯難化，又能生熱化火，是以濕熱之證為多，並易兼挾他邪為病，挾風者為風濕，挾寒者為寒濕。利濕法大抵可分清熱利濕，祛風勝濕及散寒化濕三種。濕熱下注之病都生下肢，局部灼熱疼痛或焮紅成片，口渴少飲，小便短赤，舌苔黃膩，脈數者，以清熱滲濕

，方選五神湯，平胃散，萆薢化毒湯。風濕相搏之證，局部關節疼痛，惡風身熱，舌白膩，脈浮細或沉細者，以祛風勝濕法，散風祛濕，方用羌活勝濕湯。如寒濕內襲，證見局部筋骨疼痛，不紅不熱，惡寒身熱，舌白膩，脈緊，用散寒化濕法，以溫經散寒而化解濕邪，方用獨活寄生湯。臨床基於濕先下受，故多用淡滲利尿之品，使濕邪自小便外出，兼按濕邪留滯三焦論治，上焦宜化，中焦宜燥，下焦宜利之法，配合運用。又濕熱易傷陰津，而利濕之品，每多傷陰，故陰虛體弱，津液虧損者慎用。

(五)和營是用調和營血之藥物，促進血行流暢，使腫者消散，成者透膿，潰後易斂，大抵可分活血和營與益氣和營兩種。活血和營都用於內消或潰後腫勢未退者，方用消毒聖神湯。益氣和營法適用成膿及潰後，方用四妙湯。和營常與理氣通絡等法同用，宜溫宜清，隨證使用。

(六)祛瘀是以活血破瘀藥物，以疏通瘀滯，使筋絡血脈得以流暢，而達消腫止痛目的，且常配合清熱理氣、溫經通絡等法同用，參考方桃仁四物湯、活血散瘀湯、大黃牡丹湯。

(七)理氣用疏導行氣之藥物，調和氣血，行氣解鬱，止痛消腫之用。外瘍之生，因於氣血凝滯者多，氣為血帥，血隨氣行，氣行則血行，氣滯則血凝，腫瘍初成，內消方中，大都配合應用，即補益、理濕、活血、通絡方中，均可配用，可增推動之功，尤以屬情志內傷諸症，因肝氣鬱結，氣機不利而致之氣鬱血結，脈絡不暢，形成腫塊，隨喜怒而消長，亦應以理氣疏肝，則氣機流暢而鬱結之滯隨之而解。參考方木香流氣飲、逍遙散、其他如金鈴子、延胡索、木香、乙金、香附、枳殼、佛手等都屬常用之理氣藥物。

(八)溫經通絡法能使陰寒凝於經絡之邪，得以溫煦而散，分溫經通陽與溫經散寒兩種。寒痰凝於筋骨，局部漫腫痠痛，不紅不熱，身形畏寒，舌白脈沉細或遲等體虛內寒之證，宜溫經通陽，溫散寒痰。如寒濕侵襲經絡，局部漫腫痠痛或隱痛，不紅不熱，惡寒身熱，舌白膩，脈濡緊或沉等體虛外寒之證，宜溫經散寒，溫通經絡，調和營衛，以去寒濕蘊滯之邪，常用方陽和湯，桂枝加當歸湯，大防風湯。如寒邪深著日久者，則寒極化熱，勢將釀膿時，應用扶正托毒，以及陰虛有熱者，溫燥辛熱之品，均能助火劫陰，均非所宜。

(九)化痰法都用於風熱實痰，用祛痰藥物，化其痰濁，疏其氣機為治。分疏風化痰、燥濕化痰兩種。風熱挾痰之證，都患生上部頭頸等處，風性上行，來勢迅速，結塊腫痛，寒熱交作，治宜疏風化痰，疏解外邪，清熱消腫，治療及時，消腫極快，方用牛蒡解肌湯增減。如濕痰鬱滯之證，都生胸肋等處，結塊高腫而軟，形寒身

熱，舌厚膩或白膩，脈多濡數，則以健脾和胃，順氣除濕而化痰濁。方用二陳湯加味。腫瘍初起配合理氣活血藥同用，熱則配合清熱藥同用。

(+)軟堅法都用在虛痰凝結之證，是用軟堅藥物以滌痰祛堅，通帶散凝，而達化散消腫。都用於結塊堅硬，體虛或情志所成之慢性腫瘍。亦分解鬱軟堅與養營軟堅兩種。如局部結核堅硬，皮色不變，時有刺痛或不痛，舌薄白少津，脈弦數，則以解鬱軟堅，治從疏肝理氣，以散堅結，方用逍遙散、消癰丸。如潰後膿水清稀，或流血水，局部堅腫不消，並見形削神疲，脈弦細或細數，舌淡苔薄膩或光，治應扶正養營，化痰軟堅，方用香貝養營湯。軟堅法都用在慢性疾患，病程長，大多氣血久鬱，形氣俱虛，都不耐攻削，即或虛象不顯，亦宜隨時兼顧正氣，以扶正祛邪，慢慢圖治，否則元氣反弱，易使惡化。

(-)補益法在外科，一般輕淺瘡瘍，即使潰後，亦不需應用。但如涉虛，虛則補之，亦屬一法，約分溫補、清補、平補三種。溫補亦稱溫陽，以溫熱之藥物，補養陽氣不足之證，陽虛之瘍，證見局部平塌、腫塊散漫、色白不紅，成膿化腐緩慢，潰後肉色灰暗，新肉難生，精神倦怠，畏寒肢冷，食少自汗，便溏等象，以溫補陽氣而培元為治，各臟之陽，均賴腎陽以溫養為法。桂附八味丸為溫補腎陽，治命門火衰之首方，如遇過服寒涼而傷胃氣者，寒氣內淫，飲食少思，大便溏薄，或潰瘍膿水清稀，陽氣脫陷者，則宜托裏溫中湯，以升陽溫中，則津液自生，而諸症皆退，為外科陽虛大症之主要治法。清補亦稱滋陰或養陰法，用清補養液藥物，以滋養陰液不足，或陰虛火旺之證。陰虛之體所患瘡瘍，局部綿軟漫腫，膿水淋漓，形削消瘦，口乾咽燥，腰膝萎軟，或潮熱盜汗，耳鳴目眩，舌紅少苔，或舌苔光剝，脈象細數等，治以滋養陰血，清熱降火為主，以六味地黃丸為主方，至於骨癆等證，患生日久，常現陰虛火旺，低熱不退，津液日枯，骨枯髓減者，則以大補陰丸滋腎水而降陰火為先。又滋陰藥物多厚膩，用時須兼顧脾胃。平補是以補養氣血之藥，以補氣血不足所患諸症，如見面色㿠白，精神疲倦，食呆眠少，瘡口膿水清稀，或遲不收斂，脈虛舌淡等象，以補血益氣，使正氣得復，諸證悉退，氣虛者四君子湯，血虛者四物湯，氣血兩虛者，八珍湯雙補，並隨病情變化，靈活運用。

(-)養胃法是外科潰瘍獨立之治法，當潰瘍膿毒已泄，病勢已退，新肉不長，胃納不振者，則扶持胃氣，使胃甦而氣血充盛，則新肉自生而愈。胃為後天之本，水穀之海，氣血生化之源，肌肉所主，當外瘍潰後，邪毒漸去，氣血亦傷，此時應扶持胃氣，使納食旺盛而正氣充足，則新肉易生，瘡口易斂。如外瘍潰後，餘毒滯留而熱邪未清，津液已傷，則胃陰乾枯，口乾不食，舌苔光剝，脈細或數而無力，瘡如鏡面，收斂乏力，治則從清養胃陰為先，然後徐調理，參考方香砂六君子湯、益

胃湯。

以上諸法，供作臨床參考，常因病情複雜，變化多端，不時以數法併用，總之不執方以治病，蓋治法示人以規矩，方藥示人以方圓，能舉一反三，不拘泥於一格，始能藥到而病除也。

天水散即六一散（滑石、甘草），古法服用時都將散置碗杯中，以煎就之他藥，沖入攪和吞飲，近因滑石都採用人工製品，價格較廉，不宜吞入，以布包入煎，沉澱後飲用為妥。

末段，“又如潰瘍時，雖有口干便閉，臟腑不和，小水不利等症——為虛陽之火，非有餘可比，只宜養氣血不宜攻利”，與第一句“腫瘍時，內熱口乾、脈實煩躁，屬邪毒在內，急與寒涼攻利”是指陳腫瘍之裏症屬實、應攻利、潰瘍之裏症屬虛，只宜養氣血，外症治法中為不易之法也。

十日之間瘡尚堅，必用披針當頭點

瘡瘍結聚之初，及時施以行血行氣之治，得能腫消痛止者，則氣血通行，當可消散於無形。如結聚已成，消之不去，則每見身熱不解，腫痛日甚，此乃蒸膿之兆，膿熟當剖。疽則得膿為吉，一般濕火為病者，十日兩候已可膿盡而愈，鬱火為病者，則旬日以後見膿，腫高根紅，焮熱腫痛，膿得暢泄，三候膿淨，屬順症。如十餘二十日仍腐爛緩慢，瘡根深固，膿出不暢者，可作十字形切開，則易於排膿泄毒。元氣不定或過用寒涼，而致膿泄欠暢則健脾補托，以達膿暢速愈。時日過久而膿見稀薄者，是氣血不足，補益氣血，使正氣得復，如胃納正常，不難徐徐見效。

半月之後膿亦少，須將藥筒對頂拔

瘡至半月後，仍不腐潰，或不作膿時，用針開孔，隨將藥筒拔膿，是指深部膿腫之引流方法，一開一吸，兩法合用，是實功所創。又如農工勞力之體，肌膚抗力較強，瘡患深部，內膿已成，瘡面時有頑肉瘀腐阻隔，影響排膿時，剖切之外，尚須利剪剪去腐肉。如得黃膿紅血，則預後良好，如得紫瘀敗絮，稀水穢物則預後不良，參考刀工論膿。

頻將湯洗，切忌風吹

明朝已注意到局部之消毒等護養事項，腫瘍未潰前，每在貼膏藥或換膏藥時，都可用 艾湯溫洗，可使氣血疏通，易於消散（非潰散）。潰瘍每在換藥時，洗以豬蹄湯，尤以寒冬季節，除消毒作用外，可使瘡面溫煦，血行良好，易使腐去新生。

調節在於斯時，變生出于此候

關節者，是計時日之稱謂。外科亦以七日稱為一候，十四日為兩候，二十一日

爲三候。濕火爲病之疽，不足兩候，都可全愈、鬱火爲病之疽，三候大致可得膿勢定，至于陰寒爲病之疽，則往往以數月數年計。一般疽，如過用抗生素類藥物，能使得膿時日後延，癰如過服抗生素，及外敷月黃或碘酒等藥，如未能消散，則成膿時日，亦會後延，成不進不退狀，近數十年來，民間療法普及，是以時日之計算，古今有所不同。

治當大補，得全收斂之功

此段專論潰後調理之法，一般瘡瘍潰後大多不須服藥，所謂癰無大小，出膿即好，如須調理，以虛爲絕大多數，大瘍久病，在未出膿前，大都服用刺激耗氣藥物，待膿泄之後，脾胃正氣大傷，出現虛象時，作整體調治，爲消托補三大治法之一，氣虛者補氣，血衰者益血，兩虛雙補，腎虛滋陰，脾虛食少者健脾和胃，咳嗽有痰者，酌加鎮咳化痰，但用大補時，應注意留邪引起後患，當初潰之時，餘毒尙未清肅，雖現虛象，祇可於解毒方中酌加補益之品，中病即止。

蓋瘡全賴脾土，調理必要端詳

實功擅刀圭之法外，重視實際與理論呼應，將李東垣脾胃論納入外科治則之中，尤對瘡瘍恢復期之治療觀念，影響後世至深且遠。

冬要溫床煖室，夏宜淨几明窗

除局部應注意衛生外，已注意到病室周圍之環境衛生，療瘡換藥時，兩相配合，即病體亦應注意寒暖，腫瘍如受風寒則有礙消散，潰瘍爲風寒所襲則影響生肌收口，其他參考雜忌須知。

飲食何須戒口，冷膩硬物休餐

此乃專指潰瘍而言，一般疾患，當膿潰腫退之時，雖不需服藥調理，但氣血兩傷，食療不可缺，非有味之物，何以滋補虧損，是以在不可太過之條件下，不須戒口，少吃生冷硬物，肥膩即可。但腫瘍大瘍，以及其他證候。各有食療及禁忌等，參考雜忌須知。

癰疽雖屬外科，用藥如同內傷

說明整體觀念之重要性，今則更要求對經、產、婦、兒各科，皆須掌握，始能應付臨床複雜而多變之問題，不祇內科一科而已也。

脈虛病虛首尾必行補治

外科內治法雖以消托補爲初中後期之主要治法，但受病之因不同，症狀各異，在不同之傳變中，治療法則甚多，臨床應用時，掌握三大法爲綱，依據辨證論治之原則，靈活運用適當方法，始能獲得療效。補法爲外症後期之主要治法，若初病及潰後，其有火毒未清而見虛象者，不可大補，以清餘毒爲先，少佐補益之品，以扶

正祛邪兼顧施治，可免餘邪復燃，或毒邪留戀生變。

所謂虛不受補者，應注意是否溫寒不當？用藥過量？藥過膩滯，胃弱難于接受，或是服法不當等等。餘參考內治法則。

病要論久新法，莫善於寬治猛治

論證治病、用藥取法，要寬且廣，當猛則不可養癰成患，該緩則應顧及本元之盛衰，慎用攻治猛法。說明初病元氣未衰當用猛藥。病久則應注意邪正相拒，多方探證，徐徐圖治。

邪正之消長進退——每當疾病發生之前，正氣盛則邪不可干，正氣虛則邪易入侵，發病之後，正氣盛，邪氣衰，則病減而愈，邪氣盛，正氣衰，則病進而加劇。病情不停變動，邪正隨時消長，因而有邪盛正實、正虛邪盛、邪正相持、邪去正虛之分。

邪盛正實 邪盛爲病氣有餘，正實爲元氣有餘，邪正俱見有餘之外患，多爲陽實之證，陽勝則熱，熱甚則痛，局部可見紅、腫、熱、痛，重則始現全身高熱，煩渴陽盛等證，來勢較急，如能及時去其病邪，則正勝邪而消失，即使成膿，因正尚未虛，膿出邪去，潰亦愈速，治法以祛邪爲先，邪去即正復。

正虛邪盛 正虛爲元氣不足，邪盛爲毒邪深沉，多屬陰寒之症，腫見色白平塌，或堅硬結腫，不熱不痛，全身有畏寒怠倦等屬虛屬寒證候，初起扶持正氣，則可使邪去而不傷正，及至外潰，因正虛、氣血虧損，而無力化膿或生肌，大都遷延愈緩。

邪正相持 大都見于慢性疾患之中期，或屬急性轉爲慢性之徵象，如邪毒得泄，而正氣漸長，則漸漸向愈，若邪毒滯留，遷延竄潰，正氣愈傷，則較難痊。症狀往往虛實互見，或由正虛邪戀，或則邪盛傷正，不論屬虛屬實，必審因辨證，扶正祛邪爲正治。

邪去正虛 爲大瘍潰後所常見，如潰後膿血過多，氣隨膿泄而轉虛，證見精神不振，食少乏力，膿出而生肌緩慢，屬氣虛之象，氣虛則寒，不能溫養臟腑，久則陽氣大虛，每見面白畏寒，怠倦自汗，此爲陽虛重候，甚則引起脫陷。有因毒熱熾甚，高熱持續，則津液耗傷，後期現神疲少氣，低熱盜汗，或膿稀而肌肉難生之氣陰兩虛之象。亦有素本體虛，罹患大瘍，正虛于前，則鬱結之邪不易化解，及至後期現神怯潮熱，手足煩熱，膿水乾涸，肌肉不生之肝腎陰虛之證。亦有證見嗜臥肢冷，形瘦神困，食少倦言，瘡則灰暗低陷，膿稀或見敗絮，此爲陰陽兩虛之象。總之邪去正虛之症狀，因有氣血陰陽之不同，復有虛實陰陽之兼夾，錯縱複雜，因而扶正祛邪，調整全身功能，使之平衡，爲外科證治之大法。

藥必求標本，功莫於先醫後醫。

治病必求標本，知標者萬舉萬當，不知標本是爲妄行。

又說陽變爲陰。

外科疾患如治療失當，過服苦寒敗毒劑伐之劑，外敷涼藥太過，則陽氣冰伏，血凝不行，由陽證轉爲陰證，證見局部皮色暗黑，潰後膿水清稀，新肉不生，此種變證，因誤治而正氣受戕所致，及時投以溫運氣血之劑，外敷溫熱活血之品，血行凝解，多能轉陰爲陽，往往得救。

病變在十一日或十五日後，是指正不勝邪，有內陷之象也，正不勝邪大多見於體素不足，患生大瘍，或由潰後膿出過多而致虛，或由正虛毒邪下陷所致，常現神疲畏寒，四肢逆冷等陽氣虛弱，或潮熱骨蒸，陰虛火旺，證見膿水清稀，食少形瘦，或小便頻數等腎經虧損等狀，如虛而容補，則益氣補陽，滋陰壯腎，或溫中健脾等隨證投治，陰生陽長，腐去新生，正能勝邪，氣血漸充，亦能痊癒，若虛而不受補，敗症已成，往往危及生命。

瘡瘍發於陰，陰者寒也難治，但若調治得宜，法用辛香溫運著手，證順亦能轉陰爲陽，即邪去正復之謂也。邪去正復即順證之總稱，當外證早期氣血臟腑之壅滯積塞，得以疏通結散，則邪去正復，如腫瘍成膿外潰，膿毒暢泄，則邪衰而正氣漸長，又如火毒內陷之變證，能及時控制擴散入裏之邪，則大勢受挫而毒得外達，如遇正不勝邪之證，虛而容補，正氣轉盛則邪去，或溫熱散寒，由陰轉陽而托毒外出，移深居淺而邪去正復，均爲預後良好之象徵。

既有針工之異說，豈無線藥之品評。

凡腫瘍消之不去而確已成膿時，必奏刀剖切，古時用鍛針，故稱針膿，務使膿毒早泄，腫消痛止，漸漸愈合，如不及時剖潰，則膿毒內蓄，侵蝕良肉，旁竄流注，腐筋蝕骨，痛苦徒增，甚則膿毒內攻臟腑，即使小瘡淺腫成膿時，用托或待其自潰，亦將拖延時日，增加痛苦，但若膿腫尚未成熟而剖切，則除徒傷氣血，膿反難成外，常致胬肉翻突，膿毒擴散。

切口之大小深淺，應視膿瘍之深淺大小而定，淺則淺開，深則深切，大體而言，當下刀之時，刀鋒會有一種割切皮肉之阻力，刀則繼續切入，待阻力消失之時，即已穿破，應即時住手起刀，否則即傷良肉。刀分大中小多種，視瘍之大小臨用而選，剖取之法亦有一定，如頸部應順皮膚自然紋理切開，手指腳趾部應側切，切忌橫切，乳房部則以乳暉爲中心，呈放射形方向切等等。

動刀剖切時，必待膿熟始行之，因而估計有膿無膿，是否成熟，最爲重要，大致視局部之腫痛，焮熱及按壓瘡頂等，即可辨別。當膿腫成熟時，腫塊即變軟，中

心軟是開始化膿，全軟是已成熟，痛如雀啄，陣陣而作，是化膿之特徵，因膿腔壓力增大，疼痛觸痛亦隨之增加。膿熟之腫瘍，瘡頂必較四周焮熱，如見皮膚繩急光亮，是內膿熟透，即將自潰之象。按壓辨膿是必經之法，即使腫已軟，啄痛明顯，瘡頂紅熱，按壓還得詳細進行，膿腫有深淺，淺部膿腫祇須單指輕壓瘡頂，隨即快速離開，如凹陷即能迅速恢復，是指有膿，一般性膿腫，尤以深部膿腫，必兩指探引，習稱應指，法以兩指尖相距一二寸，放于腫頂兩端，彼此相互徐徐交接，當膿液擠向對側時，對側之指即有一種液體之衝擊感，即應指感，反復接引，直至感覺明確為止。

剖切引膿之後，必用藥線（亦稱捻子）數天，藥線用棉紙捻成線繩狀，視瘡之大小深淺，做成粗細長短不等選用，用時蘸藥插入瘡內，留部份于切口外，膏藥蓋貼，每日二三換，既可繼續引流，又可防止切口復合留膿。

開潰後又可從所排之膿色形質，辨別虛實及預後。膿為血肉所化，宜厚不宜稀，稠厚屬氣血充盛，陽症多稠膿，稀薄屬氣血虛弱，陰症多稀薄。色宜明淨，不宜污濁，膿色鮮明潤澤，即氣血旺盛，屬順證，色澤污濁晦暗，屬邪毒羈留不化，屬逆證，至於膿如積污敗漿，味有腥穢惡臭，都屬惡候險症。

如癰瘤，尤以血瘤及久延之腫，或肉紫根軟，瘡頂及四周有紅絲纏繞者，雖在按壓時，亦有應指情形，但不痛或痛覺不同，且有各症之特徵，都禁用刀針。

湯散丸丹，要在發而必中

治療外科，與其他各科相同，應持整體觀念，藉四診及辨病辨證著手，辨證要周詳，除體質強弱，病之深淺外，即習慣嗜好，以及四季氣候之變化等，都得注意歸納，如由冬入春，春季風和日暖，萬物滋長，用藥以不溫不燥為原則，入夏則天氣炎熱，人體腠理漸開，有自然表散之慣性，表散藥物宜輕劑著手，秋屬燥季，辛燥之品，宜酌量而用，寒冬則陽氣潛藏腠理至密，如需表散，非重用不為功。總以治病必求其本之原則，作出適當之治療法則。

方者方向也，用方要靈活，臨床常數方合用，或一方數用，增減化裁，是以方必詳，然藥之性味，更加重要，方藥不可缺一，設若熟方而疏藥，猶紙上談兵，即英雄亦必無用武之地也，唯藥性方劑都能詳熟，調度才能得體，運用始克自如，取捨有據，治法始活。

治在活法，貴在審詳

時代不斷進步，社會益形複雜，生活隨之改變，慢性疾患日漸增多，是以內治之法，益加重要，尤其如發現正在服控制藥物中時，應注意停藥之反應，常可兩者相隔一二小時，同日服用，待一段時期後，將控制藥物，在可能範圍內，徐徐減少

，是以某些現代藥物，雖不用，亦得加以研究，藉可減少某些不必要之物議。

癰疽陽症歌第三

【原文】

癰疽不論上中下，惟在陰陽二症推。發背雖有正與偏。要取高低兩樣看。純陽起初必掀腫。更兼身熱有微寒。頂如尖字高突起。腫如彎弓根有盤。七日之間多掀痛。二七之期膿漸漫。動息自寧食知味。二便調勻無瀉乾。腫消膿潰精神爽。脫腐生新氣血完。五善自然臻並至。七惡全無半點干。痛便隨膿減。腫退自肌寬。新肉自生紅豔豔。腐皮自斂白漫漫。一身多爽快。五臟盡和歡。此屬純陽多易治。百人百可保安全。

癰疽陰症歌第四

【原文】

純陰初起不知瘡。粟米之形疙瘩僵。不紅不腫不知痛。少熱少掀少隄防。七朝之後身體倦。瘡根平大喜澆湯。頂不高兮根不活。色不光兮腐不釀。陷軟無膿空結聚。脈浮散大細飛揚。飲食不渾身戰戰。嘗湯止許意忙忙。瘡上生衣如脫甲。孔中結子似含芳。膿多腐朽身難便。舉動倉皇韻不長。瘡形成紫黑。面色變青黃。精神昏憊多鼾睡。言語無人自發揚。口乾多舌強。痰喘定身亡。此屬純陰俱不治。百人百可到泉鄉。

【探究、按語】

陰陽非但為外科辯證論治之總綱，且為八綱辨證及臟腑、經絡、營衛氣血辨證之總綱、陰陽、虛實、寒熱、表裏，是指病患部位、性質、邪正盛衰之概括，其中表、實、熱屬陽，裏、虛、寒屬陰。是以八綱即陰陽為區分。外科辨證，大都以局部症狀為主要依據，時而亦憑藉全身症狀，因此掌握八綱辯證，更為重要。

表 指病淺症輕屬陽易治。按搖瘡腫，根小而浮者淺也在表，表實者，常見身熱、無汗惡寒。

裏 指毒深症重屬陰難治。按搖瘡腫，根牢而大者深也在裏，裏實者常見脈大身熱，便結口渴，外瘍原是火毒生，是故表與裏，都見急性腫瘍初起之時，同屬熱證範圍。

寒 腫瘍見皮色蒼白（寒凝氣滯），或青暗（寒凝血滯），皮膚冰冷，喜暖惡寒，或見形寒肢冷，苔白脈遲等。潰瘍見瘡口色青暗或淡白而無血色，膿水清稀，久不收斂，或身涼肢冷，面色青白，精神萎憊，舌淡苔白，脈細而弱等。

熱 瘡瘍之爲病，外有四時六淫之感，內有七情六慾之傷，外感六淫蘊積，無不化熱，內因七情變動，皆能生火。故外科疾患，以熱證最多，因病患不同，熱有輕重先後之別，且有實火虛火之分。實火之腫瘍，現皮膚紅赤灼熱，喜涼而惡熱。潰瘍見瘡口紅赤，膿水稠黃。全身有身熱、面紅、口渴飲冷，腑燥溲赤，舌紅苔黃，脈數有力等。虛火都見大瘍瘡潰後，由於氣血虧損，陰液不足而起，證見五心煩熱，咽乾不渴，自汗盜汗，面白額紅，脈象細數，舌紅少苔。

虛 即正氣虛，都在潰後邪去正傷，若體虛邪盛則腫瘍亦可見之。腫瘍見腫形平塌，根腳散漫，腫塊軟陷、隱痛、痠痛或不痛，久不腐潰。潰瘍見瘡口久不收斂，膿水清稀，新肉如凍色或青暗。全身症狀又可分臟腑虛、氣血虛、下虛、正虛等，臟腑虛見瀉痢腸鳴、飲食不進嘔吐無時、手足併冷、脈弱虧寒、小便自利或時艱、聲音不出、精神不爽。氣血虛見膿水清稀、瘡口不合、聚腫不赤、精神不爽。下虛見精滑不斂、赤白滯下、兩便自利、腰腳沈重、睡臥不寧。正虛見肩項不利、四肢沈重、目視不正、精神不振、食不知味、音嘶聲敗、四肢浮腫。

實 即邪盛，瘡瘍初起，毒邪正盛，正氣未衰。腫瘍見瘡形高突，根盤收束，腫塊柔硬，焮熱疼痛而拒按。潰瘍則膿出而腫痛不消，膿水稠厚或瘡口瘀癭壅塞。全身證候又可分臟腑實、氣血實、上實、邪實、臟腑實見大便硬小便澀。飲食如常，腹滿膨脹，胸膈痞悶，肢節疼痛，口苦咽乾，煩躁多渴，身熱脈大，精神昏塞。氣血實見腫起色赤、寒熱頭痛、或頭昏目黑，皮膚煩熱，膿水稠粘。上實見頭痛鼻塞，目赤心驚，咽喉不利，口舌生瘡，煩渴引冷，睡語咬牙。邪實見淤腫尤甚，痛不可近，積日不潰，寒熱往來，大便秘澀，小便如淋，心胸煩悶，恍惚不寧。

陰 瘡色蒼白青暗或不變，瘡頂不熱或涼，腫勢平塌或下陷，根盤散漫，腫硬如石，或柔軟如棉，痠麻隱痛或不痛，病深在骨，腫則不易消散，成則不易釀膿，潰後不易收斂，潰則膿水稀薄，瘡口蒼白或紫暗。

陽 瘡色紅赤，瘡頂焮熱，腫勢高突，根盤收束，堅硬而柔，疼痛劇烈，病淺在皮膚肌肉，腫則易消，潰亦易愈，潰後膿厚黃稠、瘡口紅活潤澤。

癰疽半陽半陰歌第五

【原文】

陰陽之症兩相交。生死關頭判一毫。微熱微寒微赤腫。半昏半爽半平高。脈來雖數多無力。飲食雖食便不消。腫而不潰因脾弱。潰而不歛因膿饒。大便多溏小便數。上身有汗下身焦。五善雖兼有。七惡未全逃。口渴喜茶腸腹痛。面浮饑飲足心高。心煩不穩睡。神亂怕音焦。投方應病方為妙。陰轉為陽漸可調。心通造化。爾命堅牢。違之須是神仙手。半死餘生定可逃。

【探究、按語】

外瘍之陰陽分類，易于瞭解疾病之本質，如能進而掌握陰陽互轉之規律，於不變中求變，始能體現其重要性。陰陽之辨證，應局部與全身配合，整體進行，深入分析、辨別真假，靈活運用，始能得出正確結論。

每一疾病，有其特性，有其特徵，常陰陽互見，或先陰後陽，或先陽後陰，況病有深淺，邪有盛衰，復經治療後而轉化，或由處理不當而傳變，在時變化，每能出現疑似莫辨現象，但當對每一疾病之特點，可能之變化，得能洞悉之後，自然應付裕如也。

癰疽五善歌第六

【原文】

心善精神爽。言清舌潤鮮。瘡疼兼不渴。睡醒得安然。肝善身輕便。
因煩自不煩。指頭紅活色。坐起覺平康。脾善唇滋潤。衾幘蘭麝香。凡食俱有味。膿厚更肥黃。肺善聲清響。無痰韻更長。肌膚多潤滑。大便自尋常。腎善誠為要。水升火自降。口和初不渴。小水亦稀長。

癰疽七惡歌第七

【原文】

一惡神昏憤。心煩舌上乾。瘡形多紫黑。言語自呢喃。二惡腰身強。

目睛邪視人。瘡頭流血水。驚悸是肝逆。三惡形消瘦。膿清穢臭生。瘡形多軟陷。脾敗不知疼。四惡皮膚槁聲嘶韻不長。痰多兼喘急。鼻動肺將亡。五惡成消渴。隨飲即隨乾。形容多慘黑。囊縮腎家端。六惡身浮腫。腸鳴嘔呃頻。大腸多滑泄。臟腑並將頻。七惡瘡倒陷。形如剝蠶同。四肢多逆冷。血水自流通。

【探究、按語】

五善七惡係指臟腑之正常與失常，屬一種預後學說，具參考價值，實功將之整理，編成歌訣，便於記誦。五善指臟腑未為毒邪所犯，所敍皆五臟正常現象，如精神爽健、情緒安定、語言清楚、聲音響亮、氣息和平、活動輕便、夜能安眠、飲食正常、兩便調和、身無寒熱、皮膚潤澤、指甲紅潤、口齒不乾、腫則易消易成、根盤收束、舌色鮮明、潰後膿稠色黃、味不臭穢。七惡是臟腑已受毒邪侵犯，而功能紊亂，甚而衰竭，所敍皆失常現象，如：神志昏迷、煩躁不安、譫語聲嘶、喘急痰多、甚則鼻煽、身體強直、形瘦囊縮、雙目直視、驚悸不眠、不食嘔吐或呃逆，腸鳴泄瀉、午後身熱、皮膚枯槁、面容慘黑、浮腫、肢冷、口乾舌燥、消渴引飲、腫則腫塊堅硬、瘡形倒陷、瘡色紫黑、潰流血水、膿水清稀、或有臭味。

一惡指毒邪攻心。心主神明、毒陷心包、則神明不清、故心煩神昏、言語呢喃、舌為心之苗、毒邪傷津、則舌苔乾燥、心主血脈、心氣不足、血脈瘀滯、毒氣不化、故瘡色紫黑。

二惡指邪毒傷肝，肝主筋，火毒傷肝，灼傷陰血，血躁風動則身筋強直，肝開竅於目，陰血耗傷，不能上榮於目，故目睛不明，目不正視，肝藏血，邪毒傷肝，肝火妄行，則瘡流血水，肝藏魂，肝病故驚悸不寧。

三惡指毒邪損脾。脾為中樞，主運中焦，為氣血生化之源。脾病則運化無權，故飲食不進，脾主肌肉，氣血乏生化之源，肌肉失養而身形消瘦，膿為血肉所化，氣血虛則膿水清稀，脾氣虛不能托毒外出，則瘡形下陷。

四惡指毒邪犯肺。肺主皮毛，熱毒熏灼，津液耗傷不能滋潤肌膚。故皮膚枯槁，肺主氣，氣喘鼻煽，係肺氣壅塞，氣道不利，肺中津液膠結不化則痰多。

五惡指毒邪戕腎。腎脈挾舌本循喉嚨，熱毒煎熬，腎水枯竭，不能上榮，故口渴引飲，咽喉乾燥，面容慘黑，為腎色現于面。前陰屬腎，囊縮為腎絕。

六惡，腎為先天之本，主水液，脾為後天之本，運化水濕。危重、瘡瘍後期，身體浮腫，非脾虛水濕泛溢，即腎氣衰竭而水邪不能輸泄。腸鳴、滑泄、嘔吐、呃逆，均為脾敗現象。

七惡，人以氣血為本，氣為陽主溫煦，血為陰主滋養。病危之時，則陽亡陰竭

，瘡形倒陷，潰爛無皮如剝鱗，時流污水，爲陰血乾枯。四肢厥冷、是陽氣衰竭。

善與惡之出現，雖有“五善見三即吉、七惡有二即兇”之謂，但某些症候雖已見惡證，如治療得當，配合相宜，亦能兇中變吉，又雖見五善，若失於調治，多勞疏養，也可吉內生兇。

治病則例歌第八

【原文】

外科之瘡有治例。說與君家須切記。病端百出別根因。方法一囊豈同類。熱與寒。通與閉。其中消息知端的。通多不足閉多餘。熱實寒虛分症治。陰似陽。陽似陰。似中妙理要推尋。不分表裏一例治。輕變重而重變亡。醫者貴乎多應變。不可偏執用其方。且如表症惡寒。宜用荆防敗毒散。裏症發熱。可將內疏黃連湯。瘡勢已成。托裏消毒散。誠爲正法。內膿將潰十全大補湯。最得相當。人參養榮湯。治潰後虛熱發作。木香流氣飲。散結腫寒濕爲殃。飲食不甘。定用香砂開胃。精神怯少。須將參朮回陽。陰虛須八珍。最爲要領。盜汗自汗。得獨參一味可強。潰後多疼。乳香定痛散。功奇莫緩。脾虛下陷。補中益氣湯。功效尤良。口燥諳言。瀉實火。須黃連解毒湯。心煩衄血。理虛陽。必犀角地黃湯。古法治癰疽。稱述仙方活命飲。今時醫發背。還期神授衛生湯。蟾酥丸。在外科稱爲獨品。護心散。解內毒號曰無雙。詎知蠟礬丸。護膜護心。可羨淡中有味。還讚玉紅膏。生肌生肉。堪誇表裏呈祥。身涼自汗。腹痛腸鳴嘔逆。豈逃異功散。睡臥不寧。虛陽發燥膿多。定用聖愈湯。生脈散接虛羸。脈來微細。歸脾湯。除驚悸。睡得安康。竹葉石膏湯。治虛煩身熱者。何須疑慮。麥冬清肺湯。除膈熱有痰者。毋待商量。金鯉湯。治肺癰吐膿氣急。元龜丹。攻結毒臭腐頑瘡。風熱生瘡。通聖散。瘡瘍狂燥。破棺丹。小柴胡湯。除客邪往來潮熱。大防風湯。攻腿膝寒濕爲殃。咽腫咽痛。定用清咽利膈散。斑紅斑紫。豈逃化斑解毒湯。八味丸。療口乾妙藥。二神丸。治脾泄奇方。香連丸。爲臟腑瀉痢通用。甘露飲。治口齒腐爛相當。六和湯。和脾止吐瀉。雙解散。解表理內傷。逍遙散。善治女人諸症。保元湯。當扶赤子多傷。皮膚毛髮乾焦。蘆薈丸效應甚捷。咽喉口齒腫痛。冰硼散功實非常。滋腎丸。治下元腎虛不固。

涼膈散。解上焦膈熱多煩。九龍丹。消魚口。吞之滅迹。二蛟散。行溼腫。服下安康。呂祖一枝梅。止痢定驚。稱爲仙藥。真君妙貼散。消疼止痛。號曰神方。痔漏瘻瘍疗毒。古誇三品錠。瘻疽流注諸風。今羨萬靈丹。柴胡清肝湯。治鬢疽肝膽有效。黃連消毒飲醫對口督脈尤良。小兒口內生瘡。必用人中白散。大人咽喉腫疼。將須金鎖匙湯。下疳新久。珍珠散。小便淋漓。木通湯。玉真散。破傷風最效。復元湯。跌撲者稱強。提肩散。治脅膊強直作痛。拈痛湯。除痛腿風濕相傷。小便生瘡。龍膽瀉肝湯可羨。大頭腫痛。普濟消毒飲何妨。便毒懸瘻。內消散吞何足慮。腎癰腿病。耆柴湯下自無殃。又有女子陰瘻。能腫能疼能作瘻。在人活法。或消或補或蟲妨。蓋男子之囊瘻。瀉肝經之濕熱。小兒赤遊丹。解毒麻砭血。凡治楊梅瘻。戒薰爲至切。舌下發痰包。利翦方能泄。出如雞蛋清。消痰是真訣。結毒與頑瘻。紫金膏可設。風瘻徹骨癢。雄黃散效絕。疔瘻先刺血。內毒宜汗泄。禁灸不禁針。怕綿不怕鐵。又有失榮腫。堅硬如岩凸。強陰失道症。形狀要分別。婦人之乳岩。此中一例決。未破肉嶮增。已潰流臭血。如此幾般症。古今無治法。瘻有幾百種。難以都陳白。惟在一點心。何須三寸舌。學者要精靈。萬事皆通徹。此雖粗糙歌。學者宜細閱。

【探究、按語】

計介紹方劑六十六例，有內服，有外用，但一如文中所云。醫者貴乎多應變，不可偏執用其方，方藥祇示人以方圓，備作參考而已，如表證惡寒，應分辨風熱風寒，風熱宜辛涼解表，風寒宜辛溫解表；裏證發熱，亦有輕重之別，重則攻，輕則潤。內膿將潰，以刀剖爲宜，補則應非其時。自汗用獨參，今參之種類繁多，宜斟酌選用，盜汗則應加收斂藥物，如龍骨牡蠣黃耆五味白芍之類。仙方活命飲與神授衛生湯，有加減之別、無古今之分。下疳新久、珍珠散、小便生瘡、龍膽瀉肝湯、是同一病症，前者指外用，後者指內服。其他參考治法，常用法以及分論各論。

癰疽灸法並禁灸瘻穴第九

【原文】

凡瘻初起。惟除項以上。餘皆並用艾灸。隨瘻勢之大小。灸艾壯之多少。用蒜切成薄片。安於瘻頂上。著艾炷蒜上點火。三壯一換蒜片。初灸

覺痛。以不痛似癰爲止。初灸不痛。以知痛癰爲住。如初灸全然不覺痛癰。宜去蒜炙之。又陰瘡日數多。艾炷恐不及事。以蒜搗爛鋪於瘡上。以艾亦鋪蒜上。點火炙之。火氣方得入裏。必知痛甚爲效。知痛深處方是好肉。蓋艾火拔引鬱毒。透通瘡竅。使內毒有路而外發。誠爲瘡科首節第一法也。貴在乎早炙爲佳。又有禁灸數症。最宜參詳。頭上諸陽之首。純陽無陰之處。凡生瘡腫。俱是亢陽極熱所致。如再加艾火。使毒氣熾甚。隨後反加大腫。最能引動內痰。發之必死。面生疔毒亦然。又有腎俞一穴。在於兩腰脊旁。係內腎命根所係之地。此穴發瘡。多因房勞素虛。腎水枯竭而成。若再艾灸火燼其源。必致內外乾涸。多成黑陷。昏悶而死。又有患元氣素虛。發瘡多不高腫。其人身體必倦怠。精神必短而昏。脈必浮散空虛。數而不鼓。此內無真氣。抵擋火氣。如灸之。其人必致昏憊而死。或謂艾火不虧人。此言貽誤多矣。醫者亦宜詳察。

【探究、按語】

灸法在瘡瘍，初可助消散，成則拔引鬱毒，潰後補接陽氣，促使收斂。都用於腫瘍初起，及陰寒爲病之疽，陽氣虧虛，難以起發，須化陰爲陽，托毒外出，或潰後膿水清稀，肌肉難生，久不收斂之時。

灸法甚多，以艾灸最爲普及，因艾葉具溫經通絡、行氣活血、祛濕逐寒、消腫散結之功。一般癰疽，每日灸三五壯，陰疽可二三十壯，年青體壯可增，年高體弱應減。凡屬實熱純陽瘡瘍，以及頭面頸項等處，宜慎用或不用。以不痛灸至痛，瘡疼灸至不疼爲灸治原則。又灸與針常可合用，先針後灸，或先灸後針，參考針灸法則，臨證靈活運用。

論症生死法第十

【原文】

初生如粟。裏可容穀。外面如麻。裏面如瓜。外面如鍊。裏面如拳。起勢大而終無害。未老先白頭。無膿軟陷休。瘡從疙瘩起。有膿生方許。膿漬氣昂昂。不治自安康。根高頂又尖。八十壽還饒。掀腫易腐爛。任大終無患。瘡高熱掀疼。雖苦必然生。瘡軟無神氣。應補方爲益。肉腫瘡不腫。畢竟生疑恐。膿穢不進食。泄瀉黃泉客。瘡色豬肝紫。無膿必定死。綿漬不腐爛。內怕葡萄嵌。仰臥不知疼。陰症命難生。腐盡有敗氣。笑裡

終生淚。根散瘡平塌。神仙無治法。久病目露神。畢竟命難存。面忽似塗脂，十日後分離。敗中有紅肉。雖是生門路。新肉如板片。不食終須變。手足皮枯槁。血敗生難保。唇白眼無神。腹脹瀉將傾。淹氣不滯氣。雖重多生意。眼眶黑氣濃。癰疽怕此逢。房中香馥馥。是病終爲福。瘡熱身微熱。輕病何須說。生死此中求。片言便可決。

【探究、按語】

1. 初生如粟，但還有如殼之瘡頭可見，外面高腫如麻，裏面腫硬如瓜不堅，外面雖腫如鐵，裏面腫硬適度，瘡起雖大，屬陽證順證，預後都良好。
 2. 瘡頂先見白頭，無膿而軟陷，如在兩候還未見高突見膿，屬逆證，防內陷變端。有膿即轉爲順證，膿泄後體力飲食正常者，不治而愈。
 3. 根盤收束，腫高頂尖，瘡腫易腐，紅赤熱痛，雖大，屬順證，不慮後患。
 4. 瘡軟而陷，精神乏善，應補托。肉腫瘡不腫應注意觀察，是否病尙未現，但如初病腫而不痛，且癰者，可能外中毒或蟲傷。
 5. 腫穢惡臭，不食加泄瀉，是脾敗，七惡之一，瘡色紫如豬肝而無膿，如在下肢，臘瘡亦常見紫黑，一般癌症之後期都見紫暗，則屬逆證，預後不良。
 6. 綿漬不腐，瘡內似葡萄紫色而軟，屬惡候逆證，或病患兼有嚴重消渴症者。仰臥不能轉側，不知疼痛，是脾敗逆證，且已至危險時刻。
 7. 腐肉雖盡，而有敗濁之氣，屬惡候逆證。根盤散漫瘡頂平塌是內陷或毒邪走散之象。
 8. 久病不愈，雙目炯炯是臟腑已敗。而忽似塗脂，是陰竭陽絕之徵兆。
 9. 敗腐之中，雖有紅肉，但肉不潤澤如板片然，加以不食，亦脾敗之象，屬逆證，終須防變。
 10. 四肢皮膚枯槁，係血敗肺損，唇白眼無神，腹脹且泄瀉，是血枯肝腎脾胃已敗，屬逆證。
 11. 淹氣即醃酸氣，味雖異但未壞，滯氣乃腐壞之氣。眼眶黑氣以及面黑等，都屬腎色上面，惡逆現象也。
 12. 痘室香馥，瘡瘍焮熱，身有微熱，皆順證。生死即順逆，歸納如後。
- 順** 初生如粟，但有頭，根高頂尖，焮腫疼痛，微有身熱，外腫雖堅硬，按壓卻適度，無論瘡腫大小，祇須得潰有膿，雖有淹氣而無滯氣者，都順吉。
- 逆** 未老先白頭，肉腫瘡不腫，根腳散漫堅硬，瘡頂平塌。綿漬不腐，無膿軟陷（軟而乏神屬虛）。瘡色紫如豬肝，膿穢不食腹瀉，敗腐之中雖有紅肉，但新肉如板片，腐盡而有敗惡之氣。病久雙目露神或兩眼無神，眼眶發黑，面色紅似塗脂

，嘴唇蒼白、四肢皮膚枯槁，仰臥不能轉側，不知疼痛者，皆惡逆。

察形色順逆第十一

【原文】

凡看人病。兼視其形色。復與脈病相參。誠識於始。以決其終。百無一失矣。何以知之？陰病見陽色。腮顴紅顯。陽病見陰色。指甲青呈。此二者俱死。又身熱脈細。唇吻反青。目珠直視者死。面如塗脂。色若土黃油膩。黑氣塗抹者死。脣舌乾焦。鼻生煙煤。眼神透露者死。形容憔悴。精神昏短。身形縮小者死。喘粗氣短。鼻掀晴露。語言譖妄者死。循依抹床。遺尿失禁。撮空者死。頭低項軟。眼視無神。吸吸氣短者死。皮破無血。肉綻斑爛。麻木不知痛癢者死。齒黃色如煮豆。唇白板理無文。耳黑枯焦不聽。人中縮而平坦。口張氣出無回閉。鼻搘相隨呼吸行。汗出如珠不散。痰若膠而堅凝。白血紅如肺色。指甲彎而帶寄。神昏神浮。神亂神離。緇衣生滿。面黑氣慘。天庭逢之都沒命。法在此中評。

【探究、按語】

瞭解陰陽、善惡後，還未盡然，陰陽是分疾患之本質，善惡可知病痛之預後，順逆乃指陳疾病之變化；因每一疾病自局部之證狀至全身之神色情態，不時在變，變化之結果，必產生相對之順與逆，順即轉向順利，結局良好，逆即轉歸兇險，結局不良，可謂應變學說。

前篇，“論病生死法”，是以局部之證狀為主，後篇“瘡瘍看法”，是以初起，已成、已潰，潰後分順逆，本篇則以全身之神志表情、膚色體態為主，三篇都屬順逆範圍。本篇未言及順，都陳說神色體態方面之逆，歸納如左。

逆 神情煩躁，譖語直視，眼神透露，循衣撮空。面若塗脂、顴紅、面容憔悴，面色土黃，皮膚枯槁，耳枯黑、失聰，唇吻青或白，指甲青，滿面及眼眶黑氣。身形短縮，頭低項軟，人中坦平，張口出氣，鼻煽腹脹，汗出如珠，遺尿失禁。

白血紅如肺色，即血色蒼白如肺之顏色。

病有三因受病主治不同論第十二

【原文】

三因者。內因。外因。不內外因。內因者皆起於七情蘊結。又兼厚味膏粱。薰炙臟腑。房慾勞傷。虧損元氣。其病五臟受之。發之富貴人及肥胖者。有十之九。其見症瘡多堅硬。根蒂深固。二便不調。飲食少進。外軟內堅。平坦無膿。表實裏虛。毒多難出。病由內傷。故曰內因。外因者。皆起於六淫。體虛之人。夏秋露臥。當風取涼。坐臥濕地。以致風寒濕氣。襲於經絡。又有房事後得之。其寒毒乘虛深入骨髓。與氣血相凝者尤重。或外感風邪。發散未盡。遂成腫痛。其病肌肉血脉筋骨受之。發之不善調攝。寡薄勞碌之人。十有八九。見症多寒熱交作。筋骨疼痛。步履艱辛。濕痰流注。以及諸風癰瘍。口眼歪斜。半身不遂。風濕風瘻。天時行毒等症。病屬外感。故曰外因。不內外因者。內無七情于內。外無六淫傷外。其病得之飢飽勞役。喜怒不常。飲食冷熱不調。動作勤勞不息。以致臟腑不和。榮衛不順。脾胃受傷。經絡凝滯。故外無六經形症。內無便溺阻隔。其病多生於膜外肉裏肌膚之間。如瘻瘍。痰注。氣痞。癰瘤之屬。治法不必發表攻裏。只當養氣血。調經脈。健脾和中。行痰開鬱爲最善。三因之理盡矣。

【探究、按語】

人體乃一完整之機體，人體之生理機能與自然環境之變化，息息相關，各種致病因素侵襲，機體失卻協調平衡即病，局部受邪可影響全身，全身亦能外現於局部爲病，因患者稟賦強弱，罹患病因之各異，感邪之深淺不同，因而產生各種病理變化，形成各種不同症候。有云外瘍之發生“必先受于內，然後發于外”，故雖都屬局部體表爲患，實與整體密不可分。

歷代醫家，總結外科成因與發病，不離六淫外感，五氣過極均能生熱化火，七情鬱結，五志過極亦可化火，飲食房勞等亦能生濕生熱，化毒化火。“癰瘍原是火毒生”，後世以“火毒”明言瘡瘍外發之病因，實乃亦屬氣血凝滯之發展與衍變也，即“經”所謂「病之生時，有喜怒不測，飲食不節，陰氣不足，陽氣有餘，營氣不行，乃發癰瘍。」

及至現代，認爲“三因”皆屬外來，由不同途徑入侵而已，即內因亦由外因引起，主要是“正氣”內在之抗病力，始是決定疾病發生之主要內因。

調理須知第十三

【原文】

凡人無病時，不善調理。致生百病。況既病之後。若不加調治。豈能愈乎？其調治有法。初起病者。先看病者之元氣虛實。次看瘡之陰陽險否。然後用藥調治。當攻即攻。可補即補。不可因循耽誤。以致變生不虞也。且患者又當安定心神。寂忘諸念。毋使愴慌。乃保神氣不致變亂也。再順天時。假如夏熱。坐臥不可當風。忌置水於榻前床下。冬寒須避。起居常要溫和。非柴火不可開瘡看視。以致寒侵生變。又未潰之先。毒氣內作。倘有口乾渴症者。涼物須當少少與之。以解蘊熱。至膿潰之後。生冷硬物。一概禁之。不然傷脾損胃。膿必難成。致瘡軟陷。又難收斂。飲食須當香燥甘甜。粥飯隨其喜惡。毋得過飽。宜少宜熱宜濃。方無停滯。又得易化也。如大瘡潰後。血氣兩虛。脾胃並弱。必製八仙糕。早晚隨食數餅。以接補真元。培助根本。再熬參朮膏。如患者脾胃俱虛。飲食減少。胸膈不寬。飲食無味者。用白朮膏三匙。人參膏二匙。清米湯空心化服。喜飲者酒化亦可。若精神短少。昏沉多睡。自汗勞倦。懶於動作者。用人參膏三匙。白朮膏二匙。亦酒化服。如肌膚粗澀。面蒼不澤。或大便血少虛秘。及皮乾髮槁者。同地黃膏各二匙和服。或飲陽春酒更妙。此二膏強健精神。頓生氣血。開胃助脾。潤肌榮骨。其功非小。大瘡不可缺也。

【探究、按語】

當時已注意到病患精神之安慰，勿使愴慌，以保神氣不亂等心理治療，以及環境之衛生、起居之安逸如：夏熱坐臥不可當風、宜（非忌）置水於榻前床下，以解暑氣，冬要溫和，不能著涼，常因寒侵生變，人體氣血喜暖惡寒，風寒乃六淫之邪，腫瘍受之則有礙消散，潰瘍受之則影響生肌收斂。

尤以潰後飲食更宜注意，生冷硬物應少吃，否則傷脾損胃，膿必難盡（未成），當香甜適口，毋得過飽，宜少宜熱宜清（非濃），少吃多餐，方不停滯。如潰後氣血兩虛，脾胃並弱，應補養氣血，健脾和胃，以接補真元，培助根本外，且可食療，陳火腿、鮮豬肉去油清燉、河鯽魚、鱸魚清燉，都開胃且具營養。可利生肌收口。其他調理之法，參考治法。

護養之法，以往都祇醫者口述，自行處理，不久即將實行全民保險，中醫治療將改個別為集中，必將有專職護理出現，希能借鏡現代護理，使能既有傳統之特色，復有現代之內容，相配得宜，更能使病患提早康復。

雜忌須知第十四

【原文】

凡病雖在於用藥調理。而又須知禁忌。先要灑掃房內潔淨。冬必溫幃。
夏宜涼帳。庶防蒼蠅蜈蚣之屬侵之。一切尼僧孝服。經事見行婦女。及
遠客生人。開瘡時。俱當忌見。牛犬腥羶。醃臘薰藏之物。俱能作渴生乾。
瓜果梨柿。菱棗生冷等類。又能損胃傷脾。雞鴨羊肉。蚌蛤河蝦蟹海腥
之屬。並能動風發癢。油膩煎炒炙炙、鹹酸厚味等件。最能助火生痰。赤
豆蕷麵。動氣發病。惱怒急暴。多生痞滿。飲食太過。必致脾殃。癰餘之後。
勞役太早。乃爲羸症。入房太早。後必損壽。不避風寒。復生流毒。
不減口味。後必瘡癢無度。大瘡須忌半年。小瘡當禁百日。此爲知命君子
也。

【探究、按語】

一切僧尼孝服，遠客生人，開瘡忌見之詞，雖涉迷信，但細析其意，亦不無道
理，避見上述人等，理可減少精神刺激，室內潔靜，以利瘡瘍恢復。

飲食如辛辣煎炒炙燂之屬，具能助壅動熱，患陽症者應忌；瓜果梨柿，生冷性
寒之屬，具能損胃傷脾，患陰症者忌之；雞鴨蝦蟹、海味腥羶之屬，俱能動風發癢
，患瘡疥者忌之；蛋類、黃豆類製品、發酵品，有利化膿、腫瘍防釀膿時宜忌食。
至於大瘡須忌半年，小瘡須忌百日，應視是否再三復發，如復發應分析是否飲食與
之有關，如有關則何止半年百日，無關則不必斤斤爲計也。

又親友探視，應預先有人接待，可省病患不必要之負擔。當見病患時，應態度
從容，行動輕便。親切熱情能使病人愉快，非禮能使病人腦怒、煩躁；消極悲哀能
使病人失望。慰問之後，應及時退出，以免病人勞倦。

卷二

瘡瘍看法第十五

【原文】

初起頂高根活。色赤發熱。掀腫疼痛。日漸高腫者順。已成焮痛。皮薄光高。飲食如常。二便調和。身溫者順。已潰膿稠。色鮮不臭。腐肉自脫。掀腫易消。身輕者順。潰後新肉易生。瘡口易斂。飲食漸進者順。初起頂平根散。色暗微腫。不熱不疼。身體倦怠者逆。已成腫堅。色紫不作膿。不腐潰。惟口乾多煩燥者逆。已潰皮爛肉堅不腐。腫仍不消。痛仍不減。心煩者逆。潰後膿水清稀。腐內雖脫新肉不生。色敗臭穢者死。

腫瘍治法第十六

【原文】

初起知痛或不痛。起發或不發。毋論陰陽表裏。日數遠近。但未見膿者。俱宜炙之。既炙不知痛癢。明炙之掀腫發熱疼痛有時。脈來浮數。無便秘者。宜藥托之。身體拘急。脈緊惡寒。飲熱就暖者。邪在表也。宜散之。腫硬痛深。口乾便秘。身熱脈實者。邪在裏也。宜下之。掀腫勢甚。煩燥飲冷。舌乾口燥者。火在上也。宜清之。腫痛堅硬。背如負石。惡心乾嘔。邪毒在內。解毒拔之。腫痛日深。內膿不出。瘻肉塗塞瘡口者。急宜開割之。軟漫不作膿。及不腐潰者。陽氣虛也。壯脾胃。助陽氣。身涼自汗。手足並冷。六脈細虛。便泄陽脫也。急溫之。

腫瘍主治方第十七

【原文】

神授衛生湯 治瘡疽發背腦疽對口。丹瘤瘰疬惡毒疔瘡濕痰流注。及一切諸毒。未成者即消。已成者即潰。能宣熱散風。行瘀活血。解毒消腫。疎通臟腑。且藥性平和。功效甚速。誠外科首用方也。羌活 分防 風

白芷 穿山甲_{一錢} 沉香 紅花 連翹 石決明_{六分} 金銀花 皂角刺 錦尾 甘草節 花粉_{一錢} 乳香_{五分} 大黃_{一錢半炒二錢熟者不用} 水二碗。煎八分。病在上部先服藥。隨後飲酒一盃。以行藥勢。

四妙湯即轉篋托裏散 生黃耆_{五錢} 大當歸_兩 金銀花_兩 甘草節_錢 右藥水煎。晝夜服盡。自可移深居淺。轉重作輕。如已成氣血素虧。不能穿潰者。加白芷、皂針山甲各二錢。一伏時自潰。如己潰後。即宜刪去皂針山甲。如初起掀痛且渴。加天花粉。此方出外科說約。顧世澄瘍醫大全中采之。謂此乃瘍科首用捷法。數十年來。凡治一切瘍疽。皆賴此方。增減活法。臨時酌用。遇大症金銀花每加至六兩四兩。生黃耆加至兩許。當歸加至二兩。甘草節加至三錢。但見瘍色不起。膿水清稀。即加肉桂轉陰爲陽。化毒成膿。如乳癰乳吹。即加蒲公英一兩立消。百發百中。萬穩萬當。如傷身有濕熱者勿用。

陽和湯 熟地黃_兩 白芥子_{三錢炒研} 鹿角膠_{三錢} 肉桂_{一錢} 薑炭_{五分} 麻黃_{五分} 加生甘草_{一錢半炒加土貝母五錢} 用水加酒一盞同煎。

醒消丸 乳香_{一錢去油} 没藥_{一錢去油} 麝香_{五分} 雄精_{五錢} 右乳沒雄三味。各研秤準。再合和麝香共研。用爛煮黃米飯一兩。入末搗和爲丸。如茱萸子大。如飯嫌乾。量加開水可也。晒乾忌烘。每服三錢。熱陳酒送下。醉蓋取汗。酒醒癰消痛息。此方專治紅癰。

犀黃丸 真犀黃_{三分} 乳香_{一錢去油} 没藥_{一錢去油} 麝香_{五分} 右藥先將乳沒各研秤準。再合和犀麝共研。用黃米飯一兩。如前法爲丸。飯嫌乾。酌加開水。晒乾忌烘。凡乳岩、瘰疬、痰核、橫痃、流注、肺癰、小腸癰等毒。每服三錢熱陳酒送下。患生上部臨臥服。下部空心服。此方紅癰亦可服。

三黃丸 熟大黃_{三錢} 乳香_{去油} 没藥_{去油} 雄精_{五錢} 麝香_{五分} 犀黃_{三分} 右藥先將熟大黃。酒浸透。隔湯蒸軟搗爛。再將餘五味。研極細和入。再搗千杵爲丸。如梧子大。每服五錢。此丸專治懸瘍、紅癰、熱毒疼痛。大癰、楊梅結毒。火毒等症。連服十次。雖甚險者全愈。

五通丸 廣木香 五靈脂 麻黃 乳香_{去油} 没藥_{去油} 右藥等分。各研極細末。再秤準研勻。用黃米飯搗爛。入末再搗爲丸。如梧子大。另以芎、歸、赤芍、連翹、生甘草等藥。煎湯送丸。每服五錢。凡大癰生於要緊穴道。將在發成之際。服此甚效。如與三黃丸。間服之更妙。

小金丹 白膠香 五靈脂 草烏 地龍 木鼈_{各一錢} 乳香_{去油} 没藥_{去油} 歸身_{各七錢} 墓炭_{五錢} 麝香_{五錢} 右白膠香以下八味。各研極細末。用糯米粉一兩二錢。爲厚糊。和入諸末。搗千杵爲丸。如芡實大。此一料約二百五十九。晒乾忌烘。姿瓶密藏勿令泄氣。臨用取一丸。布包放平石上。隔

布敲細。取好酒調藥。令勻蓋好。浸一二時許。再用銀物研過。熱陳酒送服。醉蓋取汗。

控涎丹 製甘遂 紅芽大戟 白芥子炒 右藥等分。各研秤準。再合研煉蜜爲丸。每服三分。淡薑湯送下日服。三次。凡實痰流注瘰癧橫痃初起皆宜服此丹以消之。製甘遂之法：每斤用甘草四兩。煎湯浸三日。湯黑換河水掏洗。再用清水日掏日浸。每日換水數次。三日後去心再淘。浸四五日。取一撮。入白姿盆內。隔一宿盆中水無異色。乃瀝乾以麵裹如團。糠火煅至麵團四面皆黃。內藥熟透，取出晒乾。入鍋炒透磨粉。其苦寒之性。經製則不若而甜。不寒而溫矣。如藥肆已經製過。但須水浸一二日。並無黑色便可用製大戟之法。去附枝。水煮透。去骨取皮。切晒磨粉。甘遂與甘草相反。不可與有甘草之藥同日服。

內消沃雪湯 治發背并五臟內癰。尻腎諸腫。大小腸癰。肛門臟毒。初起但未出膿。堅硬疼痛不可忍者。青皮 陳皮 乳香 沒藥 連翹 黃耆 當歸 甘草節 白芷 射干 天花粉 穿山甲 貝母 白芍 金銀花 良角刺^{八分} 木香^{四分} 大黃^{二錢} 水酒各一碗。煎至八分。量病上下。食前後服之。

保安萬靈丹 治癰疽疔毒。對口發頸。風濕風溫。濕痰流注。附骨陰疽。鶴膝風症。左癰右瘻。口眼 斜。半身不遂氣血凝滯徧身走痛。步履艱辛。偏墜疝氣。破傷風。牙關緊閉，截解風寒。無不應效。茅朮^{八分} 全蝎 石斛 當歸 甘草^炙 明天麻 川芎 羌活 荆芥 防風 麻黃 北細辛 川烏^{泡去皮尖} 草烏^{泡去皮尖} 何首烏^{一錢} 明雄黃^{一錢} 右爲細末。煉蜜丸。每藥以一兩作四丸。一兩作六丸。一兩作八丸三等做下。以備年歲老壯。病勢緩急取用。預用硃砂六錢。研細爲衣，姿罐收貯。治癰疽初起二三日之間。或已成至十朝前後。尚未出膿。狀若傷寒。頭痛煩渴，拘急惡寒。肢體疼痛。惡心嘔吐。四肢沉重。恍惚悶亂。坐臥不安。皮膚壯熱者。又治傷寒。四時感冒。傳變疫症。但惡寒身熱。表症未盡者。俱宜服之。用連鬚大葱白九枝。煎湯一茶鍾。將藥一丸。熱時化開。通口服盡。被蓋出汗爲效。如服後汗遲。再用葱白湯催之。後必汗如淋洗。漸漸退下。覆蓋衣物。其汗自收自歛。患者自然爽快。其病如失。未成者隨即消之。已成者隨即高腫潰爛。如諸疾無表裏相兼。不必發散者。只用熱酒化服。此方原載於諸風癰瘍門。予每用之。發散瘡毒。其功甚捷。故抄錄於此。詳觀此方。治腫瘍甚效者何也？凡榮衛不調。氣血凝滯。乃至癰腫。此方性專發

散。又能順氣搜風。通行經絡。所謂結者開之。況瘡毒乃日積月累。結聚所發，苟非辛溫甘熱發泄。汗以疎通。安能得效。所謂發散不遠熱。正合此方之意也。服後避風。當食稀粥。忌冷物房事。孕婦勿服。

雙解復生散 治癰疽發背。諸般腫毒。初起憎寒發熱。四肢拘急。內熱口乾。大小便秘。宜此藥發表攻裏。 荆芥 防風 川芎 白芍 黃耆 麻黃 甘草^{等分} 薄荷 山梔 當歸 連翹 滑石 金銀花 羌活 人參 白朮^{等分} 大黃 芒硝^{等分} 水二碗。表症甚者。加薑三片。葱頭二莖。裏症甚者。臨服加生蜜三匙。爲發表攻裏雙解藥也。

內消散 治癰疽發背對口。疔瘡乳花。百種無名毒瘡。一切歹瘡。此藥能令內消。化毒爲黑水。從小便而出。勢大者。雖未全愈。亦可轉重就輕。移深居淺。 金銀花 知母 貝母 天花粉 穿山甲 白芨 半夏 皂角 乳香^{等分} 水酒各一碗。煎八分。隨病上下。食前後股之。留藥渣搗爛。加秋芙蓉葉細末一兩。白蜜五匙。同渣調敷瘡上。一宿自消。重者再加一服。忌口效。

清熱消風散 治癰疽諸毒。已成未成之間。外不惡寒。內無便秘。紅赤高腫。有頭掀痛，宜服此藥和解之。 防風 川芎 當歸 黃芩 白芍 花粉 金銀花 甘草^{等分} 連翹 紅花 柴胡 蒼朮 陳皮 黃耆 角刺^{等分} 水二鍾煎至八分。食前服。婦人加香附童便炒。以上七方。癰疽七日以前。瘡勢未成。形體壯實。表裏之症相合者宜服。病退即已。如過七日以後。形勢已成。便宜用後托裏等藥。催毒在外。以速其膿。禁前表下之藥，損傷元氣。致生他變。

內固清心散 治癰疽發背，對口疔瘡。熱甚掀痛。燥煩飲冷。服此可預防毒氣內攻，不致變症。茯苓 辰砂 人參 甘草 雄黃 元明粉 白豆蔻 乳香 水片^{等分} 真豆粉^{等分} 右爲細末。每服一錢五分。蜜湯調下。不拘時候。

護心散 治瘡毒內攻。口乾煩燥。惡心嘔吐 真豆粉^{等分} 乳香^{等分} 珠砂^{等分} 甘草^{等分} 右共研極細。每服二錢。白滾湯調下。早晚二次。

琥珀蠟燭丸 治癰疽發背。已成未膿之際。恐毒氣不能外出，必致內攻。預服此丸護膜護心。亦且散血解毒。白礬^{等分} 黃蠟^{等分} 雄黃^{等分} 琥珀^{等分} 珠砂^{等分} 蜂蜜^{等分} 右將白礬等四味。先碾研極細。另將蜜蠟銅杓內鎔化，離火片時。俟蠟四邊稍凝時。方入上藥攪勻。共成一塊。以一人將藥火上微烘。衆手急丸小棗豆大。用珠砂爲衣。姿罐收貯。每服二三十丸。

。白湯食後送下。病甚者。早晚日進二次。最有效驗。

托裏消毒散 治癰疽已成。不得內消者。宜服此藥以托之。未成者可消。已成者即潰。腐肉易去。新肉易生。此時不可用內消泄氣寒涼等藥。致傷脾胃爲要。人參 川芎 白芍 黃耆 當歸 白朮 金銀花 茯苓 白芷 甘草 皂角刺 桔梗^{各五分} 水二茶鍾。煎八分食遠服。脾弱者去白芷，倍人參。

排膿內托散 治癰疽腦項諸症。已潰流膿時。宜服此藥。當歸 白朮 人參^{各二錢} 川芎 白芍 黃耆 陳皮 茯苓^{一錢} 香附 甘草^{五分} 白芷^{四分} 桔梗^{一錢加三分} 牛膝^{五分加五分} 肉桂^{八分} 薑三片 水二茶鍾煎八分。食遠服。

乳香黃耆散 治癰疽發背諸毒。疔瘡疼痛不忍。未成者速散。已成者速潰，敗腐膿毒。不假刀砭，其惡肉自然脫下。兼治打撲損傷。筋骨疼痛。乳香 没藥^{各五分} 黃耆 鵝粟殼^{去殼炒熟} 人參 甘草 川芎 歸身 白芍 陳皮 熟地黃^{各一錢} 水二茶鍾。煎八分。量病上下。食前後服之。

神功內托散 治癰疽腦項諸毒。至十四日當腐潰流膿時。不作腐潰，更兼瘡不高腫。脈細身涼者。當歸^{一錢} 白朮 黃耆 人參^{各二錢} 白芍 茯苓 陳皮 附子^{一錢} 木香 甘草^{各二錢} 川芎^{一錢} 山甲^{八分} 煙薑^{三片} 大棗^{一枚} 水二茶鍾煎八分。食遠服。

透膿散 治癰疽諸毒。內膿已成不穿破者。服之即破。黃耆^{四錢} 山甲^{一錢} 川芎^{三錢} 當歸^{二錢} 皂角針^{五分} 水二茶鍾。煎一半。隨病食前後服。臨時入酒一盃亦好。

竹葉黃耆湯 治癰疽發背，諸般疔腫。表裏熱甚。口乾大渴者。黃耆 甘草 黃芩 川芎 當歸 白芍 人參 半夏 石膏 麥冬^{各八分} 淡竹葉^{半錢} 生地黃^{一錢} 水二茶鍾。薑三片。燈心二十根。煎八分。食遠溫服。

回陽三建湯 治陰疽發背。初起不疼不腫，不熱不紅硬若牛皮。堅如頑石。十日外脈細身涼。肢體倦怠。皮如蠶甲。色似土株。多生粟頂孔孔流血。腳根平散，軟陷無膿。又皮不作腐。手熱足涼者。俱急服之。附子 人參 黃耆 當歸 川芎 茯苓 枸杞 陳皮 黃肉^{一錢} 木香 甘草 紫草 厚朴 蒼朮 紅花 獨活^{各五分} 煙薑三片 皂角樹根上白皮二錢 水二碗。煎八分。入酒一盃。隨病上下食前後服之。用綿帛蓋瘡令緩。並不得大開瘡孔。走泄元氣爲要。愚按凡背疽屬陰者。皆由臟腑先壞。而內毒不得發越於外也。舊有用雞冠剪血滴於疽上者。有醋煮雄艾敷用者。豬腦熱藥敷圍者。神燈火氣灼照者。此數法皆陰疽所宜。予雖常用。未

見實效。蓋陰疽不起者。如樹木之根壞。強培枝葉。終無發生之理。先要疏其土。通其脈。助其本。回其陽。此四者缺一不可。余常據理用藥。得生者十中三四。用蒼朮、厚朴、茯苓、陳皮疏其土。川芎、當歸、紫草、紅花通其脈。人參、黃耆、枸杞、山萸助其本。附子、木香、甘草、獨活回其陽。但根本內有一脈未絕之氣。服之俱可得生。如手足溫緩。瘡便發熱。漸作掀腫。復生疼痛。色暗得活。堅硬得腐。胃氣得回。此即藥之效驗。必在三服中應之爲吉。外兼照法接助回陽。此通治陰疽之大法也。

黍米寸金丹 二名返魂丹。三名再生丸。四名追命丹。五名延壽丹。六名來甦圓。七名知命丸。八名得道丸。此方昔出異人所傳。常有暴中急症。忽然卒倒者。撬開牙關，研灌三丸。其人即活。又能治發背腦疽。徧身壅腫，附骨癰疽等症。初起憎寒壯熱。四肢倦怠沉重者。無分表裏。老幼輕重。俱宜服之。
 麝香_{三分} 乳香 没藥 雄黃 狗寶 輕粉 烏金石_{一錢} 蟲酥_{二錢} 粉霜_{水銀壞白色者} 黃蠟_{三錢} 砥砂_{二錢} 鯉魚膽_{一錢} 狗膽_{乾用一錢}
 白丁香_{四十九粒} 金頭蜈_{七條} 頭胎男乳_{一合} 右共爲細末。除黃蠟，乳汁二味。熬成膏，同藥和丸。如棗豆大。大人三丸。小兒用一丸。病重者五丸。冷症用葱湯。熱病用新汲水送下。衣被密蓋。勿令透風。汗出爲度。諸病如失。後食白粥調理。

薰發背奇方，治發背，初起七日前後。未成者自消。已成者自潰。不發起者即發。不腐潰者即潰。誠爲良法。雄黃 砥砂 血竭 没藥_{一錢} 麝香_{四分} 右五味。研爲細末。每用三分。綿紙裹藥爲燃。長約尺許。以真麻油潤透灼火。離瘡半寸許。自外而內。周圍徐徐燃之。火頭向上。藥氣入內。瘡毒隨火自散。自不內侵臟腑。初用三條。漸加至四五條。候瘡勢漸消漸減。薰後隨用敷藥。如已潰大。膿發泄時。不必用此照敷。只宜用膏藥蓋貼。

敷藥方 車前草_{一錢} 稀簽草 五龍草 金銀花_{一錢} 右四味鮮草藥。一處搗爛。加三年陳小粉。即常用漿衣者。初起仍加飛鹽末二三分。共打爲稠糊。徧敷瘡上。中留一項。以膏蓋貼，避風。自然拔出膿毒。若冬月草無鮮者。預採 藏下陰乾爲末。用陳米醋調敷。亦如前法並效。但五龍草不能隨地皆有。或致缺少難合。予常薰後頂。以膏蓋周圍腫上。以如意金黃散代敷亦效。

如意金黃散 治癰疽發背。諸般疔腫。跌撲損傷。濕痰流毒。大頭時腫，漆瘡火丹。風熱天泡。肌膚赤腫。乾濕腳氣，婦女乳癰，小兒丹毒。

凡外科一切諸般頑惡腫毒。隨手用之。無不應效。誠爲瘡家良便方也。
 天花 粉白芷 黃柏各一錢 大黃 薑黃 白芷各五錢 紫厚朴 陳皮 甘草 蒼朮 天南星各八錢 以上各藥。切成薄片。晒極乾燥。各研極細淨末。每樣稱準。合和再研。瓷器收貯。勿令泄氣。凡遇紅赤腫痛發熱。未成膿者。及夏月火令時。俱用茶湯同蜜調敷。如微熱微腫。及大瘡已成。欲作膿者。俱用葱湯同蜜調敷。如漫腫無頭。皮色不變。濕痰流毒。附骨癰疽。鶴膝風等症。俱用葱酒煎調。如風熱惡毒。皮膚亢熱。紅色光亮。形狀游走不定者。俱用蜜水調敷。如天泡火丹赤遊丹。黃水漆瘡。惡血攻注等症。俱用大藍根葉搗汁調敷。加蜜尤可。湯潑火燒。皮膚破爛。麻油調敷。具此諸引。要在臨用之際。順合天時。洞窺病勢。察其寒熱、溫涼、用之爲妥。

四虎散 治癰疽腫硬。厚如牛領之皮。不作膿腐者。 南星 草烏 半夏 狼毒各等分 右爲細末。用豬腦同搗。徧敷瘡上。留正頂出氣。

真君妙貼散 治癰疽諸毒及異形異類。頑硬大惡歹瘡。走散不作膿者。宜用此藥。不痛者即痛。痛甚者即止。 明淨硫黃八錢 蕎麵 白麵各四兩 共一處用清水微拌。乾濕得宜。木箱內晒成麵片。草紙包裹。風中陰乾收用臨時。再研極細。用新汲水調敷。如皮破血流。濕爛疼痛等症。麻油調搽。天泡、火丹、肺風酒刺。染布青汁調搽並效。

回陽玉龍膏 治背疽陰病。不腫高。不掀痛。不發熱。不作膿。及寒濕流注。冷痛痺風。諸濕腳氣。手足頑麻。筋骨疼痛。及一切皮色不變。漫腫無頭。鶴膝風等。但無皮紅肌熱者。一概用之。俱有功效。 草烏三兩 軍薑三兩 赤芍炒 白芷 南星各一錢 肉桂五錢 右藥製畢。共爲細末。熱酒調敷。此藥有軍薑、肉桂。熱血生血。既生既熱。恐轉致壅而爲害。故有草烏、南星。可以破惡氣。祛風毒。活死肌。除骨痛。消結塊。回陽氣。又有赤芍、白芷。足以散滯血。住痛苦。加以酒行藥性。攻通氣血。雖十分冷症。未有不愈者。誠爲寒炭之焰。枯木之春。大抵病冷。則肌肉陰爛。不知痛癢、其有痛者。又多附骨之痛。設若不除。則寒根透髓。平常之藥。固莫能及矣。

冲和膏 治癰疽發背。陰陽不和。冷熱不明者。 紫荆皮五兩 獨活三兩 赤芍炒 白芷各一錢 石菖蒲五錢 右爲細末。葱湯熱酒。俱可調敷。紫荆皮乃木之精。能破氣。逐向消腫。獨活土之精、動蕩凝滯血脉、散骨中冷痛。去麻脾濕。石菖蒲水之精。善破堅硬。生血止痛。破消腫。白芷金

之精。能去風生肌定痛。赤芍火之精。能生血活血。散瘀除痛。益血生則肌肉不死。血動則經絡流通。故肌活不致爛痛。經通不致壅腫。此爲散風行氣。活血消腫。祛冷軟堅之良藥也。其中五行相配。用者再無不效。又流毒骨疽冷症尤效。

鐵桶膏治發背將潰時。根腳走散不收束者。用此箍之。**銅綠**
五錢 明礬四錢 膽礬四錢 五倍子炒一兩 白芨五錢 輕粉 銀花三錢 麝香三分 右爲極細末。用陳米醋一碗。杓內慢火熬至一小盃。候起金色金黃泡爲度。待溫用藥末一錢。攬入膏內。每用頓溫。用新筆塗膏瘡根上。以綿紙蓋之。瘡根自主皺紋。漸收漸緊。再不開大。

煮拔筒方 治發背已成將潰時。膿毒不得外出。必致內攻。乃生煩躁。重如負石。非此法拔提。毒氣難出也。**羌活 獨活 紫蘇 蕃艾 鮮菖蒲 甘草 白芷**各五錢 連鬚葱頭 預用口徑一寸二三分。新鮮嫩竹一段。長七寸。一頭留節用刀剔去外青。留內白一半。約厚一寸許。靠節鑽一小孔。以杉木條塞緊。將前藥入筒內。筒口用葱塞之。將筒橫放鍋內。以物壓勿得浮起用清水十大碗。滌筒煮數滾。約內藥濃熟爲度候用。再用披針於瘡項上一寸內。品字放開三孔。將筒連此湯。用大姿鉢盛貯。至病者榻前。將筒藥倒出。急用筒口乘熱對瘡合上。以手捺緊。其筒自然吸住。約待片時。藥筒已溫。拔去塞孔木條。其筒自脫。將器倒出筒中物。看色是何樣。如有膿血相黏。鮮明紅黃之色。一二盃許。乃是活膿。治必終愈。如拔出物。色純是敗血。氣穢紫黑稀水。而無膿意相黏者。此氣血內敗。肌肉不活。必是死膿。強治亦無功矣。此法家傳。屢經有驗。如陽瘡易膿易癰之症。不必用此。以傷氣血。惟陰瘡十五日前後。堅硬不潰不膿者用之。此法有回天之機醫家不可缺也。

豬蹄湯 治癰疽諸毒。已潰流膿時。用此湯洗消毒氣。去惡肉回死肌。潤瘡口。又能散風消腫。腐盡則已。**羌活 甘草 赤芍 黃芩 白芷 當歸 蜂房**各一錢 右爲粗末。看疽瘡大小。用藥多少。先將獐豬前蹄一隻。用白水六碗。煮蹄軟爲度。將汁濾清。吹去汁上油花。用藥一兩。投于汁中。再用微火煎十數沸。密絹濾去藥渣。候湯半熱。將軟絹蘸湯。淋于瘡上。輕手挹去疼膿腐肉。諸惡物隨湯而下。洗訖。以絹帛浥乾。照前總論次第如式用藥。

又洗藥方 當歸 獨活 白芷 甘草各二錢 葱頭五個 用水三碗。煮至藥爛濾清。以絹帛蘸湯。浥淨瘡上。隨搽貼紅黑二膏蓋之。洗時切忌風寒爲

要。治背瘡輕易者。以此代豬蹄湯用亦有效。

加味太乙膏 治發背瘡疽。及一切惡瘡。跌撲傷損。濕痰流毒。風濕風溫。徧身筋骨走注作痛。內傷風鬱。心腹胸背。攻刺作痛。腿腳酸軟。腰膝無力。湯潑火燒。刀傷棒毒。五損內瘡。七傷外症。俱貼患處。又男子遺精。婦人白帶。俱貼臍下。臍毒腸癰。亦可丸服。諸般瘡癰。血氣癩癰諸藥。不止痛癢者並效。 肉桂 白芷 當歸 元參 赤芍 生地 大黃 土木髓各一錢 真阿魏一錢 輕粉一錢 槐枝 柳枝各一錢 血餘兩 乳香一錢 沒藥淨末三錢 右上十味。并槐柳枝。用真麻油足秤五斤。將藥浸入油內。春五夏三。秋七冬十。候日數已畢。入潔淨大鍋內。慢火熬至藥枯浮起爲度。住火片時。用布袋濾淨藥渣。將油秤準足數。將鍋洗淨。復用細舊絹。將油濾入鍋內。要清淨爲美。將血餘投下。慢火熬至血餘浮起。以柳槐挑看。似膏溶化之象。方算熬熟。淨細一斤。將飛過黃丹六兩五錢。徐徐投入。火加大些。夏秋亢熱。每油一斤。加丹五錢。不住手攪。候鍋內先發青烟。後至白烟疊疊旋起氣味香馥者。其膏已成。即便住火。將膏滴入水內。須軟硬得中。如老加熟油。如嫩加炒丹。每各少許。漸漸加火。務要冬夏老嫩得宜爲佳。候烟盡攢下鍋來。方下阿魏。切成薄片。散于膏面上化盡。次下乳沒輕粉攪勻。傾入水內。以柳槐摟成一塊。再換冷水。浸片時乘溫。每膏半斤。扯拔百轉成塊，又換冷水投浸。用時每取小塊。銅杓內烊化。隨便攢貼至妙。

洞天鮮草膏 專貼陽毒。夏天熱癰尤妙。 牯牛頭髮半 牛蒡子 甘菊 蒼耳以上俱用新根葉各一斤 金銀藤 馬鞭草 仙人對坐草以上亦用新鮮者各一斤 白芷 甘草 五靈脂 當歸各半 先用真菜油三斤。將頭髮入鍋熬枯。去渣聽用。再以真菜油十斤。同牛蒡等各鮮草熬枯瀝出。再入白芷等藥熬枯出渣。用絹濾清。并入髮油內。共秤準斤兩。每油一斤。用當日炒透桃丹七兩。徐徐投入。隨熬隨攪。熬至滴水成珠。以兩指取膏成丸。而丸不黏指爲度。攢下鍋來。候稍溫。傾入水中扯拔數十次即可攢貼。

陽和解凝膏 專貼陰毒。凡腦疽背疽乳疽瘰癧。及一切爛潰陰疽俱以此貼。 如紅癰勿貼。 新鮮牛蒡子根葉梗半 活白鳳仙梗半 川附 桂枝 大黃 當歸 肉桂 官桂 草烏 川烏 地龍 儂蠶 赤芍 白芷 白芨 白芨各一錢 川芎四錢 繢斷 防風 荆芥 五靈脂 木香 香櫞 陳皮 乳香一錢 沒藥淨末二兩 麝香半錢 用菜油十斤。先將牛蒡白鳳仙熬枯去渣。次日除乳香沒藥蘇合油麝香外。餘藥俱陸續入鍋煎枯去渣濾清。淨秤

準斤兩。每油一斤。加炒透桃丹七兩。熬至滴水成珠。不粘指爲度。撮下鍋來。將乳香沒藥蘇合油麝香入膏攪和。半月後。攢貼此膏。兼可治瘡疾貼在背脊上第三節骨上。

生肌玉紅膏 此膏專治瘡疽發背。諸般潰爛棒毒等瘡。用在已潰流膿時。先用甘草湯。甚者用豬蹄藥湯。淋洗患上。軟絹浥淨。用抵腳桃膏于掌中捺代。徧捺新腐肉上。外以太乙膏蓋之。大瘡早冕洗換二次。兼服大補脾胃緩藥。腐肉易脫。新肉即生。瘡口自斂。此乃外科收斂藥中之神藥也。
 白芷五錢 甘草二錢 歸身三錢 血竭一錢 輕粉四錢 白蠟三錢 紫草二錢 麻油半斤
 先當用當歸、甘草、紫草、白芷四味。入油內浸三日。大杓內慢火熬煎微枯色。細絹濾清。復將油入杓內煎滾。下整血竭化盡，次下白蠟，微火化之，用茶鍾四枚，預頓水中，將膏分傾四茶鍾內，候片刻方下，研極細輕粉，每鍾一錢；攢勻，候至一伏時取起，不得加減，致取不效。

化腐紫霞膏 治發背已成。瘡肉不腐及。不作膿者。又諸瘡內有膿。而外不穿潰者。俱用此膏。不腐爛者自腐。不穿潰者自破。其功甚於烏金膏。及碧霞錠子。
 輕粉 草麻仁三錢 血竭一錢 巴豆半錢 仁 檀腦一錢 金頂砒五錢
 螺鈿肉用白蜜乾爲末二錢 右各爲末。共研一處。姿罐收貯。臨用時。旋用麻油調搽頑硬肉上。以綿紙蓋之。或膏貼亦可。至頑者不過二次。即軟腐爲膿點。諸瘡頂亦破。

白降丹。水銀四錢 淨火硝一兩四錢裏 天加三錢 白礬另研 珠砂另研 雄精另研 堡砂另研 皂礬一錢 白砒另研 金鹽三錢 右藥研至不見水銀星爲度。盛于陽城罐內。用炭微火溶化。火急則水銀上升走鑪，熬至罐內無白烟起。以竹枝撥之。無藥屑撥起。用水杵搘實。則藥吸子罐底。謂之結胎。胎成將空罐合上。用綿紙條潤以墨水。置于縫間。鹽泥封固。拷乾。如有裂縫。添鹽泥密固之。再用宜興罐頭盛水。上放大黃。沙盆中開一孔。將有藥之罐在上。空罐在下。入沙盆孔中。水平罐底。然後盆內鋪以淨灰。輕輕按平不可動搖恐傷封口。即要走鑪。鋪畢取燒紅栗炭。攢圍藥罐用扇微扇。煉一炷香。謂之文火。再略重扇。煉一炷香。謂之武火。炭隨少隨添。勿令間斷。而見罐底。再煉一炷香。即退火。俟盆冷定。去灰及封口土。開看下罐肉所有白霜。即謂之丹。姿瓶收貯聽用。楣按兩罐鹽泥封固。須用鎌條四根夾住。鎌絲纏縛。方不脫。

一治腫瘍膿成不穿。用唾津調少許點毒頂。以膏蓋之。即穿。或用麵糊。以竹片拌和爲條。切作脂麻大放膏中。對腫頭貼之。不用指拌者。新

降甚烈。恐沾指疼痛起泡也。

一治潰瘍毒根。堅硬如石。用以消化。

一用作點藥。如病者怕痛。可用生半夏對摺。再加水片少許。能令肉麻不痛。名夏冰對配丹。或用蟾酥少許摺入。亦可不疼。

一肌薄骨露。無肉之處。及經脈交會之所。神氣之所注。氣血之所聚。潰後元氣有傷。不能收斂。須藉溫補清歛收功者。此丹不可概施。恐傷元氣。

一初降性烈尋常之症。只用後開九一丹爲妥。如腐肉原韌。不化不脫。或三七或對摺。或九一。斟酌用之。年久烈性已退。方可專用。然四圍好肉。仍須用生肌之藥護之。

九一丹 生石膏分 白降丹分 右共研細末聽用。年久降丹。烈性已退。八二七三。摺和均可。

一治腫瘍結核。將丹薄薄勻繆膏上。數個即消。不可太多。多則有傷皮膚。

一治潰瘍。繆膏上貼之。提膿拔毒。毒盡生肌。比昇丹功效數倍。惟臘骨正面。及露骨與凡肌薄無肉之處。不能化膿。但有稠水者。忌用此丹。緣提拔甚猛。誤用反疼。甚則流血。宜用後開頭二三瓶繆藥爲妥。

一此丹用棉紙燃作藥線。潤以麵糊。將丹拌上。插入膿管。能退管收功。

頭瓶繆 丁香錢 血竭錢 白芷錢 兒茶五錢 草烏五錢 山柰五錢 甘松五錢
麝香一錢 乳香一錢 去油 没藥一錢 去油 右各研極細末。再秤準。共研極勻。姿瓶收貯。勿令泄氣。腫瘍繆膏上貼之。未成者消。已成者潰。

二瓶繆 延胡索五錢 牙皂一錢 麝香分 丁香錢 右藥製法同上。繆潰瘍膏中。能呼膿拔毒止痛。凡肌薄無肉之地。必用此藥。切不可用九一丹。

三瓶繆 珠砂一錢研細 水飛浮 爐甘石一錢以黃連五分煎汁 爐甘石一錢研細水飛淨 川連一錢 生龍骨五錢 水片分 右藥製法同上。繆膏貼之。能生肌長肉。即或薄繆新肌上。緣有深潭處。恐藥不能到也。凡繆藥總以極細爲主。粗則嵌入嫩肉。亦能作疼。不可不知。

珍珠散 珍珠一錢乳蜜三日夏天須每日換乳 珍珠蜜至大宜研極細如米鹽 兒茶五錢 石膏一錢 爐甘石一錢製法與上
赤石脂一錢 陳年照吐頭膏分量 水片三分 右藥製法同上。諸毒膿腐已盡。用此繆上。即能生肌長肉。平口收功。神效無比。但珍珠價貴。恐醫者不能備。只用上三瓶繆藥。亦遠勝子昇丹也。

陰毒內消散 麝香三錢 輕粉一錢 丁香一錢 牙皂二錢 檀冰四錢 腰黃三錢 良薑三錢
肉桂一錢 川烏三錢 甲片三錢 白胡椒一錢 乳香二錢去油 沒藥二錢去油 阿魏三錢去油 右藥製法
同上。陰毒初起。繆膏藥上貼之即消。已成即潰。惟疔毒癰瘡等毒。及孕婦忌貼。

陽毒內消散 麝香三錢 水片四錢 白芨四錢 薑黃四錢 南星四錢 甲片四錢 檀冰四錢
輕粉三錢 膽礬三錢 銅綠四錢 漂青黛三錢 右藥製法同上。陽毒初起。繆膏上
貼之。二方皆功專于消。已破者勿繆。以上三十二方。凡腫瘍初起。及已
成時選用。

潰瘍治法第十八

【原文】

膿熱不潰。瘡不掀熱。食少便溏者。脾虛也。托補溫中。膿清或多。
瘡口散大。不生肌者。裏虛欲變症。峻補之。腐肉雖脫。新肉生遲。如棗色者。肉冷肌寒。宜大溫氣血。潰後食少。心煩不睡。發熱作渴者。脾弱
陰虛。宜補中益氣。身涼脈細。倦怠懶言。食不知味者。脾弱也。醒脾助
胃。風寒襲于瘡口。皮白綻而不收斂者。外照而內溫補。潰後回黃肌瘦。
膿水清稀。瘡色淡白者。當香燥助脾。脈大無力。細濇微沉。自汗身涼者。
氣血俱虛。峻補之。出血或膿多。五心煩熱。燥甚不眠者。亡陽也。急
補之。瘡口已合。經犯房勞。或值急暴。復崩潰者。仍助氣血。

潰瘍主治方第十九

【原文】

十全大補湯 治潰瘍發熱。或作痛。或膿多或清。或盜汗自汗。及偏
身流注。瘰疬便毒諸瘡。或久不作膿。或膿成不潰。潰而不斂。若氣血不足之人。
結腫未成膿者。宜加陳皮、香附、半夏、連翹、服之自消。人
參 黃耆 白芍 肉桂 川芎 熟地 當歸 白朮 茯苓一錢 甘草五分 水
二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

八珍湯 治潰瘍諸症。調和榮衛。順理陰陽。滋養氣血。進飲食。和
表裏退虛熱。爲氣血俱虛之大藥。川芎 白芍 當歸 熟地 人參 白
朮 茯苓一錢 甘草五分 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

補中益氣湯 治瘡瘍元氣不足。四肢倦怠。口乾發熱飲食無味。或飲食失節。或勞倦身熱。脈洪大而無力。或頭痛而惡寒。或聲高而喘。身熱而煩 黃耆^{五錢} 甘草^錢 人參 丹歸 白朮^{一錢} 升麻 柴胡 陳皮^{三錢} 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎至一鍾。空心熱服。

人參養榮湯 治潰瘍發熱惡寒四肢倦怠。肌肉消瘦。面色萎黃。呼吸短氣。飲食無味。不能收斂。或氣血原不足。不能收斂。偌大瘡愈後。多服之不變他症。白朮^{一錢} 人參 陳皮 黃耆 桂心 丹歸 白朮 甘草^{一錢} 熟地黃 五味子 茯苓^{八錢} 遠志^{五錢} 薑三片。棗二枚。水二茶鍾。煎至八分。食遠服。

人參黃耆湯 治潰瘍虛熱不睡少食。或穢氣所觸作痛者。黃耆 人參 白朮 麥冬 歸身 蒼朮 甘草 陳皮 升麻 神曲^{各五錢} 黃藥^{酒炒三分} 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

內補黃耆湯 治癰疽發背諸瘡。已破後虛弱無力。體倦懶言。精神短少。飲食無味自汗口乾。脈不睡。黃耆 人參 茯苓 川芎 歸身 白朮 熟地 肉桂 麥冬 遠志^{一錢} 甘草^{五錢} 水二茶鍾。薑三片。棗二枚煎至一鍾。食遠服。

托裏清中湯 治癰疽脾胃虛弱。咳嗽痰氣不清。飲食思少者。人參 白朮 桔梗 陳皮 半夏 茯苓^{一錢} 麥冬 五味子 甘草^{五錢} 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

托裏和中湯 治癰疽中氣虛弱。飲食少思。腫不消。潰不斂者。半夏 白朮 人參 茯苓 陳皮 煨薑^{一錢} 木香 甘草^{五錢} 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

托裏建中湯 治癰疽元氣素虛。或因寒涼傷脾損胃。飲食少思。凡潰無味。或作嘔泄瀉等症。急宜服此。以建中氣。人參 白朮 茯苓^{各二錢} 泡薑^{一錢} 甘草^{五錢} 熟附子^{一分} 水二茶鍾。煨薑三片。棗二枚。煎八分。不拘何時服。

托裏溫中湯 治癰疽陽弱陰寒。脈虛身冷。或瘡爲寒變。反致不疼。或臓水清稀。心下痞滿腸鳴腹痛。大便微溏。食則氣短嘔逆。不得安臥。時發昏憤者。白朮 茯苓 木香 丁香^{各五錢} 半夏 陳皮 羌活 益智仁 乾薑^{一錢} 人參 白蔻仁 甘草^{一錢} 附子^{一錢} 水二茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。不拘時服。方與舊不同。予製此。常醫癰疽陰症及雜症。陽氣脫陷。與寒氣逼陽于外。發熱煩躁。口乾作渴。投之津液頓生。煩熱頓退。

。其應如響。

聖愈湯 治潰瘍膿水出多。氣血虛極。脈細空而無力。以致心煩不安。眠睡不寧。或五心煩躁等症。熟地 川芎 人參^{三錢} 歸身 黃耆^{一錢半} 作一劑水二茶煎八分。食遠服。

保元大成湯 治潰瘍元氣素虛。精神怯弱或膿水出多。神無所主以致睡臥皆倦。六脈虛細。足冷身涼便溏或秘。胸膈或寬或不寬。舌雖潤而無津。口雖食而無味。脈弦不緊。肉色微紅。總由不足。大補堪施。人參 白朮 黃耆^{水拌炒各二錢} 茯苓 白芍 陳皮 歸身 甘草^{一錢} 附子 山萸肉 五味子^{一錢} 木香 砂仁^{各五分} 水二茶鍾。煨薑三片。去皮。大棗三枚。煎八分。食遠服。服至精神回。手足暖。脾胃醒肉色紅爲度。以上數症乃元氣虛脫。已欲變壞之病非此不回也。

獨參湯 治潰瘍膿水多出。氣血虛極或惡寒或發熱。或自汗冷汗。或手足指甲青冷或身涼脈細。人參^{一錢半} 作一劑。水二碗。棗十枚。煎一碗。徐徐服之。若煎至稠厚即爲膏矣。作三次。用好溫酒化服亦可。

香砂六君子湯 治潰瘍脾胃虛弱。惡心嘔吐。飲食不思等症。人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏^{一錢} 甘草 薤香 砂仁^{各三分} 薑三片棗二枚水二茶鍾煎八分食遠服。

清震湯 治潰瘍脾胃虛弱。或誤傷生冷。或氣惱勞役。或入房夢遺。致火邪乘入中脘。乃生呃逆。益智仁 陳皮 半夏 茯苓 人參 香附 甘草^{各一錢} 柿蒂^{二十個} 澤瀉^{手足冷者一錢} 薑三片。棗二枚。燈心二十根水二茶鍾。煎八分。不拘時服。如身熱口乾。便燥火呃者加黃連五分。

醒脾益胃湯 治潰瘍脾胃虛弱。過傷飲食生冷。以致胸膈不寬。四肢面目浮腫。及小水不利等症。人參 陳皮 茯苓 半夏 山藥 白朮^{一錢} 蒼朮 厚朴 澤瀉 麥芽 木香 山楂 蘇子 豬苓^{各五分} 老黃米^{炒黃一錢} 水二茶鍾薑三片燈心二十根煎八分。食後服。

托裏定痛散 治癰疽潰後。血虛疼痛不可忍者。服之甚效。歸身 熟地黃 乳香 没藥 川芎 白芍 肉桂^{各一錢} 栗殼^{泡去殼炒三錢} 水二茶鍾煎八分。隨病上下。食前後服之。

歸脾湯 白朮 茯神 黃耆 薏仁 龍眼肉^{各一錢} 木香 人參 甘草^{各三分} 當歸^{一錢} 遠志^{五分} 薑一片棗二枚。水煎食遠服。

神應異功散 治潰瘍陰盛陽虛。發熱作渴。手足並冷。脈虛無力。大便自利。至飲沸湯。而不知其熱者。木香 官桂 當歸 人參 茯苓

陳皮 白朮去皮 半夏 丁香 肉豆蔻 附子 厚朴去皮 水二茶鍾薑五片。棗三枚。煎八分。不拘時服。此方癰疽陰症及雜症。陽氣脫陷。與寒氣逼陽于外。發熱煩燥口乾作渴。投以薑桂、附子之類。津液頓生。煩熱頓退。其應如響。

參朮膏 治癰發背等症。大膿後氣血大虛。急宜用此。上好人參半斤

切片用水五大碗沙將渣再煎汁一椀共用密網濾雲片白朮六兩 懷慶熟地六兩俱熟同上法 以上三膏各熬完畢。各用姿碗盛之。頓于水中。待冷取起。蓋勿洩氣。如患者精神短少懶于言動。短氣自汗者。以人參膏三匙。白朮膏二匙。地黃膏一匙。用無烟好酒一盃頓熱化服。如脾氣虛弱。飲食減少或食不知味。或已食不化者。用白朮膏三匙人參膏二匙。地黃膏一匙。好熱酒化服。如患者腰膝酸軟。腳腿無力。皮膚手足粗澀枯槁者用地黃膏三匙。人參白朮膏各二匙。如上化服。若氣血脾胃相等無偏勝者。三膏各二匙。去酒化服。此膏用于清晨。并臨睡時。各進一次。自然精神強健。氣血頓生。新肉易生。瘡口易合。任瘡危險。勢大膿多。可保終無變症。夏天炎熱。恐死膏易變。分作二次熬用亦好愈後能令鬚髮變黑。轉老還童。以上諸方。功難及此。

八仙糕 治癰疽脾胃虛弱。精神短少。飲食無味食不作飢及平常無病久病。但脾虛食少嘔泄者並妙。人參 山藥 茯苓 茯實 蓮肉去皮 糯米去皮 穀米去皮 白糖霜半斤 白蜜糖半斤 右將人參等五味。各爲細末。又將糯米亦爲粉。與上藥末和勻。將白糖和蜜湯中頓化。隨將粉藥乘熱和勻。攤鋪籠內。切成條糕蒸熟。火上烘乾。姿器密貯。每日清早用白湯泡用數條。或乾用亦可。但覺飢時。隨用數條甚便。服至百日。輕身耐老。助壯元陽。培養脾胃。妙難盡述。

胃愛丸 治潰瘍脾胃虛弱。飲食諸味不喜。用過開胃進食之藥不效者。此脾崩之象。宜服之進食爲吉。 雲片白朮一兩鮮白者朱油浸去腥水 懷慶山藥一兩肥大上白者切片用乳拌漬候潤透微乾 上白茯苓一兩一切一分厚用砂仁二錢點只用共茯苓名 內飯上蒸茯苓。 清河人參一兩製蜜酒 陳皮入同炒微炒勿焦六錢 小紫蘇蜜拌透活微乾蒸片時連梗葉切片五錢 白豆蔻去皮心敲碎五錢 蓮肉去皮心敲碎五錢 甘草去皮三錢 右共爲細末。用老米二合。微焙碾粉。泡荷葉湯。打糊丸梧子大。每服八十九。清米湯不拘時服。

二神丸 治癰疽脾胃虛弱。飲食不消。大便溏泄。 破故紙四兩微炒去皮 肉果毛大者二兩裏邊切片洗去皮 用大棗四十九枚。老生薑四兩。切片水浸。棗薑煮至水乾爲度。取棗肉同二藥淨末爲丸。如梧子大。每服七十丸。清米湯空心送下。並治尋常腎虛脾泄俱效。

加減八味丸 治癰疽已發未發。口乾作渴。舌乾黃硬者。茯苓 山藥 丹皮各四錢 漢瀉三錢 山萸肉五錢 熟地黃去青皮八兩 肉桂六錢 五味子三錢 右共爲末。煉蜜丸如梧子大。每服二錢。空心服。鹽湯送下。尋常酒服亦可。此又滲濕潤燥藥也。以上二十五方。治癰疽已潰。至於收斂正病雜病。變症壞症。俱在其中選用。毋得錯亂。大抵潰後。氣血根本。無有不虧傷者。補怯扶羸。理勞續損。皆不出于前方。此外無法也。

卷 三

癰疽諸名歌第二十

【原文】

背之左右爲疽癰。手膀肩背亦相同。肺疽居右癰居左。蜂癰左右近喉嚨。耳後右爲銳毒看。夭疽左耳後相逢。左右兩肩名搭手。井疽正發在心中。流注牽藤六七成。發于心上只臍平。脅疽生在脅肋下。陰疽大體近箕門。穿踝疽穿股拐下。腳氣原來腳底生。左爲便毒右魚口。鶴膝風從膝眼成。 肩下膿癰腋下疽。喉嚨上下氣癰醫。當脈兌疽君可記。三寸相離穿骨基。紅絲疔從手上起。蛾子喉風口內隨。腎疽當腎生左右。三里穴發附陰疽。 離臍四寸爲赫癰。再高三寸號幽癰。腸癰還從臍突起。胸疽乳上心肺中。合谷一疔名虎口蛇頭魚肚指頭逢。腦後一疽名玉枕。莫作如常一樣同。 肩疽樂疽居右手。石榴離肘上三分。左元陰右檔疽發。唆骨陰包穴上生。淵疽腎上腿附骨。佛頂疽生腦頂門。人世毒瘡當切記。庶幾患者可全生。 轆骨爲疔腎上疽鬢邊所發亦疽醫。眉中鳳眉防侵腦。黑疔耳內不爲奇。鼻內生疔當速療。透腦原來髮際基。眉毛瘰疽是大毒。頰疔魚眼近腮齊。 馬刀瘰瘻氣瘻瘡。一氣生來在頸項。龍泉虎毒唇上下。對口原來髮下藏。牙根唇上癰須記。牙下生之疽一行。頂牙縫突爲疔治。切莫看成小小瘡。 心肝脾肺腎癰疽。當看胸中穴道醫更有黃頭并白泡。發無定處速如飛。左爲坐馬右下馬尾。骨頭尖顧口疑。此物殺人能致命。火急攻醫切莫遲。 婦人之乳有數種。高腫爲癰堅硬疽。還有乳岩真惡症。腫如頑石破如墟。鈕扣之風生頸項。裙帶風瘡脚下居。又有濕瞼瘡等疾。總名爛腿蔓難圖。 嬰兒走馬爛牙疳。黑腐沿開臭不堪。赤游丹毒渾身到。鵝口瘡苔滿口漫。風瘡奶癰多搔癢血灌膜窠痛欠安。還有心脾胎熱症。口乾重舌一般看。

腦疽論第二十一

【原文】

夫腦疽者。俗稱對口是也。所發不同。其源有二。得於濕熱交蒸從外感受者輕五臟蘊結從內發外者重。濕熱之爲病。由於天行氣候。寒暑不調節序溫涼。陰陽失度。體虛者易於侵襲。項後雖屬督脈。又主太陽寒水司行之道。一經侵襲。氣血必凝聚則必腫。此從外感受者。其患初起有頭。多生正穴。三四日間。多作掀痛。始生寒熱。口和不乾。色紅根活。瘡勢漸高。形不散大。時止時疼。易膿易腐。飲食知味。起坐如常。外勢雖可畏。而無七惡相干。此屬陽症。故雖不治可愈。其由五臟蘊結而成者。其源又有五。蓋心主血。故心緒煩擾。煽動不甯。以致火旺而沸騰。行于項間。與寒水交滯而爲腫。一也。肝統筋。故腦怒傷肝。項乃三陽統筋之所。肝傷則血脈不潮。筋無榮養。凝結爲腫。故項緊急強痛。不能轉側。其患未潰前。肉色紫暗。堅硬漫腫。破流血水。木痛無膿。此皆肝氣受傷。二也。脾主肌肉。故思慮傷脾。脾氣日損。又或膏梁損胃。胃汁乾枯。以致中痞塞。氣不運行。逆于肉裏。乃生壅腫。其患外皮雖腐。而內堅不潰。口燥舌乾。飲食不進。腳根走散。膿穢色敗。此皆脾氣受傷。三也。肺主皮毛。故憂鬱傷肺。肺傷則毛竅閉塞。腠理不通。氣不舒暢。縱橫經絡。結而爲腫。其瘡形多平陷。色淡不華。皮腐脂流。形如湯瀲。氣粗短促。鼻煤鼻掀。滻滻生痰。殷殷發嗽此皆肺氣受傷四也。腎主骨髓。故恣慾傷腎。腎傷則真陰之氣敗矣。真陰一敗。相火自生。此火最能自生自降。或動或靜。煎熬臟腑。銷爍津液。更變形容。改換聲音。瘡形紫黑。脈數乖度。心煩口乾。隨飲隨渴。此皆腎氣受傷五也。凡治此症。必內辨虛實。外分陰陽。體順天時。察其病理。七日以前。瘡勢未成者。當通竅以汗發之。七日以後。病勢已成。治當兼補以托之。則毒不內攻。外無變症。如藥攻利太過元氣受傷。毒多難出。又圍敷涼藥。氣血冰凝。則肌肉多死。反難腐潰。予嘗治此。及諸發背初起未成者。用披針當頂點入知痛處。出其惡血。通其瘡竅。隨插蟾酥條直至瘡底。外用膏蓋。內服萬靈丹。或蟾酥丸。發其大汗。解散內蘊之毒。次日患上或腫或不腫。或痛或不痛。仍插仍貼。直至患頂腫高。腳根突起。四圍裂縫有膿。方住插藥。輕淺

者。九日後吐出病根堅硬不化之物。毒甚者。不能頓然脫落。亦可漸腐成膿爲轉重就輕之良法。外用玉紅膏長肉。內服補托收斂之藥不久自愈。如陽症輕淺者。候自腐潰。不用前法針刺如不腫不疼。灸亦不痛。陰症尤當速用。不必遲延。此爲移深居淺之大法也。

腦疽看法

初起頂高根活。色紅皮薄。作疼掀熱。腫不開散者順。已成。無論偏正瘡形突起。疼痛發熱。易膿易腐者順。已潰膿稠肉色紅活。癥腐易脫。掀腫易消。痛減者順。潰後腐脫。新肉便生。瘡口收斂。結痂作癥者順。初生一點黃泡。或似疙瘩。不腫不疼。自不知覺者逆。已成不發高腫。亦不掀痛。瘡頂軟陷。腳根平散者逆。已潰膿清。肉色紫黑。外皮不腐。內生臭穢不食者逆。腐肉雖盡。新肉不生。瘡口散大。軟陷無神。色敗者逆。

腦疽治法

初起有頭。或無頭大痛。或不痛。俱隔蒜炙。兼服解毒之藥。已成堅硬。發熱掀痛。口乾便秘者。邪在內也。宜泄之。堅腫不痛。發熱惡寒頭疼。四肢拘急者。兼發表攻裏。腫硬日深。形色紫黑。外皮不腐。內膿不潰。宜行拔法。項強頭面掀熱。口燥恶心嘔吐者。邪在上也。宜清之。掀熱腫痛。紅色光亮疼痛有時。內膿脹痛者。急開之。將潰不潰。微熱微紅。不作腐潰者。脾胃虛也。宜補之。潰後腐肉不脫。膿水清稀。腫痛仍作者。當大養氣血。大便多溏。小便短濶。自汗食少。脈細身涼。當溫中健脾。

腦疽治驗

一男子生項疽十餘日。其勢頗盛。根連左右。耳項並腫。紅赤掀熱。脈浮而數。先用黃連消毒散二服。以退大勢。根腳稍定。用托裏消毒散。數服尚不腐潰。診其脈浮無力。詢知年過五旬。久艱嗣息。房中婢妾多人。思慮勞慾太過。損傷元氣故也。瘡勢又大。故服前藥止能起發。不能培養爲膿更用十全大補湯。加桔梗、白芷。倍人參、白朮各三錢。外用桑木炙法。早晚二次。又塗紫霞膏數日。病者頭面俱腫。雙目合縫形狀可畏。然後腐潰膿出。日至數升。如此半月。因前藥尚不勝病。添出煩躁不安。五心煩熱飲食漸少等症。此乃膿水出多。氣血走泄致成虛火假症。隨用聖愈湯一服。不應又進一服。加熱附子二錢。方應。前症悉退。換用人參養榮湯。加麥冬、五味。參朮倍至三錢。調理月餘。腦骨腐肉。連髮片片脫

下。熱狀極狼狽。觀者無不驚訝。腐潰深大。恐尙藥補不及。每日粥食中用人參三錢。同煮食之。以接補脾元。方得元氣漸醒。調理四月而愈。後一年生子。

一監生項瘡初起。瘡頭偏于右半。余謂不可輕視。必用艾灸爲上。隔蒜灸至十五壯。知痛乃住。彼視爲小恙不服藥。又四日。頸腫項強。紅紫未痛。便秘脈實有力。以內疎黃連湯。加元明粉二錢。通其大便。次用消毒救苦湯。二服腫勢仍甚。此內毒外發。不可再消。換服托裏消毒散。延至二十日。因病者肥甚。肉緊不能腐潰。余欲行針開放。堅執不肯。豈知變症一出。煩悶昏憤。不省人事。始用披針左右二邊併項之中。各開一竅。內有膿腐處。剪割寸許頑肉放出膿血碗餘。內服健脾胃。養血氣。托膿補虛之藥。膿似泉流不歇。每朝夕藥與食中共參六七錢。服至腐肉脫盡。新肉已生。又至四十日外。始漸甦知人事。前此竟不知也。此症設禁用刀針。不知峻補。豈得生乎。幸其子在癢識道理信從余言。未百日而愈。

一男子患項瘡五六日。來就余視。頭便黃色。根亦平散。余曰此當急治。彼不悅而去。請他醫視之。曰小恙也。因即用其藥。又至五日外。瘡勢堅硬。根腳開大。毒氣已過兩肩。流注前項胸乳皆腫。嘔吐惡心。寒熱不食。始復請余治。已非藥力所及。乃用葱艾湯。洗淨他醫之藥。連煮藥筒。拔提二次。拔出膿血碗餘。隨用銀針。斜斜插入。透通患底數處。以蠟酥條插入孔內。解毒爲膿。總以膏蓋走散處。則以真君妙貼散敷之。其毒漸漸收歸後項原處。又服內托降火化痰之藥。三四日大勢已退。內膿已通。換服十全大補湯。凡堅而不化者照之。腐而不通者取之。新肉生遲者培之。將近三月。始得完口平復。

一女人年過六旬。係宦室族。素稟怯弱。項間患疽。初起頭便如粟。所謂裏可容穀也。喜其形體不肥。雖發必易腐潰。先隔蒜灸之。次用蠟酥餅貼灸上。四邊以吸毒散敷之。使腳根不散。內服托裏消毒散數服。瘡勢堅硬。痛苦不止。余曰。到某日方止。今瘡不腐潰。脈細數無力。此內虛不能解毒爲膿。以疼爲要。豈可得止。次換蓋氣養榮湯。加角針白芷三服。腫勢漸起。外用桑木炙法。腫漸軟。膿出不多。前方去角針白芷。加香附。倍用參耆。又數服方得腐潰。痛仍不止。余曰。再三日午後可止。至期腐肉將脫小半。臨午用乳香定痛散一服。午後痛頓止。得安睡。其家喜悅。余曰。此在用藥適當其時。惟信余言。則無失耳。後當每日腐盡某日肌平。某日完口。其家以墨記之。果如期不爽。此法要在眼力精巧。量病

難易。新腐遲速。用藥當否。乃能決期日耳。

一婦壯年患項瘡三日。徑對前口。其家以肥人生此爲憂。余曰。頂高腳活不妨。彼欲內消。余曰藥消則不能。針消才可。用披針當頂針入六七分。至軟肉方住。隨去瘀血。以蟾酥條插入孔內得大汗。次日瘡出微膿漸消。猶恐內毒未盡。又用清熱消毒之藥數服。不出十日而安。

一男子耳後生疽十餘日。自謂小恙不治。將近半月。腳根漸大。瘡頭惟流血水。稀惡汙穢。四邊紫黑。軟陷無膿。面慘鼻掀手冷氣促。脈散大無根。余曰。此內敗症也。辭不用藥。另延他醫治之。曰無妨。病者恨余不治。每見親友。必厲聲自言不死。余曰。後五日必死。果然凡見此敗症。雖山岳之軀。無不傾倒。

一婦人患正對口四五日。自炙廿餘壯。竟不知痛。炙疤焦黑平塌。脈微數而無力。此內虛症也。若假藥力。則致誤事。用披針當瘡頂刺入寸許。不痛亦無血出。此毒滯而未發。用蟾酥條插入針孔。每日一次膏蓋其上下。七日後。周圍裂縫出膿。內服純補之藥。至十四日。落出瘡根一塊。如指大。長厚寸餘。方以玉紅膏生肌。又半月。其口已平。繆以真珠散。生皮而愈。此症設不用針工。專假藥力攻托。雖不至死。豈能速愈。

一婦人四旬肥甚。患頂瘡五六日。肉腫瘡不腫。堅硬色紫。根腳散平。兼口燥心煩。六脈洪大。此太過症也。後必無膿辭以不治。另延他醫。有言外托者。有言內消者。有言年壯不妨。有言脈大易治。紛紛不定。仍各用藥。又七八日。胸項俱腫。木悶堅硬。仍請余決。之余曰。此必不治。初起肉腫瘡不腫一也。腳根平散。真氣內敗不能收束毒氣。二也。口燥心煩、邪火內淫。三也。形色紫暗。血死毒滯。不作腐潰。四也。六脈洪大。瘡毒大盛。正氣受克。無以抵當。終變軟陷邪毒內攻。五也。二十七朝前後必死。果然。

腦疽主治方

黃連救苦湯 治腦疽發鬢發頤。及天行時毒。初起憎寒惡熱。頭面耳頂俱腫。服之。未成者自消。已成者自潰。黃連升麻 葛根 柴胡 赤芍 川芎 歸尾 連翹 桔梗 黃芩 羌活 防風 金銀花 甘草節
水一碗。煎八分。臨服入酒一盃食後服。

解毒天漿散 治腦疽積毒日深。堅腫木硬。口燥舌乾。惡心煩渴六脈沉實有力。大便積閉不通者。石決明生研 僵蠶 穿山甲土炒 防風 連翹 羌活 乳香 甘草 金銀花 黃連 歸尾各一錢 大黃三錢 天花粉

新鮮者四兩石臼內搗爛投水一碗攪勻後去渣用。右花粉淨汁一碗半同藥煎至八分入酒一盃。空心熱服。行過三次。方食物。勿食煎炒發物。

內托千金散 治腦疽發背。諸毒惡瘡已成不消者。服之易潰 白芍 黃耆 川芎 當歸 防風 桔梗 天花粉 金銀花 人參各一錢 肉桂 白芷 甘草各五分 乳香 没藥二味痛甚加入 右水二碗。煎八分。臨服入酒一小盃。食遠服。

回毒銀花散 治腦疽及諸陰瘡不起。色變紫黑者。急服之。 金銀花 連枝葉二兩 黃耆四兩生切 甘草一兩切 用紹酒二十兩。同藥入小口砂罐內密封。重湯內煮三炷香為度。起濾清服之。蓋緩患上。其瘡漸漸高腫。此轉陰為陽吉矣。後用托藥潰膿。如服後不痛不起。瘡頭流出黑水。此乃真陰症不治。

梅花五氣丹 治腦疽發背。諸般疔腫。初起寒熱交作。筋骨疼痛。有似傷風。惡心嘔吐。但未成膿者。 水片 麝香各五分 輕粉 辰砂各六分 乳香 没藥 血竭 明雄黃各一錢 真蟾酥須於端午前尋之至午日取酥二錢用頭胎男乳調膏 右前藥各研極細。對準分數。于端午日辰時製度。候至午時。將上藥九味。和入蟾酥膏內。向日丸之。如茄子大。一時內晒乾。用川椒二十七粒。燈心二十七段。同藥收於姿罐內養之。以蠟封口。不泄藥氣為妙。凡遇惡毒大瘡。開器取出一枚。先用美饌食飽。次用無根水淨漱口內。再含水一口。少頃待溫用葱白五寸。同水嚼爛嚥下。隨將藥餅安放舌下。睡於緩處。以被覆蓋。藥化苦水。徐徐嚥之。瘡勢大者。二三餅亦可。藥盡其汗即到如淋。諸病若失。如冬月天寒難汗。噙後將葱白湯催之亦妙。凡治無有不效。如暗疔。人所不知覺及知覺而失治者。毒氣入裏。人便昏沉。一中便倒。不能依法服藥。急用連鬚葱白七個。煎酒一盃。研藥五餅灌下。藥氣到心。其功如湯潑雪。患者即便甦醒此為外科第一奇方也。

小保安湯 治腦疽諸發。已潰流膿。服之庶不更變。 當歸 茯苓 川芎 黃耆 麥冬 陳皮 桔梗 人參 白朮各一錢 半夏 甘草 薑香 各五分 薑三片棗二枚。水二茶鍾煎八分。食遠服。

大保安湯 治腦頂諸症。癰疽惡瘡。大毒已潰之後。膿水出多。氣血虛弱。精神短少。飲食少思。坐臥不安。煩燥不眠。晝則安靜。夜則發熱。及虛陽煩渴等症。 白朮 當歸 人參 茯苓 川芎 白芍 山萸肉 黃耆 山藥 丹皮 熟地黃 五味子各一錢 肉桂 甘草 麥冬 熟附子

各五分 煙臺三片大棗二枚。蓮肉七粒。水煎食前後服。

陽春酒 治腦疽諸發。已潰流膿。腐盡時。脾胃虛弱肌肉生遲。或氣血原不足。以致肉色淡白。不能長發收斂。宜服此酒。生長肌肉強健脾胃。美悅顏色。滋潤皮膚。凡大瘡後飲此。不惟却病。亦且延壽。人參切片 白朮 熟地黃各五錢 歸身切片 天門冬 枸杞子各三錢 柏子仁 遠志各二錢五 右上藥用絹袋寬貯。以無灰好酒五斤姿罐內浸至一伏時。每早午晚各飲一盃。熱服。如夏月天炎易壞。不堪久服。將藥分作五分。每次用酒一斤。隨便漫服亦效。如酒將完。藥尚有味再添酒浸飲一次。已後藥淡無味。不必再浸。

桑木炙法 治諸瘡毒。堅而不潰。潰而不腐。新肉不生。疼痛不止。用新桑木長七寸。劈指大。一頭燃著向患上炙之。火盡再換。每次炙木五六條。肉腐為度。

神妙拔根方 治腦疽發背陰症。初起不腫高。不掀熱。炙不疼。其病將來難治。必致壞人。十日以前。用披針當頂插入。知痛處方止。隨用蟾酥條插入孔底。每日二條。膏蓋三日後。加添插藥。其根高腫作疼。外用神燈照法。助陰為陽。插照七日。其瘡裂縫流膿。共十三日。其根自脫。如日多。根深蒂固。不能脫者。披針取之。內用玉紅膏。不脫者自脫。不斂者自斂。此法百人百活。再無不愈者。

腦疽應用方

隔蒜炙法 拔筒法 琥珀蠟礬丸 太乙膏 眞君妙貼散 護心散方俱見腫瘍門 蟾酥丸 蟾酥條俱見疔瘡門 十全大補湯 乳香定痛散 聖愈湯方俱見潰瘍門。

【探究、按語】

腦疽論中謂其源分二，一為濕熱為病，由於天行氣候，寒暑不調，節序溫涼等外感受病。二為五臟鬱結為病，由於心緒煩擾，火旺沸騰；腦怒傷肝，血脈不潮，筋無榮養，思慮傷脾，膏粱損胃，逆於肉裏，憂鬱傷肺，毛竅閉塞，腠理不通，恣慾傷腎，相火自生等內傷受病。且特別強調脾腎雙經，即思慮傷脾，膏粱原味，房室傷腎，真陰虧損，相火燔灼等，均能與外來濕熱相搏而成因。但稟素虛弱仍是本病成病之主因，消渴病人之所以易患大疽者，即屬此例也。

腦疽又有正偏之別，正腦疽又名對口，係陽亢熱極而生，即濕火為病，偏腦疽又名偏對口，係寒熱錯雜，兼七情內鬱而生，即鬱火為病。

疽之特徵為初起之時，瘡頭即有粟粒膿點，繼則灼熱腫痛，易向四周及深部擴

散，膿頭即漸漸增多，狀如蜂窩，初則雖見膿頭，但不易暢泄，甚者大可盈尺，尤以鬱結爲病者，亦能引起疽毒內陷變端。

正腦疽多 热腫痛，色鮮紅活，根束頂尖，時痛時止，督脈純陽，起自尾閏，上貫頭頂，挾毒上升，故易膿易腐易歛，順證屬多。

偏腦疽多漫腫平塌堅硬，難膿難腐難歛，逆證屬多，更有兼風濕者，其瘡根又易散大旁流。初起有表證者，令人寒熱往來，宜「荆防敗毒散」，有裏證者，令人口唇焦紫，大渴便燥，宜「內疏黃連湯」。

卷 四

發背論第二十二

【原文】

發背有五。一曰陽毒。先因風熱。或患熱毒消渴。或先患傷寒。餘毒積蓄於背脊脅之間。不拘椎數。但從兩夾脊起。滿背掀熱赤紫。或紅色如燄。膿毒難成。成後痛不除。數日之間。忽然平塌。昧者誤謂腫消。殊不知此是內攻肉陷。不可復藥矣。

二曰陰毒。乃氣冷而作初如黍米。隱隱而痛。直應前心頭目昏重。寒熱如瘡。五七日後。始覺攻腫。膿毒深沉。遲緩未透。急宜以補氣湯藥內托。外以抽膿藥貼之。三曰服金石燒煉藥毒。初起如丹癰之狀。繫繫漸開。如湯火所傷。面色如硃。心膈煩躁。多渴嗜冷。其瘡難起。起則驚人。尤甚於陰陽二毒。但根抵分明。須以解金石毒湯散。急治其內。方保無虞。四曰酒食毒。乃平時或肌或困。飽食即睡。或多食酒。食冷熱黏滑肥鮮油膩之類。積于臟腑。兼之不慎。幃幕恣意當風。脾臟氣虛。不能承受。乃毒發于背。不問椎數。初起頭如小彈子。後大如拳。其堅如石。痛連四肢。加之拘急。口苦舌乾。腹急便澀。十數日後。頭面手足浮腫。臟腑滑泄。急痛如利。是其候也。初痛時。急用收腫發穴潰膿湯藥。內實臟腑。外泄膿水。治之遲緩。潰腐愈甚。傷骨爛筋。復感外邪。而致內敗。死矣。五曰冒山嵐瘴氣毒。其人素歷障鄉觸冒嵐瘴。蓄諸臟腑。久而不發。至氣血衰弱。及斷喪虧損之時。而後發露。初起腫色青黑。形如靴皮。附筋徹骨。頑如木石。引手加深。方覺痛處。至五七日。毒氣浮淺腫高色。變青白。有如拳打之狀。寒戰如瘡。頭痛口歪。又若有風。手足厥逆。眼睛黑少白多。此因內有邪氣相搏。急宜破清血三五升。方有黃白膿出。然其皮猶腫痛不止。直至青白之色退盡方愈。此宜急急追趕膿毒出外。方為無害。否則未有不頻於危者也。

發背治驗

一男子年五十餘。背心生疽十三日矣。湯水不入。煩悶不語。背堅硬如負石。皮色亦紫。瘡勢雖重。喜其根腳交會分明。毒尚結局於此。未經

入內。須行拔法。使毒氣外發。不致內攻。隨煮藥筒提拔二次。去惡血碗許。又脈實便秘。用內疎黃連湯。又豬膽導法。大便通利二次。使內外毒氣皆得通泄。夜臥即安。背重失其大半。次用托裏排膿之藥。外以桑木炙法。腫硬漸腐。膿毒漸出。換服十全大補湯。加麥冬、五味數服。腐肉自脫。飲食漸進。瘡口漸合。調理月餘而愈。

一老婦年近七旬。背瘡已過半月。形勢可畏。其家已置。不治。整備後事。適余往看童稚瘡症。見而問之。咸言待斃旦夕。余強請觀。半背皆腫。瘡勢不高。亦不內陷。以手按之。外實而內腐。老年內虛。膿毒中隔。不得外發故也。雖飲食不進。且喜根腳兩無混雜。臟腑各無敗色。治之可生。其家堅執不信。且言籤龜命卜。俱斷必厄。余嘆曰。再三四日不治。內膜穿潰。此命死於無辜矣。次日。余自往。謂曰余非相強。實見其可生。不忍聽其死耳。藥金分毫不取。愈後任從酬謝何如。其家首肯。乃先用葱艾湯淋洗。外面俱是不腐頑肉。隨用披針利剪。取去正中二寸頑肉。放通膿管。以手輕重之間。撩盡內蓄膿血。約有三碗。旁觀無不失色。膿血稍盡。仍換前湯洗淨。用膏封貼。內用回元大成二服。以接補真氣。後用人參養榮湯。倍參朮。加香附。早以八味丸。八仙糕。相兼調理。使其脾健進食。腐脫肌生。此婦亦謹慎調理。並未更變。不出百日。瘡愈身健。始信余言不謬也。

一監生年過五旬。素有渴症。體又極肥。生背疽約有尺許。至十二朝後請余治。視其形勢微腫。色淡微紅。根腳半收半散。此陰陽相等之症也。肥人內虛。瘡勢又大。非補托瘡必難起。毒必易陷。誠恐緩不及事。便以托裏散固其內。候至十五日。外用披針小小從頂放通三孔。緣勢大不可過放。走泄元氣。致膿難成。但令有路可通而已。內用參耆內托散。倍加入參黃耆各三錢。服至二十日。大膿將發。日至升許。早以參朮膏。午用十全湯。加參耆各四錢。麥冬五味子各一錢。服至月餘。腐肉通潰。膿似湧泉。間用聖愈湯。兼之八仙糕調理。保助脾胃。增進飲食。尙恐前藥不能勝病。加熟附一錢。脾健膿稠。色黃而正。四十日外。瘡勢方得微退。時值仲夏酷熱。病者生煩。候食冷水二碗。瘡遂下陷。不痛無膿。身涼脈細。腹痛足冷。變爲陰症。非辛熱不能回陽。急用十二味異功散。倍人參熟附各三錢。不應。換用生附人參各五錢。早晚二服。方得身溫脈起。瘡高復痛。又二服。膿似前流。出至一月。約有百餘碗。竟不減少。外皮紅退。亦不爛。此肥人外實內虛。故皮不腐而內潰也。又用玉紅膏搽於棉花

片上。推入瘡內。膏蓋之。內腐漸脫漸出。又十日後。出大腐一塊。約有六兩。自後腫消身便。膿少肌生。百日外方得平復。人參服過五斤外。附子亦用十餘兩。方得安全。此症設用解毒傷脾宣利等藥。不用辛熱峻補。豈有生理。

一鄉宦年 七旬。背瘡已經八日。形雖微腫。色淡不紅。勢若龜形。根漫不聳。乃年老氣血衰弱之故。診其脈。帶微數而有力。本根猶未撥。雖老可治。隨用排膿內托散。加皂刺以瀆腐托裏。服至十三日後。瘡亦漸腫。色亦漸赤。但不能潰膿。此食少脾弱。未能培養之故也。又用十全大補湯數服。膿始漸出。不能快利。乃內膜中隔不通故也。不可畏其老而致悞其事。隨用披針。當頭取開寸許。擦通膿管。膿果隨出。以豬蹄湯洗淨膏蓋。復用照藥。每日一次。外肉亦腐爲膿。病者形色枯槁。更用人參養榮湯。倍加參耆托裏。腐肉將脫者。取之。新肉欲生者培之。但老年氣血衰弱。不能速效。又加服參朮膏。早晚二次。新肉方生。飲食頓倍。調理七十餘日而安。

一癩生年六十餘。患背疽。已經十日。其形堅硬。色亦深紫。頭發甚多。含若蠅子。堅長尺餘。根橫半背。喜其高腫光亮。發熱掀痛。脈洪數有力。此膏梁醇酒濕熱交蒸之故。雖重不妨。遂用照藥三條。相繼照畢。其內含蠅子。盡欲吐出。即用抿腳刮去。流出惡血鍾許。葱湯洗淨。搽上藥。用紙蓋貼。周圍根腳。以吸毒散敷之。收其毒氣。使不開大。次日仍照仍敷。三日後。外肉漸腐。內服托藥。培助脾胃。解毒爲膿。早服八味丸。以滋腎水。換洗豬蹄湯。仍將膏貼。候至腐盡。其深寸餘。隨用玉紅膏。日漸生長。但此公好飲。雖病不戒兩月後新肉雖平。復繆珍珠散數次。方結皮。蓋僅十八日而安。

一老年人患疽半月。其瘡貫脊。循背皆腫。上至肩膊。下至 脊。腫若瓜形。頭計數百。其家以爲不治。余診其脈。微洪而不鼓。瘡形腫掀外發。飲食知味。年雖老而根本尚有餘也。先用托裏消毒散二服。其勢稍定。外用桑木炙法。助其腐潰。根以鐵桶膏罨之。更服排膿內托散。正膿漸出。但老年氣血不充。外肉不易就腐。視其肉色變而不腐者。用針鈎利剪。徐徐剪去。約四寸餘長。見紅肉便用膏塗。新肉已生將半。時值隆冬。其家自行開看。房中不著炭火。兼蓋護未煖。致被寒侵。瘡色淡白。膿亦清稀。飲食減少。氣體不舒。幸其瘡本屬陽症。遂用濃葱湯乘煖淋洗。將紅膏烘化搽上。外用膏貼。以熟棉軟絹覆疊數層。綁蓋甚密。內用神功托

裹散。早晚連進二服。次早復看。其瘡自回陽矣。以後遵法調理。百日而安。

一老人年過六旬。患背疽十二日矣。其形半腫半紅。微疼微熱。發于背心之下。腎俞之上。高低平等。廣闊八寸。根腳泛腫。色若水噴。頂軟無神。似腐非腐。脈浮而大。重按則虛。余曰。此瘡易于腫潰。而難于收斂。不可治也。其家笑而不信。復請里中老醫視之。見病者起居平和。言語清利。舉動如常。飲食有味。以爲五善俱具。安若泰山。其家亦喜。遂用其藥。漸有功。膿潰腫退。腐盡肌生。余謂其親族曰。此病必死于收口至錢大時也。衆皆不信。果至口如錢大時。變症一出。不四朝而死。始以余言爲神。

一男子六旬有二。發右搭手。余用艾灸。形勢漸高腫。堅硬不痛。半月後。尙未潰爛。日生煩悶。恐其毒陷。先用針通。隨行拔法。拔出惡血鍾許。稍得輕便。口搽化腐之藥。膏蓋。三日後。瘡漸腐潰。至二十日。出正爛。壞肉漸脫。新肉漸生。外治之法盡矣。其家與一內科醫其密。請其開方。不遵外科補托之法。失于峻補。每日人參不過二錢。余曰不及。當用五錢。兼熟附二錢。不然必變。其家與內科醫俱不信。用參二錢。謂之大損小補。安得不死。又外科乃破漏之病。最能走泄真氣。如損補兩不相敵。無以抵當。多致變端。果然不數日。肉色淡白。瘡口散漫。膿水清稀。飲食減少。敗症具矣。雖強投溫中健脾大補之藥。終至形體消削。膿水臭穢。延至六十日。瀝盡氣血而亡。悔已無及。凡大瘡每日爛出一碗。用參必至三錢。以此爲則。此人日出膿三兩碗。其家不信補。而自取敗亡。惜哉。

一男子年近六旬。其孫患瘡。邀余往視。彼坐於堂。時值仲夏。余見其背生熱癧。凡二十餘。內有一瘡甚小。余謂曰。此非癧比。其毒甚大。一發即不可治。彼笑而答曰。固無恙也。及遂至門。余又謂曰。可急請他醫視之。彼仍不信。至十日。形勢稍發。命里中一醫視之曰癧也。又十日。形勢內陷。敗症具出。始信前言。央親友邀余往視。彼臥於堂。帛覆瘡上。余登堂未數步即退。親友問故。余曰。敗氣滿前。死期速矣。何必再視。急備後事。更七日死。果如期不爽。

疔瘡論第二十三

【原文】

夫疗瘡者乃外科迅速之病也。有朝發夕死。隨發隨死。有三日五日而不死。一月半月而終死。此在於毒中之淺深。各隨臟腑而見症。有曰火燄疔。其患多生唇口手掌指節間。初生一點紅黃小泡。抓動痛癢非常。左右肢體麻木。重則寒熱交作頭暈眼花。心煩發躁。言昏憤。此出於心經之病也。有曰紫燕之病。也有曰紫燕疔。其患多生手足腰脅筋骨之間。初生便作紫泡。次日破流血水。三日後串筋爛骨。疼痛苦楚。重則眼紅目眩。指甲純青。舌強昏神。睡語驚惕。此出于肝經之病也。有曰黃鼓疔。初生黃泡。光亮明潤。四邊紅色纏繞。多生口角腮顴眼胞上下。及太陽正面之處。發之便作麻癢。繃急硬強。重則恶心嘔吐。肢體木痛。寒熱交作。煩渴乾嘔。此出于脾經之病也。有曰白刃疔。初生白泡。頂硬根突。破流脂水。驟然痛癢。易腐易陷。重則腮損咽焦。毛聳肌熱。咳吐膿痰。鼻掀氣急。此出于肺經之病也。有曰黑醫疔。其患多生耳竅胸腹腰腎偏僻軟肉之內。初生黑斑紫泡。驚悸沉困。軟陷孔深。目睛透露。此出于腎經之病也。以上五疔。內應五臟又紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡。漸發紅絲上手膊。令人多作寒熱。甚者惡心嘔吐。遲治則絲至心。常能壞人。用針於紅絲盡處挑斷出水。尋至初起瘡上挑破。俱用蟾酥條插入膏蓋。內服汗藥散之自愈。凡治此症。貴在乎早。初起即治者十全十活。稍遲者十全五六。失治者十全一二初起項以上者。三陽受毒。必用披針刺入瘡四五分。挑斷疔根。令出惡血。隨用回疔丹。或蟾酥條插入孔內。以膏蓋之。如項以下者。三陰受毒。即當艾灸。灸之不痛者。亦須針刺插藥方效。隨後俱用蟾酥丸。冬月萬靈丹。發其大汗。毒方得解。不致積留毒氣。致生變症。今人治法。不論陰陽表裏。部位上下。凡見是瘡。便加艾灸。殊不佑頭乃諸陽之首元氣熱極所致。其形雖小。其惡甚大。再加艾灸。火益其勢。逼毒內攻。反爲倒陷。走黃之症作矣。既作之後。頭面耳項。俱能發腫。形如尸胖。七惡頓起治雖有法。百中難保一二。又有疔名數種。形狀紛紛。有舊說未及重錄。

疔瘡看法

初起如疖。形如粉刺。或小泡。或疙瘩。結腫不散者順。瘡腫不作寒熱。亦不惡心。飲食有味。手足溫暖者順。瘡腫肉不腫。四圍白色。多痛少癢。作膿者順。已潰出膿。瘡仍高腫。肉色鮮明。根內紅活漸平者順。初起似疔非疔。軟慢灰色。四邊瘡根平塌漫腫者凶。未發前。先作寒熱如

瘡。惡心不食。後出瘡如蚊迹蟲斑。或青紫黑泡。軟陷無根。瘡爛深孔。氣粗足冷者逆。瘡形如魚臍。項凹灰白。軟漫相兼。脈細身冷者多逆。肉腫瘡不腫。根腳走散。瘡頂空腐。血水氣穢者死。凡疔項以上。針刺不疼。項以下灸之不痛。俱死。己經走散。頭面耳項俱腫。煩躁脈細。痰動喘急者死。日久原瘡無迹。走散之處。仍復作膿。脉數唇焦終死。病雖險惡。歲運順者可活。瘡雖微險。歲運逆者當危。

疔瘡治法

初生在項以上者。必先針刺以去惡血。庶毒不內攻。在項以下者。必先艾灸。以殺其勢。庶不侵良肉。發熱作寒。身體拘急。六脈緊數。邪在表也。宜汗散之。身體發熱。口燥咽乾。脈實有力。二便秘澀者。宜下之。針刺之後。瘡不作腐。邊腫不消。仍加插藥。內用補托。初起悞灸。致毒走黃不住者。急當隨走處砭去惡血發熱乾嘔心煩作渴。悶亂神昏。當解毒清心。托裏護膜。潰後氣血受傷。神怯食少。睡臥不寧。宜助脾胃。斂神。氣將愈後氣血漸復。飲食當進。仍作渴者。急滋養腎水。

疔瘡治驗

一監生右顴下生疔三日。形如魚目。麻癢不常。此肺經受毒也。用針刺入四五分。其硬如骨有聲。隨用蟾酥條插至三日。猶不腐化。此堅頑結聚之病也。非此藥所能勝。換用三品一條槍。插至七日。外用紙封蓋。至十一日。脫出疔根一塊。約有指許。以長肉玉紅膏搽之。先服托裏消毒散。加金銀花二錢。白芷五分。脫後用八珍湯。加天花粉、麥門冬、黃耆、陳皮各一錢。調理月餘。肉已平。用珍珠散摻上結皮而愈。

一監生中年縱欲。自服補腎助陽之藥。以致腎水受傷。不能上制心火。左顴生一泡先紫後黑。麻木不知痛癢。黑屬腎經。其毒不淺。幸四邊尚未走散。即用針刺。以冰蠅散厚塗作條。插入患孔。仍用紙封勿令泄氣。早服加減八味丸。以滋腎水。午服益氣養榮湯。接補真氣。晚用琥珀蠟燭丸。護心解毒。至十一日外。疔根與藥結成一塊。依期脫落。乃用生肌斂口。補助調理脾胃之藥。二十日而愈。後因不慎保養。幾及三年。復成勞瘵而歿。

一婦年近四旬與夫不相得。懷抱鬱鬱。季夏腮發一疔。六日後方延余治。毒已走散。頭目脣項俱腫形色紫赤。余曰。肉腫瘡不腫業已走黃。不治之症。婦流涕嘆曰。一家皆絕也。余問其故。婦曰。吾夫不肖。有一女二子。尚未婚嫁。我死而托命於夫。必致流蕩。故我死則家絕矣。余聞其

言。不忍棄而不治。但瘡勢既大。非藥力可回。因先僱一貧人。與飯吃飽。再飲火酒數盃。隨用針刺腫上十數處。令其吸出惡血數碗。溫湯洗淨。用蟾酥錠磨濃塗之。四圍敷金黃散。早晚二次。內以護心散。蟾礬丸。清心護裏。兼服降火化痰開鬱安神之藥。餘腫稍退。又六日。其夫言何以不死。婦聞暴怒腫甚于前。復用針刺約十餘處出血三四碗。針孔上蓋小膏。餘腫仍用敷藥。出血既多。其內必虛。服人參養榮湯。加香附貝母。數日後。其針口漸癟餘腫漸消。其瘡頭乃得高腫。仍用蟾酥條插化腐潰。外用生肌斂口之藥。內服開鬱和中養血健脾之劑。百日外方愈。此瘡勉強治之得生。其後二子一女俱婚嫁。夫先故。婦今六十五歲矣。

一婦二十二歲。右耳垂向前一寸。生疔二日。請余視之。約有豆大。頂陷色灰。此肺經白刃疔也。又根腳棉軟。毒不結聚。爲陷伏陰症。未及針刺。其舅曰。何恙也。余直告曰疔瘡。彼冷笑不信。余因辭不用藥。復請他醫視之。曰不過風熱疮瘡耳。用消毒散二服。毒氣全收。昏憤喘急而死。

一少婦額下生疔。疮瘡作癢予欲針之。其家不信。自用灸法。次日四邊漸腫瘡漸陷。又三日頭面大腫復請余視。灸處已結黑靨乾陷無膿此毒氣內陷外肉已死。又面目浮腫。光亮發熱形狀不堪。此正氣衰而邪氣實也。治必不效。其家悔之無及。後半月而死。

疔瘡主治方

蟾酥丸 治疔瘡、發背、腦疽、乳癰、附骨、臂腿等疽。一切惡症疔瘡不痛。或麻木或嘔吐病重者必多昏憤此藥服之。不起發者即發。不痛者即痛。痛甚者即止。昏憤者即甦。嘔吐者即解。未成者即消。已成者即潰。真有回生之功。乃惡症中至寶丹也。

蟾酥蜜 輕粉蜜 枯礬 寒水石
銅線 乳香 浸藥 脣礬 霽香蜜 雄黃蜜 蝎牛蜜 珠砂蜜 以上各研末稱準。于端午日午時。在淨室中。先將蝎牛研爛。再同蟾酥和粘稠研。方入各藥。共搗極勻。丸如棗豆大。每服一丸。用葱白五寸。患者自嚼爛。吐於男左女右手心。包藥在內。用無灰熟酒一茶鍾送下被蓋。約人行五六里許。出汗爲效。甚者再進一服。修合時。婦人雞犬等忌見。

黃連解毒湯 治疔毒入心。內熱口乾。煩悶恍惚。脈實者 黃連 黃芩 黃柏 山梔 連翹 甘草 牛蒡子蜜 水二茶鍾燈心二十根。煎八分。不拘時服。

立馬回疔丹 治疔瘡初起。已用針刺後。又或悞炙失治。以致疔毒走

散不住。乃走黃險惡症也。急用此插。
 蟬酥酒 硼砂 輕粉 白丁香
 螺鈿 雄黃 珠砂 乳香 分 麝香 分 金頂砒五分製法
詳末卷 共爲細末。
 糊成麥子大丸。遇疔瘡針破。用此一粒。插入孔內膏蓋之。追出膿血疔根
 爲效。

疔毒復生湯 治疔瘡走黃。頭面發腫毒氣內攻。煩悶欲死者。 牡
 碩 山梔 金銀花 木通 連翹 牛蒡子 乳香 沒藥 角刺 花粉 大
 黃 地骨皮八分 水酒各一茶鍾。煎一半。食遠服。不能飲者水煎。臨服入
 酒一盃和服亦效。脈實便秘者。加朴硝。

七星効治十三種疔瘡初起。憎寒作熱。惡心嘔吐肢體麻木。痛癢非常
 。心煩作躁。甚者昏憒。宜急服之。 野菊一錢 蒼耳頭 豬豨草 半枝
 蓮 蒂丁香 麻黃二錢 草河車一錢 用好酒一斤。煎至一碗濾澄熱服。蓋被
 出汗爲度。冬月無鮮草。宜預採陰乾。臨時煎服之亦效。

鉛粉散 治疔瘡生於腳上。初起紫白泡。疼痛徹骨。漸至腐爛。深孔
 紫黑。血水氣穢。經久不癒用此大效。 黑鉛八四兩燒後化開傾入水中取起再化如 松脂一錢
 黃丹五分 麝香二分 輕粉五分 共研。先用葱湯將瘡浩淨。麻油調敷瘡口
 。油紙蓋外。

化疔內消散 治疔瘡初起。或已針已炙之後。服之能令內消。皂角
 刺 金銀花 知母 貝母 天花粉 穿山甲 白芨 乳香 赤芍 半夏
 甘草 草河車一錢 水酒各一茶鍾煎一半量病上下。食前後服之。

束毒金箍散 治疔瘡針刺之後。餘毒走錢作腫宜此藥箍之。
 錫金半錢 吐白芨 白芷 大黃一錢 黃柏一錢 輕粉一錢 莢豆粉一錢 共爲細末。
 酸米漿調箍四邊。夏月熱甚者。蜜水調。

解毒大青湯 治疔瘡悞灸。逼毒入內。致生煩渴。譫語不定者。元
 參 桔梗 大青葉 知母 升麻 石膏 山梔 人中黃 麥門冬 木通一錢
 大黃一錢 燒人糞 水二茶鍾。淡竹葉燈心各二十件。食遠服。

消疔簡便方 治疔瘡及諸惡毒初起但未成膿者。 白礬末一錢 葱白一錢
 右二味同搗極爛分作七塊每塊用熱酒一盃送下。服畢用厚被蓋之再吃葱白
 湯一盃少頃汗出如淋。從容去其覆物。其痛若失。此雖味澀難服。其效更
 妙。凡居鄉村之處倘有緊病。不及請醫。只傳此方服之。活人甚衆。誠爲
 良便方也。

太乙紫金丹 解諸毒。療疔瘡。利關竅。通治百病。此藥真能起死回
 生。製之濟人。奇效不可盡述。凡居家出入。興大工動大兵。及閩廣貴仕

宦者。不可無之。山茨菇沈去皮毛
淨焙二兩 川文蛤一名五倍子
破淨焙一兩 麝香拂淨毛皮乾
者研淨三錢 千金子一名續隨子仁
白者去油一兩
 紅芽大戟杭州紫大戟爲上江南次之北方綿大戟色白者性峻烈刺損傷元氣弱入服
之有致壯血憤之勿用取杭州之上品者去莖葉洗淨焙乾爲末一兩五錢整 砥砂有氣者研
粗末三錢 雄黃解紅大塊者
研細末三錢

以上之藥各擇精品。于淨室中製畢。候端午七夕重陽。或天月二德天醫黃道上吉之辰。凡入室合藥之人。三日前俱宜齋戒。更換新潔衣帽臨日方入室中。淨手薰香。預立藥王牌位。主人率衆焚香拜禱事畢各將前藥七味。復戥稱準。入于大乳鉢內。再研數百轉方入細石臼中。漸加糯米濃飲。調和軟硬得中。方用杵搗千餘合。至極光潤爲度。每錠一錢。每服一錠。病勢重垂者。連服二錠。以取通利。然後用溫粥補之。修合時。除合藥潔淨之人。餘皆忌見。此藥惟在精誠潔淨爲效。治一切飲食葯毒虫毒瘴氣惡菌河豚中毒。及自死牛馬豬羊六畜等類之肉。人候食之。必昏亂卒倒。或生異形之症。并用水磨灌服。或吐或瀉。其人必甦。南方山巒瘴氣。煙霧疫癘。最能傷人。感之纔覺意思不快。惡寒惡熱。欲嘔不嘔。即磨一錠服之得吐利便愈。癰疽、發背、對口、疔瘡、天蛇、無名腫毒。蛀癰、紅絲等症及梅楊瘡。諸風癰癰。新久痔瘡。俱用無灰淡酒磨服。外用水磨擦瘡上。日夜數次。覺癰而消。陰陽二毒。傷寒心悶狂言亂語。胸膈塞滯。邪毒未出。瘡疽煩亂發狂。喉閉喉風。俱用薄荷湯待冷磨服。赤白痢疾。肚腹泄瀉急痛。霍亂絞腸痧。及諸痰喘。並用薑湯磨服。男子婦人。急中顛邪。渴叫奔走。鬼交鬼胎。鬼氣鬼壓失心狂亂。羊兒豬癲等症。俱用石菖蒲煎湯磨服。中風中氣。口眼歪斜。牙關緊急。言語蹇澀筋脈攣縮。骨節風腫。偏身疼痛。行步艱辛。諸風諸癰。並用酒磨頓熱服下。自縊溺死驚死。壓死鬼魅迷死。但心頭微溫未冷者。俱用生薑續斷酒煎磨服。一切惡蛇風犬毒蝎。溪澗諸惡等虫傷人。隨即發腫。攻注偏身。甚者毒氣入裏。昏悶響叫。命在須臾。俱用酒磨灌下。再吃葱湯一碗。被蓋出汗立甦。新久瘡疾臨發時。東流水煎桃柳枝湯磨服。小兒急慢驚風。五疳五痢。脾病黃腫。癰疹瘡瘤牙關緊閉。並用薄荷浸水磨濃。加蜜服之仍搽腫上。年歲幼者。每錠分作數服。牙痛酒磨塗痛上。仍含少許。良久嚥下。小兒父母遺毒。生下百日內皮塌爛斑。穀道眼眶損爛者。俱用清水磨塗。打撲損傷。松節無灰酒研服。年深月近。頭脹頭疼。太陽痛極偏頭風及時瘡愈後。毒氣攻注。腦門作脹者。俱用葱酒研服一錠。仍磨塗太陽穴上。婦女經水不調。紅花湯下。凡遇天行疫症延街及巷相傳偏染者。用桃根湯磨濃搭入鼻孔。次服少許。任入病家。再不傳染。又治傳尸勞瘵諸藥不能禁忌。一方土指教服此。每早磨服一錠。至三次後。逐下惡物尸虫異形怪類。後得脫然。

。以此相傳。活人不計其數。一女子久患勞瘵。爲尸虫所噬磨服一錠。片時吐下小虫十餘條。後服蘇合香丸。其病頓失。調理月餘而愈。真濟世衛生之寶藥也。

人參清神湯 治疗瘡潰膿後。餘毒未盡。五心煩躁。精神恍惚不安。言語睡臥不清。服之降火清心。保扶元氣。人參 黃耆 當歸 白朮 麥冬 陳皮 茯苓 地骨皮 遠志^去 甘草 柴胡 黃連^去 水二茶鍾。糯米一撮煎八分。食遠服。

內托安神散 治疗瘡針後。已出膿時。元氣虛弱。臨睡驚悸。心志不安。或毒未盡。流入心竅。致多健忘亦宜服。人參 茯神 黃耆 白朮 麥東 元參 陳皮^去 酸棗仁 遠志 甘草 石菖蒲 五味子^去 水二茶鍾煎八分。臨服入硃砂末三分和勻。食遠服。

疔瘡應用方 蟻酥條即前蠅酥丸作
後裏併用之 琥珀蠅礬丸 玉紅膏 如意金黃散 托裏消毒散，護心散去 八珍湯益氣養榮湯 加減八味丸 人參養榮湯 珍珠散去 冰蠅散去

【探究、按語】

疔瘡一症，在漢朝「華陀中藏經」中例有五疔之名，隨朝「諸病源候論」例十種，唐朝「備急千金方」分十三種，明朝「外科啓玄」例三十四種，「証治準繩」例四十五種，實功嫌繁而以「中藏經」之五疔，推衍爲火焰疔、紫燕疔、黃鼓疔，自刃疔、黑蠻疔五種、加紅絲疔（亦名合谷毒）、蛇頭疔（亦稱天蛇毒）、痘疔、計八種。

五疔之說，是古人過於重視分經論治而來，祇能作爲參考，如實功云火焰疔者多生唇口手掌指節間，其發初生一點紅黃小泡，抓動痛癢非常，左右肢體麻木，重則寒熱交作，頭暈眼花，心煩發躁，言語昏憊，此等出於心經之病也。按唇口手掌指節皆不屬心經，初生一點小泡抓動癢痛非常，乃面部疔瘡之一般症狀也。肢體麻木則別有原因。重則寒熱交作，頭暈眼花，重症都有全身証狀。待至心煩發躁、言語昏憊時，有毒入心包，走黃之勢，此時此地，則與心經有關矣。其他類推。

疔瘡皆由四時不正之邪，或恣食煎炙、辛辣厚味，或誤食瘟病禽畜，腐米殘糞而生，即經所謂「膏粱之變，足生大疔」是也。初起如粟米豆粒，堅硬有腳若釘故名，發無定處，名目繁多，屬純陽之症、火毒之候，故其發甚速，其毒尤烈，常因失治或延誤醫治而致不救，反之若施治恰當，都能霍然痊癒，故屬急性症候。

大抵生於頭面者，初起如粉刺粟米，或發黃白色小泡，或癢或痛，或麻木不痛，或劇痛，繼則現頭，按之堅硬，日漸加劇，以致釀膿。生於手足等處者，以焮紅

大痛者多，亦有初起皮色不變，日漸加劇始感跳痛者，亦有先起身熱頭痛，及見局部証狀而漸漸釀膿者，如在頭面起速癰亦速，但具危險性，手足等處則起癰較慢，危險性少，但痛較劇烈。

治療之法，分外治內治兩部份

外治：初起用「紫金錠」或「如意金黃散」調敷，或用鮮菊葉，鮮地丁搗汁塗敷，促其消散，若已化膿，以脫出膿頭為急務，以「化疔丹」蓋以「黃連膏」，候膿頭排出，服「九一丹」拔毒收口。面部：疔瘡，均能自行排膿，手部則因肌肉堅厚，十九均須刀剖，但膿未成熟時，切忌動刀，否則輕者痛增而腫反不退，甚則胬肉翻突，痊癒亦慢，重者毒散而致惡化。

內治：各疔雖不雷同，但總以清火解毒為主，即使潰後真虛，亦不宜補之過早，應防留毒或竄生，便秘者，下亦不可過猛，免虛其裏而使邪陷也。初起之時，俱用「銀花解毒湯」或「蟾酥丸」如身體拘急，六脈緊數者，邪在表，宜汗以散之，但忌用辛溫散風藥物，如發熱口渴便秘，脈實有力者，邪在裏也，宜「黃連解毒湯」或「貴金丸」雙解之。如初起經誤炙而致毒散走竄，乃逼毒內攻也。急當隨走散處砭去惡血，服「解毒大清湯」。如麻木不痛，根盤散漫而不透膿，繼則面目浮腫，或見噁心嘔吐，肢體拘急等証者，即為毒散（走黃）之兆，即當解毒清心，托裏護膜，隨服「蠟礬丸」、「疔毒復生湯」加地丁草、銀花、連翹、牛黃之類，如神昏口噤如瘻者，係毒陷心包，已至危險境地，急服「犀角地黃湯」、「至寶丹」或「紫雪丹」、「七星劍湯」之類。若手足發冷，六脈暴絕者，係毒氣閉寒，不能宣通之故，宜先服「蟾酥丸」，次進「木香流氣飲」，以行其氣。若不省人事，牙關緊閉者，急用「奪命丹」灌之。若潰後氣血受損而致神祐食少，睡臥不寧者，宜助脾胃。膿水已盡，氣血漸復，飲食當進，但仍作渴者，宜滋養腎水，兼清胃火，刀鍼膿後或攻利太過，以致發渴，六脈虛大者，「補中益氣湯」，若發汗之後，汗出不止，身熱不退，瘡不疼痛，屬裏虛也，宜「八珍湯」。加黃耆麥冬等調治。內與外配合，局部整體同時進行，其效也速矣。

疔瘡宜針不宜灸，近世灸法已不用，火毒之候焉能熱攻，針法除紅絲疔偶用以止竄，手指疔可針刺手指末節，以及針刺委中令出紫血等外，亦已少用，尤以面部非但禁針，連擠膿都不可過壓，否則易生變端。

脫疽論第二十四

【原文】

夫脫疽者。外腐而內壞也。此因平昔厚味膏粱。薰蒸臟腑丹石補藥。消燬腎水。房勞過度。氣竭精傷。兼用房術之藥。或含舌下化水。直至丹田。或納臍中使熱。徑投內腎。爲丸掌握作香鼻嗅。或抹陰鼎或擦陽器。圖使堅硬。希求常濟。多致陽精煽惑。淫火猖狂。其蘊蓄于臟腑者。終成躁熱火症。其毒積于骨髓者。終爲疽毒陰瘡。巧人行拙。誰防禍起蕭牆。智者多愚。自謂喜從天降。直至骨枯髓涸。臟敗腑亡。方悔解脫無方。罹殃有故。凡患此者。多生於手足。手足乃五臟枝幹。瘡之初生。形如粟米。頭便一點黃泡。其皮如煮熟紅棗。黑氣漫漫。傳遍五指。上至腳前。其疼如湯潑火熱。其形則骨枯筋縮。其穢異香難解。其命仙方難治。故謂血死心敗。筋死肝敗。肉死脾敗。皮死肺敗。骨死腎敗。此五敗者。雖有靈丹。喪命而已。生此疾者。死生付于度外。孫真人曰。在肉則割。在指則切。即此病也。治之于早。乘其未及延散時。用頭髮十餘根。纏患指本節處。盡繞扎十餘轉。漸漸緊之。毋使毒氣攻延良肉。隨用蟾酥餅。放原起粟米頭上。加艾灸至肉枯瘡死爲度。次日本指盡黑。方用利刀。尋至本節縫中。將患指徐順取下。血流不住。用如聖金刀散止之。餘腫以妙貼散敷之。次日倘有黑氣未盡。單用蟾酥錠研末繆之。膏蓋。黑氣自退。患上生膿。照常法用玉紅膏等藥。生肉護骨完口。此爲吉兆。內服滋腎水。養氣血。健脾安神之劑。若內外無變症。十中可保其三四矣。若割取之後。黑色仍侵。痛腫尤甚。敗惡無膿。口乾舌硬精神不爽。食不知味者。終死。凡治此不可一已專任。必與高明衆議聽患者願割與否。因此症首尾吉凶難定。故不可輕易醫治。又有似是而實非者。詳註在後。宜參觀之。

脫疽看法

起瘡不渴。口潤舌和。性志尋常。無妄暴急。循禮爲吉。初出形如麻子。掀熱作痛。一指皆腫。根腳收束者吉。已成頭便作腐。肉不紫黑。疼痛有時。膿出膿消者吉。已潰先膿後腐。肉色紅活。毒不走散。氣不腥穢者吉。未瘡先渴。喜冷無度。昏睡舌乾。小便頻數。陽痿者逆。初起形如粟米。肉便紫色。不腫刺疼。黑氣延散者逆。已成瘡形枯腐。肉黑皮焦。痛如刀。毒傳好指者逆。已潰肉枯筋腐。血水臭汗。疼苦應心。零丁徹骨者逆。

脫疽治法

脫疽多生足指。少生手指。初起水窠黃泡者。即灸之。初生如粟。裏

可容穀。皮色紫赤。不作掀腫。髮扎仍炙。已炙之後。瘡受火氣。發泡作膿外藥箍之。內兼補托。毒勢已成。瘡形稍陷。但紫色未攻腳面者。評議割取。既割之後。血水淋漓。疼痛不減。和氣血。補脾胃。已成飲食漸少。身體倦怠。便數口乾。滋津液。壯腎水。破後血氣受傷。脾胃虛弱。自汗盜汗。惡心乾嘔。睡臥不安。日哺發熱。疼痛苦楚。煩悶譴妄。俱宜大補氣血。富貴及膏梁棄鑿色慾。每於房術縱恣日久。禁行割法。

脫疽治驗

一男子年近五旬右足小指。初生如粟米形漸成白泡。三日始痛請治。頭已腐爛。一指紫腫此脫疽也。用艾火明灸十三壯。始大痛乃止。又用針刺炙頂。貼蟾酥餅膏蓋。其餘紫腫用披針擊刺七八處。發泄毒血。用蟾酥錠磨濃塗之。腫外以真君妙貼散。敷護良肉。使不外侵。時病者脈數。身發寒熱。惡心體倦。先用人參敗毒散。解其表症。次用黃連內疎湯。通其大便。而惡心煩熱亦止。又用托裏消毒散。加金銀花牛膝數服。早用八味丸。晚用蠟礬丸。相兼服之。隨又針刺。泄其毒氣。解毒為膿。腫方少消後。用十全大補湯。加山萸、五味、麥冬等藥調理月餘而愈。此疽若不針灸發泄毒氣。專假藥力敷圍。再加峻藥攻利必傷元氣。豈能保乎。

一客商右足次指生一紫泡。痛癢異常。次日指甲俱紫欲黑。余曰。此乃肝腎二經之毒。甲乃肝之餘氣。甲紫則肝受毒也。骨乃腎之餘腎傷則骨黑。彼問何以致此。余曰。人凡勞疲精力傷于肝。誤服熱藥傷于腎。旁人曰。情實有此。彼久客狎妓。常服興陽等丸。恣情作樂已二年矣。余欲辭不治。彼哀告求生。冀得還鄉。余令先取妓者頂髮十餘根。撲線纏扎患指盡處。隨將艾炷在紫色處。排勻三炷。每灸七壯各貼蟾酥餅膏蓋。過夜一指皆黑。量其筋骨皮肉俱死。用利刀順節取脫患指。乃冰冷惡物。預煎甘草湯浸洗良久。俟疾血稍盡。以止血散繆之。次日灸處紫色不退。恐其上延。又以神燈法照之。候血散皮綢。合蟾酥丸料。多加海羊研爛服之。早晚二次。腫不復作。紫色變紅。紅色潰膿。外用生肌止痛活血收斂之藥。又熬參朮地黃膏。朝服接補真元。午服健脾藥。以固胃氣。晚用金液丹以解藥毒。如此調理三月而愈。或問用妓髮何也。余曰。以彼心愛之髮貼肉。雖疼而不疼。妓又如在目前。此妙用也。

一婦中年肥胖。患渴三載。右手食指麻癢月餘。節間生一泡。隨後本指漸腫。疼脹不堪。原泡處生黑斑。半指已變紫黑。此亢陽之極。乃成脫疽。脈洪大數而有力。與肥人相反。如再黑色上延。壞人迅速。詢知此婦

本富室無嗣。口縱膏梁。多服種子熱藥。中年喪夫。家業爲嗣子蕩盡。久懷憂鬱。與寡母同棲。身耽寂寞。此先富後貧。所願不得。又爲失榮症。辭不可治。再三哀懇。余乃遵孫真人治法。在肉則割。在指則切。先服人參養榮湯。隨後用軟絹條尺許。纏裹黑色盡處。好肉節上以漸收緊。次用利刀放準。依節切下。將手浸甘草溫湯中片時。血出不多。疼亦不甚。余曰。切而不痛。此爲氣血筋骨俱死。此指雖脫。未可得愈。因以八味丸料。加入參養榮大劑煎服。先救腎水。次扶脾胃。間用金液戊土丹。以解藥毒。後三日將纏裹處。漸漸放鬆。以通血脈。搽貼紅黑二膏。生肉止痛。既而手背手掌。日漸發腫。勢惡之甚。惟不黑色。此內毒已出之處。仍用神燈照法。兼以豬蹄湯淋洗其腫處。又出數頭。流去膿血無數。兩月外方得腫稍退。膿稍減。又以參朮膏。人參養榮湯。兼服半年外始愈。而指失矣。

一男僕冬月嚴寒。主使赤足履地。不敢移。血凍麻木。次日十指俱紫。又數日全變黑色。麻木不痛。請余觀之。強用辛熱散寒活血薰洗等藥不應。又延黑腳面。骨節一段甚疼。余曰。後必十指齊脫。其主疑爲脫疽。余曰。似是而非。尚可不妨。今當用桑火木炙之。取其溫煖活血。又能解散熱毒。患處漸腐漸脫。自不走散。內服健皮養血之藥。外用紅黑二膏。生肌百日外愈。

一待女十二歲。貌頗美。主嫌腳大。用布任意纏緊。以線密縫。脹痛不堪。訴主不聽。半月後流出臭水。方解視之。雙足前半段。盡皆黑腐。骨肉已死。余曰。已壞者不可復救。只救未壞者可也。先煮參粥食之。次煎葱湯。令主家僕婦。將兩足浸入湯內淋洗。再換湯浸。但腐肉不痛者。逐一剪割。連續知痛者。以花蕊石散搽之。俾將壞者復生。已壞者得脫。內服補中益氣湯。外搽生肌玉紅膏。此與男僕前案。雖俱得愈。終成廢疾一生矣。

一男子右足小指縫中。初生一點黃粟泡。皮肉隨變紫色。陰疼不堪有如刀刺。視其形色。真脫疽也。診其脈又細數無力。此腎經敗症。詢知生平大飲。內有妻妾三人。精力已竭縱治無功。遂起辭之。後延至腳面足底皆穿。疼痛徹骨、飲食日少。氣血日衰。形體日削。一月後百苦而終。

脫疽主治方

解毒濟生湯。治脫疽初起。惡寒體倦。發熱作渴或腫。或紫。或麻或痛。四肢倦怠。心志恍惚不安者。川芎 當歸 黃柏 知母 天花粉 金

銀花 麥冬 遠志 柴胡 黃芩 扉角 茯神 一錢 甘草 紅花 升麻 三錢
牛膝 五分 水二茶鍾煎八分。臨服入童便一盃。隨病上下服。

陰陽二氣丹。治脫疽久服丹石補藥。致虧腎水。多成口燥咽乾。至今冰雪不知其冷。此孤陽獨旺。宜服此解之。天冬 一錢 麥冬 一錢 五味子 半錢 黃柏 人中黃 小兒潤者生用研湯泡去粗皮各一兩 青黛 燒青者 甘草 枯礬 辰砂 一錢 潤鴻 三錢 冰片 一錢 各爲細末。同元參二冬膏子。加煉密少許。再搗千餘下。軟硬得中。丸如桐子大。每服六十九。童便乳汁各一鍾空心送下。其效如神。

清神散 一錢 治脫疽疔瘡。發背毒積。甚者腠理發越不盡。煩躁悶亂。睡則譖言。嘔吐不食。甘草節 三錢 菓豆粉 一兩 剥砂 三錢 梅花片 五分 牛黃 三分 右爲細末。每服一錢。淡竹葉燈心湯調服。

雌雄霹靂火。治脫疽。及一切發背。初起不疼痛者。艾茸 三錢 丁香 雄黃 雌黃 一錢 霽香 右四味。共研極細。搓入艾中作黃豆大丸。放於患上炙之。毋論痛癢。以肉焦爲度。如毒已經走散。就紅暈處排炷炙之。痛則至癢。癢則至痛爲妙。炙後仍用提疔麥子貼上膏蓋。次用蟾酥丸。及解毒濟生湯。轉回活色。有膿爲妙。

金液戊土丹。治脫疽及疔瘡發背。先因縱食膏梁厚味醇酒。又或丹石補藥。勉力入房。多致積毒臟腑。久則胃汁中乾。腎水枯竭。不能上制心火。以致消渴消中消腎。饒飲多乾能食多瘦。九竅不通。驚悸健忘。見此諸症。後必發疽。多難治療。宜預服此。可轉重就輕。移深居淺。又解五金八石之毒藥也。人中黃 半錢 烏梅肉 茯神 明黃連 五味子 半錢 石菖蒲 辰砂 雄黃 遠志 硝石 一錢 牛黃 冰片 一錢 金箔 三十張 各爲深末。配準前數。共入乳鉢內。再研千轉。於端午七夕。或二至二分吉辰。在淨室中。先將烏梅地黃二膏。搗極爛。和藥。漸加煉蜜少許。徐徐添搗。軟硬得中。每藥一兩。分作十九。金箔爲衣。每服一丸。用人乳童便共一大盃化藥。隨病上下。食前後服之。此藥最解膏梁金石葯毒。殺三尸。除勞熱。極有功效。又治煩顛。安神志。辟瘡辟溫。及諸邪魅譖語。失心喪志者俱效。修合之時。服藥之際。俱忌婦人僧尼孝服。雞犬等見之。此藥封固收藏。不泄藥味。愈久愈效。

脫疽應用方 針刺法 蟾酥丸 蟾酥餅 半錢 蟾礬丸 神燈照法 太乙膏 眞君妙貼散 內疏黃連湯 托裏消毒散 豬蹄湯 玉紅膏 一錢 十全大補湯 參朮地黃膏 人參養榮湯 棘中益氣湯 加減八味丸 半錢 桑木炙法 半錢 人參敗毒散 半錢 如聖金刀散 花蕊石散 半錢

【探究、按語】

「靈樞，癰疽篇」首載本病，“發于足指，名脫疽，其狀赤黑，死不治，不赤黑不死，不衰急斬之，不則死矣”。唐「千金翼方」云：“毒在肉則割，毒在指則切”。實功宗之，壞死處割或切，其法至今未廢。

都生足指間，指少而趾多，且常見起大趾，繼而蔓延。多由膏粱藥酒房術丹石，淫火旺盛，蓄積臟腑，消爍陰液，或脾胃失調，或由寒濕深蘊骨骼之間，積久化熱而成。

初起或先煩躁發熱，類若消渴，後覺某趾麻木或火熱感，或無發熱等症，而先見某趾起黃泡一粒，周圍皮色焮紅或紫暗，有一處或數處同時而起者，漸漸疼痛，繼則發紅紫為黑腐，迅速蔓延，痛亦隨增，如湯之激，如火之燒，或腐爛，或乾黑，侵腐至筋斷，脫其首節，直至腳背脰部，漫無止境，亦有整趾焦脫，不一而足，因痛影響睡眠、飲食，終至神困敗脫。

初服「解毒濟生湯」，外用大麥米煮飯，拌芙蓉葉、菊花葉各五錢，貼之止痛，消之不應，必施割法，且應乘其未及延散時早割，有消渴者宣慎。外敷止血生肌，內服滋養健脾等參考原文。

如患肢喜冷怕熱，劇痛，患部掀熱紅腫、或身熱煩躁，便祕瀉赤，舌黃膩或灰黑，脈洪或弦數者熱毒也、「四妙勇安湯」加味。如初起患肢喜暖怕冷，觸之冰冷，皮色蒼白成潮紅，感覺麻木，或遇冷則更痛，但無潰瘍，脈沉遲，舌淡苔白者，屬虛寒，「當歸四逆湯」、「真武湯」、重者「陽和湯」、氣虛瘀滯者，肢端現瘀血斑點、趺陽脈、太溪脈消失、「顧步湯」皆可加減選用。

卷 五

瘰癧類第二十五

【原文】

夫瘰癧者。有風毒濕毒氣毒之異。又有瘰癧筋癧痰癧之殊。風毒者。外受風寒。伏于經絡其患先寒後熱。結核浮腫。熱毒者天時亢熱。暑中三陽。或內食膏梁厚味。釀結成患。色紅微熱。結核堅腫氣毒者。四時殺厲之氣。感冒而成。其患耳項胸腋。驟成腫塊。令人寒熱頭眩。項強作痛。瘰癧者。累累如貫珠。連結三五枚。此不作寒熱。其患得於悞食虫蠍。鼠殘不潔之物。及宿茶陳水。或內有汗液。其患先小後大。初不覺疼。久方知痛。筋癧者。憂愁思慮。暴怒肝傷。蓋肝主筋。故令筋縮。結蓄成核。生於項側筋間。形如棋子。堅硬大小不一。或陷或凸。久則虛羸。多生寒熱。勞怒則甚。痰癧者。飲食冷熱不調。飢飽喜怒不常。多致脾氣不能傳運。遂成痰結。初起如梅如李。生及偏身。久則微紅。後必潰破易於收斂。凡觀此症。分別施治。風毒者。散其風。除其濕。如防風解毒湯之類是也。熱毒者。清其脾。瀉其熱。連翹消毒飲之類是也。氣毒者。調其血。和其氣。藿香正氣散之類是也。瘰癧者。散其堅。和其血。散腫潰堅湯之類是也。筋癧者。清其肝。解其鬱。柴胡清湯之類是也。痰癧者。豁其痰。行其氣。芩連二陳湯之類是也。又有寡婦尼僧。鰥夫庶妾。志不得發。思不得遂。積想在心。過傷筋力。此勞中所得者。往往有之。最為難治。宜先養氣血。次開鬱結。益腎安神。疎肝快膈。如歸脾湯。益氣養榮湯。俱加香附、青皮、山梔、貝母、木香之類是也。又男人不宜太陽青筋。咳嗽潮熱。自汗盜汗。女人又忌眼內紅絲。經閉骨蒸。五心煩熱。男婦有此。後必變為癆瘍難治之症。體實者。初起可服散腫潰堅攻利之藥。得效者十中三四。有不察虛實。盡劑追伐。損傷元氣。致成壞病者。十有八九。此非患者之命。自由誤于醫人之手。予常治初起成核。服前藥未效者。用針刺核內。深入三四分。用冰蠅散撲成條。插入核內。糊紙封上。待至二七後核子自然落出。隨用紅黑二膏搽貼。內服補劑。不久便愈。常見有用斑蝥、牽牛、巴霜、大黃等藥追蝕。多致危亡。切宜戒之。

瘰癧看法

初起核高腫痛。色紅根活微作寒熱。肩項不強者順。已成根不堅硬。內無小核叢生。脾健氣血不衰者順。已潰膿稠。肉色紅活。核腫漸消。肩項自便漸歟者順。潰後易消易歟。氣體平和。胸膈寬利飲食知味者順。未成形體消瘦寒熱往來。結核頑硬。痰嗽相兼者險。已成核堅。連續如珠。大小不等。項強筋急脈虛者險。已潰膿水清稀肌肉消鑠。自汗盜汗。寒熱不睡者逆。潰後陰虛煩躁作渴。大便泄小便秘。男子骨蒸。女人經閉俱逆。

瘰癧治法

初起腫痛。憎寒壯熱。四肢拘急項強頭眩者表散之。腫硬發熱便利口乾。胸膈不寬。惡心脈實者宜利之。膏梁厚味。醇酒積熱。濕痰凝結而成者。宜化痰降火清中。憂思過度。鬱怒傷肝。筋縮結核者。宜開鬱養血疏肝。房慾勞傷。陰虛哺熱。自汗咳嗽形體消瘦者。滋腎健脾。失利亡名。懷抱鬱結。積想在心。所如不得。乖隔陰陽。虛熬歲月而得者。精血俱傷。先養正氣次治標病。堅而不潰腐而潰之。潰而不歟。補而歟之皆活法也。

瘰癧治驗

一男人項核腫痛。拘急惡寒。用荆防敗毒散二劑。表症悉退。餘核不消。用散腫潰堅湯。加川芎香附貝母十餘服。其核漸消。外以虎骨膏貼之。月餘而安。

一男子仲冬渡江。暴冒霧氣。又值驚恐。次日寒熱交作。頭面耳項俱腫。先用藿香正氣散二服。寒熱即止。面腫漸消。惟項間堅腫不退。紅掀作痛此。毒聚必欲作膿。仍用正氣散。加芎歸皂刺數服。候膿熟針之。腫痛頓退。又用十全大補湯脾。健肌生完口。

一婦婦居六載。子幼未立。憂鬱成核已半年。兼經水不調。寒熱交作。形體消瘦。脈亦弦數。此勞傷氣血。肝火妄動而成。所謂損者益之。不可用追蝕之藥。損而復損。先用逍遙散。加香附牡丹皮貝母。和其血脈。疏其肝氣。寒熱盡退。次用益氣養榮湯。服至月餘。氣血漸復。經水漸調元氣漸醒。外用火針核上點破四孔。用黃線藥插入五六次。候氣孔大。換用冰蠅散搽核上封之。至十三日外。其核自落。外搽玉紅膏。生肌收斂。內服人參養榮湯。加香附木香三十餘劑。其口自完。此婦慎起居。忘七情。戒口味。盡調理。故可得愈。否則必不能矣。

一室女年十七。因父擇婿未遂。耽至二旬懷抱鬱久。項生數核。堅硬如石。此肝經凝結筋縮之病也。兼經水斷絕。寒熱如瘡。咳嗽膿痰。惟不顴紅。此陰虛火動已。成勞瘵症也。非藥能愈。視其形狀喜無敗色。余曰。欲治其病當先治其心。父問曰。何藥治心。余曰。非藥也。易曰。天地絪緼萬物化醇。男女構精。萬物生化。此天地男女生成化育之道也。斯病起于孤陰寡陽。不生不化。所謂逆理之病。由于女大失配。是謂當至而不至。漸成失度之候。其病不至而自生。故藥不能挽回。必得陰陽和而雨澤降。夫婦和而家道成。斯時方可用藥。其父始悟。遂即擇嫁。三月後。復請余視。前症稍定。先用逍遙散。加香附青皮山梔丹皮貝母十餘劑開鬱疏肝。寒熱漸止。次以人參養榮湯。加丹皮紅花通其血脈。使心血易生容顏稍澤。又有益氣養榮湯倍參丸。培助脾胃。增進飲食。間用歸脾湯。加麥冬五味遠志沙參。收斂神氣。寬慰性情。又製參朮地黃膏。服至半年。精神頓復。經事亦通。惟核不能全退。用火針點破一核。琥珀膏貼之。漸腐爲膿。又兩月而得收斂。尚有三核。亦漸針漸潰漸斂。首尾純用補脾開鬱藥。調理一年。始得全愈。

一男子年近三十項生數核。面白神疲皮粗脈數。此元氣受傷之症。當先補養血氣。待根本壯實。再治其瘡。隨用養榮健脾藥十餘劑未效。彼以爲緩。又爲方士所惑。冀圖內消。自服斑蝥巴麝之藥。連瀉十數行。後至小便淋漓不止。更增虛熱。飲食減少。又復請視。形色已敗。辭而不治。又請內科強投扶助降火之藥。終不應而死。

一婦壯年性急。夫蕩不回家。左項生核半載。漸至雞卵大。堅硬如石。皮外紅絲纏繞。左右脈俱弦數。弦屬肝火妄動。數乃脾熱之甚。先用梔子清肝湯。平伐肝木。五服而脈始平。又用清肝解鬱湯數服。散其鬱結。次用益氣養榮湯。調其氣血。間用散腫潰堅湯軟其堅腫。外以琥珀膏貼之。調理百日。元氣乃復。堅硬已消八九。只存小核。彼以爲愈。止不服藥。後一載。因夫賭訟未勝。暴急驚恐。前病復作。兩手脈細而多數。此陰血虧損。陽火乘之。非前有餘症也。又兼胸膈不利。飲食無味。經水先期過多。形容憔悴不澤。此神傷于思慮則肉脫。意傷于憂愁。則皮廢。魂傷于悲哀。則筋掣。魄傷于喜樂。則皮槁。志傷于暴怒。則腰脊不能俯仰。以上俱七情內損症。也法當滋養氣血。調和脾胃。益腎清心。開鬱散滯。庶保無虞。彼不肯信。仍欲服散腫潰堅之藥。并灸腫處。以圖內消。余辭不治。彼請客醫仍服前藥。灸腫處并灸肘尖。真氣虛而益虛。邪氣實而益

實。反加發熱自汗。咳嗽項強。四肢不收。灸瘡不癟。血水不絕。腫亦熾甚。致成臟腑已損之候。又傳爲氣急聲啞。痰血交出而歿。余嘗見病家及庸醫。不辨虛實。妄行用藥。多致不救。所當猛省。

瘰癧主治方

防風解毒湯 治風毒瘰癧。寒暑不調。勞傷湊襲。多致手足少陽分耳項結腫。或外寒內熱。痰凝氣滯者 防風 荆芥 桔梗 牛蒡子 連翹 甘草 石膏 薄荷 枳殼 川芎 蒼朮 知母 水二茶鍾燈芯二十根煎八分食遠服。

連翹消毒飲 治熱毒瘰癧過食炙燙。醇酒高粱。以致蘊熱腮項成核。或天行亢熱。濕痰作腫。不能轉側者。連翹 陳皮 桔梗 元參 黃芩 赤芍 當歸 山梔 葛根 射干 禾粉 紅花等 甘草等 大黃初便燥者起加之 水二茶鍾。煎八分。食遠服。有痰者。加竹茹等

加味藿香散 治氣毒瘰癧外受風邪。內傷氣鬱以致頸項作腫。肩膊強痛四肢不舒。寒熱如瘡。及胸膈不利。藿香 甘草 桔梗 青皮 陳皮 柴胡 紫蘇 半夏 白朮 茯苓 白芷 厚朴 川芎 香附 夏枯草等 薑三片。棗二枚。水二茶鍾。煎八分。食遠服。

滋榮散堅湯 治一切瘰癧憂抑所傷 氣血不足 形體瘦削。潮熱咳嗽。堅硬腫痛。無分新久。但未穿潰者並效。川芎 當歸 白芍 生地 陳皮 茯苓 桔梗 白朮 香附等 甘草 海粉 貝母 人參 昆布等 升麻 紅花等 水二鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。身熱加柴胡 黃芩。自汗盜汗。去升麻。倍人參黃耆。飲食無味。加 香砂仁。食而不化。加山楂麥芽。胸膈痞悶加澤瀉木香。咳嗽痰氣不清。加杏仁麥冬。口乾作渴。加知母五味子。睡臥不寧。加黃柏遠志棗仁。驚悸健忘。加茯神 石菖蒲。有汗惡寒。加薄荷半夏。無汗惡寒。加茅朮藿香。女人經事不調。加延胡索牡丹皮。腹脹不寬。加厚朴大腹皮。

益氣養榮湯 治抑鬱。或勞傷氣血。或四肢項頸筋縮。結成累累如貢珠者。謂之筋癧。此皆由思慮太過。神氣受傷。乃勞中所得也。其患或軟或硬。或赤或不赤。或痛或不痛。或日脯發熱或潰而不斂者是。 人參 茯苓 陳皮 貝母 香附 當歸 川芎 黃耆 熟地 白芍等 甘草 桔梗等 白朮等 薑三片。棗二枚。水二茶鍾。煎八分。食遠服。

芩連二陳湯 治痰癧生於少陽部分。項側結核。外皮漫腫。色紅微熱或至缺盆高骨上下發腫形長堅硬作痛。名曰馬刀。初起並宜服此。已成氣

弱者不宜。黃芩 黃連 陳皮 茯苓 半夏 甘草 桔梗 天花粉 牛蒡子 連翹各一錢 木香三分 夏枯草三錢 薑三片。水二茶鍾。煎八分食後服。渣再煎。臨睡服。

散腫潰堅湯 治瘰癧馬刀。堅硬如石。或在耳下。或在缺盆。或在肩上。或在脇下。皆手足少陽經症。又發于下頸。或至頰車。堅而不潰。或已破流膿。又屬足陽明症也。此方治有餘之症效多。不足之症效少。黃芩分 白芍 當歸龍膽草 桔梗 知母一錢 黃柏一錢 天花粉 昆布五錢 連翹 葛根 炙甘草 甘連 三稜炒去殼 蒿遠三錢 柴胡四分 升麻三分 水二茶鍾。煎八分。食後服。臨服入酒一小杯亦效。此藥可爲末。煉蜜爲丸。桐子大。每服八十九丸。即散腫潰堅丸。治症同前。臨睡食後。俱白滾湯下。

升麻散堅湯 治瘰癧繞頸。或至頰車。或屬陽明。核深陷隱曲肉底。又屬足少陰。俱作腫塊堅硬。大小不一。升麻 甘草 蒿遠 三稜 陳皮 桔梗 黃連 龍膽草 葛根 川芎 白芍 夏枯草 連翹 黃芩 當歸五錢 天花粉兩錢 水二茶鍾。煎八分。食後熱服。再用上藥加倍爲末。蜜丸葵豆大。每百丸。黃酒臨睡服。頭不枕更妙。

夏枯草湯 治瘰癧馬刀。不問已潰未潰。或已潰日久成漏。形體日削。飲食不甘。寒熱如瘧。漸成勞瘵並效。夏枯草錢 當歸錢 白朮 茯苓 桔梗 陳皮 生地 柴胡 甘草 貝母 香附 白芍一錢 白芷 紅花各三分 先用夏枯草。水三碗煎至二碗濾清。同藥煎至八分。食後服。將藥渣同前夏枯草渣共再煮六七分，臨臥時，入酒半小鍾和服，宜服淡味物件。

活血化堅湯 治一切瘰癧及癰瘤痰核初起未湯膿者，防風 赤芍 歸尾 天花粉 金銀花 貝母 串芎 角刺 桔梗一錢 僵蠶 原朴 五靈脂 陳皮 甘草 乳香 白芷梢五錢 水二茶鍾煎八分。臨服用油一小盃食後服。

逍遙散 治婦人血虛。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心忡頰赤。口燥咽乾。發熱盜汗。食少嗜臥。及血熱相搏。月水不調。臍腹作痛。寒熱如瘧。及治室女血弱。榮衛不調。痰嗽潮熱。肢體羸瘦。漸成骨蒸。當歸白芍 茯苓 白朮柴胡一錢 香附八分 丹皮三分 薄荷 黃芩有熱加五錢 水二茶鍾。煎八分。食遠服。有寒加薑三片。棗二枚。

通治瘰癧方 治瘰癧不分新久。表裏虛實。及諸痰結核並效。陳皮 白朮 柴胡 桔梗 川芎 當歸 白芍 連翹 茯苓 香附一錢 夏枯草

黃芩 **藿香** **半夏** **白芷** **甘草** **薑** 三片。水二茶鍾。煎八分入酒二小盃。臨睡時服。

芎歸養榮湯 治瘰癧流注。及切不足之症。不作膿。或不潰。或已潰不飲。或身體發熱惡寒。肌肉消瘦。飲食少思。睡臥不寧盜汗自汗。驚悸恍惚。**歸身** **人參** **黃耆** **白朮** **川芎** **白芍** **熟地** **五味子** **麥冬** **遠志** **甘草** **茯苓** **牡丹皮** **砂仁**。水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

冰蠅散 治瘰癧日久。堅核不消。及服煎藥不效者。用此點落癧核。如馬刀根大面小。及失榮等症忌用。**大田螺** 五枚去殼
日中線穿晒乾 **白砒** 一錢二分
煅熟 **冰片** 三分 碉砂 用晒乾螺內切片 同煨熟。白砒碾爲細末。加硇片再碾。小罐密收。凡用時。先用艾炷炙核上七壯。次後灸瘡起泡。以小針挑破。將前藥一二厘。津唾調成餅。貼灸頂上。用棉紙以厚糊封貼核上勿動。七日後。四邊裂縫。再七日。其核自落。換搽玉紅膏。內服補藥。兼助完口。此藥又治癰瘤患大蒂小。及諸般高突。異形難狀者。

紫霞膏 治瘰癧初起未成者。貼之自消。已成未潰者。貼之自潰。已潰核存者。貼之自脫。及治諸色患瘡癰瘍。濕痰濕氣。新久棒瘡。疼痛不已者。明淨松香 二錢 銅綠 二錢 蔗油 四兩 銅鍋內先熬至滴水不散。方下松香熬化。次下銅綠。熬至白烟將盡。其膏已成。候片時傾入姿罐。用時湯內頓化。旋攤旋貼。

琥珀膏 治瘰癧及腋下。初如梅子。結腫硬強。漸若連珠。不消不潰。或潰後膿水不絕。經久不瘥。漸成漏症。**琥珀** 兩 **木通** **桂心** **當歸** **白芷** **防風** **松脂** **硃砂**。木鱉肉 **草麻仁** 五錢 **丁香** **木香** 二錢 **麻油** 三兩 **黃丹** 四兩 先用琥珀 **丁香** **桂心** **硃砂** **木香** 爲細末。其餘切片。浸油內七日。入鍋內。慢火熬至群藥焦爲度。絹濾淨油。徐下黃丹。以柳枝手攪。候至膏成。滴入水中。軟硬得中。搬下鍋來。以盆頓穩。攪至烟盡。方下末藥攪勻。姿器盛之。臨時取少許攤貼。

大紅膏 治瘰癧痰核結塊。不分新久。但未穿破者。**南星** 兩 **銀硃** **血竭** **硝石** **樟腦** 三錢 **輕粉** **乳香** 二錢 **貓頭骨** 一具 **石灰** 一兩用大黃二錢切片
同研石或紅色去大黃 右共爲細末。陳米醋熬稠。調藥敷核三日一換敷。後皮嫩微損者。另換紫霞膏貼之。其核自消。

火針法 治瘰癧痰核生于項間。初起堅硬。或如梅李。結聚不散。宜用此法針之。指藥易消。用縫衣大針二條。將竹筋頭劈開。以針雙夾縫內

。相離一分許。用線扎定。先將桐油一盞。用燈芯六七根。油內排勻點著。將針燒紅。用手指將核捏起用針當頂刺入四五分。核大者再針數孔亦妙。核內或痰或血。隨即流出。候盡以膏蓋之。次日針孔作膿必盡。輕者用黃線藥插之。核堅硬者用冰榔散。糊打成條。晒乾插之。外以糊紙二重封固。次日其核發腫作痛不妨。乃藥氣攻入于內。又至七日外。自然核外裂開大縫。再至七日。其核自落。葱蔥湯洗淨。換用玉紅膏擦入。外以膏益。內服益氣養榮湯。或十全大補湯加香附。兼戒勞動氣惱房事。發物煎炒海腥等件。

三品一條槍 上品錠子去十八種痔。中品錠子去五漏翻花。瘰瘤氣核。下品錠子。治瘰疬疔瘡發背腦疽等症。此爲古之三品錠子。但藥同而分兩不同。故治病有分別。今方名三品一條槍。隨症可用藥品有簡易不繁。凡同志者。隨試而用之。明礬_{二兩} 白砒_{五錢} 雄黃_{三錢} 乳香_{三分} 砒礬二味。共爲末。入小罐內。加炭火煅紅。青烟已盡。旋起白烟。約片時上下紅徹住火。取罐頓地上。一宿取出。約有砒礬淨末一兩。加入雄黃乳香。共研極細。厚糊調稠。搓成如線條。陰乾。凡遇前症。有孔者插入孔內。無孔者先用針放孔竅。早晚插藥二次。患孔藥條滿足方住。以後所患四邊。自然裂開大縫。共至十四日前後。其疔核瘰疬痔漏諸管。自然落下。隨用湯洗。搽上玉紅膏。虛者兼服健脾之藥。

瘰疬酒藥方 治年久瘰疬結核。串至滿項。頑硬不穿破者。鶴蟲草半
忍冬藤六兩 野菊花四兩 野蓬蒿四兩 五爪龍三兩 馬鞭草一兩 上藥切碎。用醇酒十五
酌。將藥袋貯。懸于酒內。封好罐口。煮三炷香爲度。取起水頓浸一伏時。初服盡醉。出汗爲效。已後隨便飲之。盡酒一料。病愈不發。

消核膏 製甘遂兩 紅芽大戟兩 白芥子八錢 麻黃兩 薑半夏六錢 生南星六錢 僵蠶六錢 藤黃六錢 朴硝六錢 右用真麻油一斤。先投甘遂南星半夏。熬枯撈出。次下僵蠶。三下大戟麻黃。四下白芥子。五下藤黃。逐次熬枯六下朴硝。熬至不爆。用絹將油濾淨。再下鍋熬滾。徐徐投入。炒透東丹。隨熬隨攪。下丹之多少。以膏之老嫩爲度。夏宜稍老。冬宜稍嫩。膏成乘熱傾入水盆中。扯拔數十次。去其火毒。即可攤貼。宜厚勿薄。此膏妙在不用毒烈之藥。雖好肉無損。

洞天救苦丹 蜂窠_{有蜜者} 雄鼠糞_{有糞者} 青皮 棍樹子_{桑枝者} 右藥瓦上各炙存性。各研極細。稱準等分和。每服三錢。陳酒送下。醉蓋取汗。

大棗丸 山羊屎 大棗 右將山羊屎晒乾入鍋炒灰存性。悶煩磨粉收

藏。遇久爛不堪將見內腑者。以大棗去皮核。先搗爛如泥。然後酌量分前粉。搗至成丸。每服四錢。仍以黑棗湯送下。

山蓮散 山羊屎 大活鯽魚尾 麝香錢 右將鯽魚破腹去雜。以山羊屎塞實魚腹。瓦上慢火炙乾存性研末加入麝香再研。姿瓶固貯勿泄氣。

附錄全生集治驗兩案 楓鎮閔姓年十七。頸患瘰癧爛成片片。延至耳腋及腰。如手掌大者數處。瘦弱成怯。初以洞天救苦丹與服。毒水大流。十日後以陽和湯醒消丸。每日早晚各服一次。又十日項能舒轉。飲食日增。接服大棗丸。始終用荆芥湯洗。以山蓮散敷。外貼陽和膏。凡九十日收功。因未服子龍小金二丸。毒根未除。後腋生惡核。服子龍丸而消。

王姓媳頸患瘰癧數個。兩腋惡核三個。又大腿患一毒。不作疼癢。百餘日後。漸如斗。按之如石。皮現青筋。當作抽痛。經歷數醫皆謂是瘤。余曰。瘤乃軟者。世無堅硬之瘤。此石疽也。問可治否。答曰。初起時皆可消。日久發大上現筋紋。雖按之如石。然其根下已成膿矣。抽痛即有膿之證也。上現青筋者。內作黃漿可治。如上現小塊。高低如石巖者不治。三百日後主大痛不潰而死。如現紅筋者其內已通血海不治。倘生斑點。即自潰之證。潰即放血。三日內斃。今所現青筋。醫令至軟爲半功。潰後膿漿濃厚可收全功。乃以活商陸搗塗。內服陽和湯。十日而抽痛止。十三劑裏外作癢。十六劑項軟。十八劑周圍皆軟。其頸項之瘰癧。二腋之惡核。盡消散無踪。止臍石疽。起立則內膿袋下。令服參一錢。再行開刀。因在筋絡之處。先用銀針刺穿。後以刀闊其口。以紙釘塞入孔內。次日兩次流水斗餘。遂用大劑補托。千金內托散。刪去人參倍增生耆。連進十劑。相安已極。適有伊戚亦業外科者。令其耆草皆炙。不三日四圍皆腫。內作疼痛。復延余治。乃令服前方耆草不炙。又用二十餘劑。外用陽和膏。隨其根盤貼滿。獨留患孔。加以布捆綁。人問因何用膏貼。又加捆綁。答曰。凡屬陰疽。外皮活。內膜生。故開刀傷膜。膜爛則死。所出之膿在皮裏膜外。中似空術。又不能以生肌藥放入。故內服溫補滋陰活血之劑。外貼活膿溫緩膏藥。加以捆縛。使其皮肉相連易于膿盡。且又易于連接生肌耳。果綁後數日。內膿濃厚。前方加參。服二月收功。

【探究、按語】

「內經、靈樞」之「寒熱篇」「經脈篇」「癰疽篇」等，對瘰癧之成因、診斷、針刺療法，以及預後等已有記載，「備急千金要方」除「諸漏結核未破者，火針針之使著核中，無不差者。」等外，已注意到飲食，宜禁五辛酒麵及諸熱食，尤以

九針療法，至今尙爲臨床所採用。

起因總由痰濕風熱氣毒結聚及恚怒忿鬱謀慮不遂而成，他如先天不足，結核病，花柳、遺毒等亦能併發而患。瘰癧病久必潰，俗稱瘡癆，古稱癆瘵，宋「普濟本事方」“肺虫居肺叶之內，蝕人肺系，故成癆疾，咯血聲嘶”。明「古今醫統」“凡此諸虫，著於怯弱之人，日久成癆瘵”。「醫學正傳」且云“受其惡氣，多遭傳染”。近世發現“癆虫”確爲瘰癧病因中之一大主因。

生於耳前耳後及項間，或延至前胸腋下等處，竄生無度，爲外科中之慢性疾病。生項前者屬陽明經主痰，項後者屬太陽經主濕，左右肋旁者屬少陽主氣。初起結腫，大小不一，或謂小者稱瘰，大者稱癧，推之移動，皮色不變，單生或多粒叢生，甚者繞項成串，其形各異，名目繁多。治法見原文。

初起「消瘰丸」均可選用，有結核病者，照結核病防治處理，此証大抵起即難消，潰則難斂，斂則還易復發，初起時宜速服軟堅化痰之品，外可隔蒜灸或點瘰法。膿成者開潰泄毒，潰後拔毒爲主，用藥不宜過用寒涼，攻剋亦應適度，過犯寒涼，令人項背拘強，瘡勢塌陷，毒氣裏攻，易成瘡癆等損症。此外應隨時注意身心，避食生痰陳腐助火發物，多佐化痰之類。

鬚疽論第二十六

【原文】

夫鬚疽者乃手少陽三焦相火妄動。又兼腎虧不能生水。或外受風熱所感。但此經多氣少血。肌肉相薄。凡有患最難箒潰。比皆起于情性急暴房慾血虛火動肝氣凝結而成。疽之初起寒熱交作。頭眩痛徹太陽。甚則耳目連鬚通腫。治法不可妄動針灸。必分陰陽表裏。邪正虛實治之庶不有悞。且如初見瘡時。多寒少熱。口乾作渴。好飲熱湯。六脈虛數無力。其患堅硬不掀痛。不潰無膿。瘡根流散。此乃真氣虛而邪氣實也。治以托裏爲主消毒佐之。如清肝養血湯。托毒散之類是也。又如見症時。熱多寒少。頭眩作痛口燥舌乾。二便秘塞六脈沈實有力。瘡亦掀腫疼痛。身體發熱。易箒易膿。根腳不開。此乃正氣實而邪氣虛也。治以消毒爲主。托裏佐之。如梔子清肝湯。鼠黏子湯之類是也。又有未見瘡時。先作渴症。或一年半載。然後發爲鬚疽。其形色多紫黑。瘡多平陷。堅硬無膿。毒流耳項。又兼氣味不正。形容不澤。精神不明。飲食不進者。俱爲不治。

癰疽看法

初起無口乾無寒熱飲食有味舉止如常者順。已成瘡頭腫起根腳不散。形色紅活掀痛潰膿者順。已潰膿稠。色鮮紅活。腫消痛止。項便頭輕口和者順。潰後瘀肉易腐。新肉易生。瘡口易平。飲食有味者順。初起瘡頭如粟。頂軟不高。色紫根散。木痛食少者逆。已成瘡形紫黑軟陷無膿足冷身涼便利脈虛者逆。已潰膿水清稀。氣息臭。壞肉不腐。新肉不生者逆。潰後飲食厭食身體發熱。口乾不睡。肉削皮粗者逆。

癰疽治法

初起掀腫堅硬。內熱口乾脈數有力邪實也當清之。已成憎寒壯熱。四肢拘急。脈浮者邪在表也。宜散之。赤腫作痛。血凝滯也。宜散血清肝。色黯漫腫宜升陽助胃。已潰堅硬不退。脈細而數日晡發熱者。宜滋陰健脾。肝膽怒火上攻。心煩作躁。腮頰紅熱者。宜抑陰降火。已潰膿清腫痛尤甚虛煩食少者。宜養氣血健脾胃。潰後氣血俱虛。身涼脈細。大便多溏者。宜峻補溫中。潰後不斂。新肉生遲。瘡色淡白。膿水不止。宜健中補脾。

癰疽治驗

一男子患此三日。掀腫寒熱。脈浮數。服荆防敗毒散一劑表症悉退腫痛不減。已欲作膿。服托裏消毒散。膿潰。又服益氣養榮湯。加麥冬五味漸斂而愈。

一男子患此五日。頂高根若錢大形色紅活。此肝經濕熱爲患。用麻子大艾灸七壯。服梔子清肝湯二劑。腫勢稍止。以蠟酥餅膏貼灸上。更用柴胡清肝湯。加白芷 黃耆 天花粉 數服。膿潰腫消半月收斂。

一男子渴疾三年。寒熱半月。自以爲瘡。鬢間忽生一小瘡。三四日。外形如粟。瘡平堅硬。色暗不澤。脈洪數而無力。此水竭火旺之症。終難潰斂。辭不敢治。另請他醫。以爲易治。用針刺腫處。去紫血鍾許。內服解毒藥。次日邊旁愈腫。醫謂腫高屬陽。易治。其家懽悅。又三日腮項俱腫。口噤不食。用針又刺腫上。日加昏潰。余曰死將及矣。此症未病先作渴。腎水已竭。外形如粟。裏可容穀。形色紫黑。氣敗血衰。脈洪無力。元氣內敗。如此豈有不死者。凡二十一日而歿。

一男子腫掀五六日。彼欲內消。外敷涼藥。內服大黃泄氣等劑。掀腫雖退。乃生寒熱。惡心乾嘔。肩膊牽強。診之脈數無力。此內虛毒氣入裏。涼藥之過也。東垣云。疽瘡之發。受之有內外之別。治之有寒溫之異。

受之外者。法當托裏以溫劑。反用寒藥攻之。損傷脾胃。多致內虛。使外毒乘入裏。受之內者。法當疎利以寒劑。反用溫劑托裏。使骨髓之毒外徹皮毛。表裏通潰。共爲一瘡。助邪爲毒。苦楚百倍。輕則變重。重則死矣。前症既出寒藥之過。投以托裏健中湯二服。嘔吐全止。又以十全大補湯加白芷數服。而原瘡漸起。又以人參養榮湯間服。腐潰膿稠。兩月餘收功。

一婦人患此。腫硬掀痛。寒熱口乾。脈洪大有力。此表裏俱實也。投以防風通聖散一劑。便行二次。前症稍退。又一劑大行數次。熱退渴止。惟原瘡腫硬。用銀針點破。插入蟾酥條。內服托裏消毒散。漸潰腫而安。

一男子患此三四日。頂高根活。且無表裏之症。此肝經濕熱爲患。用針挑破瘡頂。以蟾酥餅膏貼。內服加味逍遙散。加皂角針數劑。頭出微膿。根腫亦消。

鬚疽主治方

柴胡清肝湯 治鬚疽初起未成者。毋論陰陽表裏。俱可服之。川芎 當歸 白芍 生地 柴胡 黃芩 山梔 天花粉 防風 牛蒡子 連翹 甘草節_錢 水二茶鍾。煎八分。食遠服。

鼠黏子湯 治鬚疽。初起熱多寒少。頭眩作痛。口躁咽乾。渴常飲冷。二便秘澀。六脈沈實有力。煩悶疼痛者。鼠黏子 桔梗 當歸 甘草梢 赤芍 連翹 元參 地骨皮 天花粉 防風 木通_錢 製大黃_錢 水二茶鍾。煎八分。食前服。

加味逍遙散 治鬚疽七日以上。根盤深硬。色紫掀痛者。白朮 茯苓 牡丹皮 白芍 陳皮 柴胡 當歸 山梔 天花粉 貝母_錢 甘草 紅花 犀角_錢 水二茶鍾。淡竹葉二十片。煎八分。飯後服。

梔子清肝湯 治少陽經虛。肝火風熱上攻。遂成鬚疽。痛連頸項胸乳太陽等處。或寒熱嘔甚。胸滿口苦舌乾。牛蒡子 柴胡 川芎 白芍 石膏 當歸 山梔 丹皮_錢 黃芩 黃連 甘草_錢 水三茶鍾。煎八分食後服。

清肝解鬱湯 治暴怒傷肝。憂思鬱結。致肝火妄動。發爲鬚疽。頭眩痛徹太陽。胸膈痞連兩脇嘔酸水者。當歸 白芍 茯苓 白朮 貝母 熟地 山梔_錢 半夏 人參 柴胡 丹皮 陳皮 香附 川芎_錢 甘草_錢 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

參苓內托散 治鬚疽已成。堅而不潰。潰而不斂。氣血俱虛。身涼脈

細。飲食少進。口淡無味。及形體消瘦者。歸身 黃耆 川芎 白朮 陳皮白芍 山藥 熟地 茯苓 人參^蜜 甘草 肉桂 熟附子 丹皮 地骨皮 薑三片 棗二枚 水二茶鍾。煎八分。食遠服。

【探究、按語】

疽生於鬚角者，名鬚疽，實功對此症論述較詳，治則主次，列示昭然，並對消渴患者併發此症之証狀及預後，並加敘述，至今仍具參考價值。

卷 六

咽喉論第二十七

【原文】

夫咽喉雖屬於肺。然症有虛火實火之分。緊喉慢喉之別。又咽爲心脾肝腎呼吸之門。飲食聲音吐納之道。關係一身。害人迅速。故曰走馬看咽喉。不待少頃也。虛火之症。色淡微腫。脈亦細微。小便清白。大便自利。此因思慮過多。中氣不足。脾氣不能中護。虛火易至上炎。其患先從咽喉乾燥。飲食妨礙。咳吐痰涎。呼吸不利。斑生苔蘚。纏若蝦皮。有如茅草常刺喉中。又如硬物噬于喉下。嘔吐酸水。出甘涎。甚則舌上白苔。唇生齶色。聲音雌啞。喘急多痰。以上皆是虛火。由元氣不足中來。不可悞投涼藥。上午痛者屬氣虛。補中益氣湯。加麥冬五味子。牛蒡子元參。午後痛者屬陰虛。四物湯。加黃柏知母。桔梗元參。如不敷。必加薑附以爲引導之用。亦爲佐治之法也。實火之症。由于過飲醇酒。縱食膏梁。疊褥重裯。舖殮辛烈。多致熱積于中。久則火動痰生。發爲喉腫。甚者風痰上壅。咽喉閉塞。少頃湯水不入。聲音不出。此爲喉閉。即緊喉風是也。用藥不及時。先用針刺喉間。發泄毒血。隨用雞翎蘸桐油。探吐稠痰。務使痰毒出盡。咽喉得鬆。湯藥可入。語聲得出乃止。內服清咽利膈湯。疎利餘毒。如牙關緊閉難入。必當先刺少商穴出血。其閉自開。如針刺探吐無痰。聲如曳鋸。鼻掀痰喘。湯水不入。語聲不出者。真死喉也。又有喉癰喉瘻乳蛾上脣瘻等症。其患雖腫。而咽喉半塞半開。其病雖凶。而喉又寬又腫。此皆標病。雖重無妨。當用金鎖匙吐出痰涎。利膈湯推動積熱。膿脹痛者開之。損而痛者益之。其患自安。凡喉閉不刺血。喉風不倒痰。喉瘻不放膿。喉瘻乳蛾不針烙。此皆非法。又有痰火勞嗽咳嗽咽痛者。無法可治。

咽喉看法

初起紅色腫痛。語聲清朗。亦無表裏之症相兼者輕。已成腫痛。咽喉半閉半開。咯吐痰涎。飲食稍進者順。咽喉腫閉牙關緊急。言語不清。痰壅氣急聲小者險。咽喉驟閉。痰涎壅塞。口噤不開。探吐不出。聲喘者死

。時瘡之後。毒結咽間。腫痛腐爛。吐納不堪。聲啞者重。久嗽痰火。虛陽上攻。咳傷咽痛。但見聲嘶面紅者死。

咽喉治法

初起腫痛。寒熱交作頭眩拘急者。邪在表也。宜發散。初起腫痛發熱。脈有力而便秘者。邪在內也。宜下之。腫痛寒熱。口乾作渴。脈洪大而有力者。宜發表攻裏。咽喉腫痛。痰涎壅甚。面紅口乾。邪在上也。宜探吐。喉間痰涎壅塞。氣急口噤難開。先刺少商。後行吐法。已成脹痛。咽喉壅塞。湯水不入。膿已成也。宜急針之。腫痛微紅。脈虛無力。午後痛者屬陰虛。宜滋陰降火。腫痛色白。咯吐多涎。上午痛者屬陽虛。宜補中健脾。

咽喉治驗

一男子咽喉腫痛。發熱體倦。脈弦不力。此邪在表。以荆防敗毒散。加牛蒡元參一劑。表症已退。腫痛未除。又以元參解毒湯。加桔梗二劑。腫痛減半。又二劑而安。

一男子咽喉腫痛。痰涎壅盛。用金鎖匙先吐稠痰。清咽利膈湯。推蕩積熱。腫痛稍減。惟色紅甚。此火熱也。又以黃連解毒湯。加桔梗二劑。紅腫亦退而安。

一男子素飲火酒。一時咽喉腫閉。口噤舌強。痰涎壅塞。勢頗危急。用針先刺少商二穴。口噤方開。以雞翎蘸桐油。探吐稠痰數碗。語聲方出。乃用針刺腫上。出紫血鍾許。溫湯漱淨。冰硼散搽之。以涼膈散加芒硝。天花粉。利去積熱。又服連翹散二劑而安。

一婦人肥甚。暑熱咽間腫痛。痰涎上壅。語聲不出。甚危。先用針刺毒血。次用金鎖匙。吐出稠痰五六碗。服清咽利膈散。腫痛稍減。去硝黃再服而安。

一男子勞甚。咽喉腫痛。自服清咽利膈藥不應。診之脈細而虛。此勞傷虛火之症。朝以補中益氣湯。加麥冬五味子。桔梗元參。晚以四物湯。加黃柏。知母。炒黑乾薑。加童便服之。不數日腫痛消而咽愈。

一婦人咽痛。微腫白色。吐嚥不利。診之脈亦細數。此中氣不足。虛火假症也。用理中湯二服。痛其頓止。又用消腫益氣湯。加炒黃柏。知母。數服患不復作。

一男子腫痛日甚。服清咽利膈藥不應。必欲作膿。用防風通聖散去硝黃。二服喉膿脹痛。下針即愈。

咽喉主治方

清咽利膈湯 治積熱咽喉腫痛。痰涎壅盛。及乳蛾喉痺喉癰。重舌木舌。或胸膈不利。煩躁飲冷。大便秘結等症。連翹 黃芩 甘草 桔梗 荆芥 防風 山梔 薄荷 金銀花 黃連 牛蒡子 元參^錢 大黃 朴硝^錢 水二鍾。煎八分。食遠服。

元參解毒湯 治咽喉腫痛。已經吐下。飲食不利。及餘腫不消。元參 山梔 甘草 黃芩 桔梗 葛根 生地 荆芥^錢 水二鍾淡竹葉燈芯各二十件。煎八分。食後服。

連翹散 治積飲停痰。蘊熱膈上。以致咽喉腫痛。胸膈不利。咳吐痰涎。舌乾口燥。無表裏症相兼者。連翹 葛根 黃芩 赤芍 山梔 桔梗 升麻 麥冬 牛蒡子 甘草 木通^錢 水二鍾。竹葉二十片煎八分。食遠服。

涼膈散 治咽喉腫膈。痰涎壅盛。膈間有火。大便秘澀。防風 荆芥 桔梗 山梔 元參 石膏 薄荷 黃連 花粉 牛蒡子 貝母 大黃^錢 水二鍾。煎八分服。

金鎖匙 治喉閉纏喉風。痰涎壅塞。口噤不開。湯水不下。燄硝^{一錢} 硼砂^{五錢} 冰片^{一分} 白僵蚕^{二錢} 雄黃^{三錢} 各研爲末和勻。以竹筒吹患處。痰涎隨出。如痰難出。腫痛不能消。急針患處。去惡血。服前藥。

理中湯 人參^錢 甘草^錢 乾薑^{五分} 白朮^錢 水二鍾。煎八分。食遠服。

桐油餳 治喉風喉閉。其症先兩日胸膈氣急。呼吸短促。驟然咽喉腫痛。手足厥冷。氣閉不通。頃刻不治。先用溫湯半碗。加入桐油三四匙攪勻。用雞翎蘸油。探入喉中。連探四五次。其痰湧出。再探再吐。以人甦醒聲高爲度。後服清咽利膈之藥。

治喉鳥龍散 用豬牙皂角七條。去皮弦。爲粗末。水二鍾煎五分。入人尿一匙。冷服。即時非吐即瀉。治咽喉腫痛。痰涎壅盛。喉風喉癰乳蛾等症並效。維纏喉風。牙關緊閉者。不可與。恐痰上出而口不開。壅塞無路而出故也。除此皆效。又久病咽痛忌用。

神效吹喉散 治纏喉風閉塞。及乳蛾喉痺。重舌木舌等症。薄荷 僵蠶 青黛 朴硝 白礬 火硝 黃連 硼砂^錢 以上藥各爲細末。薦月初一日。取雄豬膽七八個。倒出膽汁。用小半和上藥。拌勻復灌膽殼。以線扎頭。膽外用青缺紙包裹。將地掘一坎闌。深一尺。上橫竹筋懸掛。坎

中以板鋪平。用泥密蓋。候至立春日取出。掛風處陰乾。去膽皮青紙。姿罐密收。每藥一兩。加冰片三分。同研極細。吹患處神效。

少陰甘桔湯。治少陰喉痛。頭眩。脈沈細而身猶熱者。 桔梗甘草 陳皮 川芎 黃芩 柴胡 元參六分 羌活 升麻四分 水二鍾。葱白一根。煎八分。不拘時服。

清音噙化丸。治肺氣受傷。聲音雌啞。或久咳嗽。傷聲啞亦宜。 諸子 真阿膠 天冬各半錢 知母五錢 麥冬三錢 白茯苓 黃柏一錢 當歸 生地熟地各一錢 人參三錢 烏梅肉十五錢 人乳 牛乳 梨汁各一錢共煎膏 將藥共爲細末。和入稠膏。加煉蜜搗成丸。如芡實大。每用一丸。仰臥噙化。日用三丸。如改作小丸。每服一錢。諸子煎湯。或蘿蔔湯送下。亦可取效。

治暴失音方。豬板油一斤。入鍋先煉成油。濾去渣。入白蜜一觔。再煉少頃。絹濾淨。姿器內冷定成膏。不時挑服一茶匙其音漸清。無疾時亦可常服潤肺。

噙化丸。治梅核氣。乃痰氣積于喉中。嚥之不下。吐之不出。如毛草常刺作癢。新則吐酸妨碍。久成閉塞。 膽礬 硼砂 牙皂 雄黃 各等分爲末。紅棗煮爛。取肉爲丸。如芡實大。空心噙化一丸。溫黃酒一杯過口。內服蘇子降氣湯。

蘇子降氣湯。治虛陽上攻。氣不升降。致結患咽嗌。痰涎壅塞。 蘇子五錢 厚朴 陳皮 半夏 前胡 官桂一錢 甘草三分 水二鍾薑三片。煎八分。食遠服。

冰硼散。治咽喉口齒。新久腫痛。及久嗽火咽啞作痛。 冰片半錢 珠砂一分 元明粉製法詳末卷 硼砂五錢 共研極細末。吹搽患處。甚者日搽五六次最效。

咽喉應用方。黃連解毒湯見行篇 防風通聖散。荆防敗毒散見醫門 四物散。補中益氣湯見濟陽門

【探究、按語】

此章專言喉風，分虛慢，實急兩種論治，急則淺刺少商，商陽出血泄熱，痰涎壅盛，漉漉有聲，咳吐不出者，探吐稠痰，務使出盡咽鬆乃止，若腫發項外，膿脹而痛者，防透咽喉，不可輕施刀鍼，急以皂角取嚏即破，或用皂角末醋調外敷即能自潰，若其毒邪熾甚，神昏不清者，「清瘟敗毒散」、「紫雪丹」、「牛黃丸」配服。慢喉風屬虛，宜補養，忌用寒涼。詳細治則見原文。

考歷代醫籍中，對喉風之概念甚不一致，計多達六十餘種。從文獻資料看，較

爲明確而最多被論及者，有纏喉風及繁喉風。

凡具有咽喉腫塞，氣急不暢，呼吸困難等喉風主症，或頸下頸外有不顯紅腫形跡者，均可稱爲繁喉風，喉閉或纏喉風。

一般証狀 咽喉突然腫塞疼痛，吞嚥不利，繼則紅腫，疼痛加劇，或頸外繞腫，麻癢作痛，一如蛇纏頸項，咽喉堅塞，湯水難下，言語不清，呼吸困難，痰涎壅盛，若繼續發展，則呼吸更感困難，煩躁不安，唇青甲紫，冷汗肢逆，甚至神識不清者，均爲肺之衰敗，氣之陽脫險証。

喉癰、上脣癰 癰生於口腔，具紅腫熱痛，腫形圓整，有化膿特徵之証狀者稱之，因口腔部位特殊，凡生癰大都釀膿甚速，膿成即可剖取膿血，故云喉癰不放膿爲非法。剖潰後照一般口瘡用藥。

喉痺 喉痺一症「素問、陰陽別論」及「至真要大論篇」「厥論篇」中都有簡述，但未言病形病証，歷代醫家亦都認識不一，概念不清，近代都界定爲喉部一般性炎症，即喉癬、喉瘡之屬、一虛一實。

喉瘡（亦稱潰瘍爲瘡）屬虛，由腎陰虧損，虛火上炎，消爍肺金，薰燎咽喉而成，都屬慢性。初覺咽嗌乾燥，如芒草常刺喉中，又如硬物隘於咽下，嘔吐酸水，淡紅微腫微痛，日久色紫不鮮，腫痛日增，破爛腐衣，聲音嘶啞，喘急多痰，甚則腐臭蝕延，疼痛倍增，妨礙飲食，胃由此漸衰，而虛火益盛。煩躁者「知柏地黃湯」，吐酸嘔涎者「甘露飲」，面唇俱白，不寐懶食者「歸脾湯」，腫吹「紫雪散」，腐吹「八寶珍珠散」。投方應病者或可救，否則難治。

喉癬屬實，由過食炙燂五辛，熱積於胃，胃火薰肺而成。初起咽乾，時覺燥癢，次生苔蘚色暗裂痛，時吐臭涎，妨礙飲食，宜服「廣筆鼠粘湯」或「化癬丹」接服「潤喉湯」，未潰外吹「礬精散」「碧丹」，已潰吹「清涼散」。患者清心寡慾，慎戒厚味發物，或可痊癒，若失治或調理不謹，延漫開大，堆起腐衣，喉啞失音或旁生小孔，狀若蟲蟻蛀蝕之狀者，多至不救。

乳蛾 此證古藉未見記述，待金元，某些著作始將本序作爲喉癰討論。此症患有一定部位，生咽關兩旁之喉核，有單生或雙生，以兒童居大多數，多由肺胃積熱，外受風邪而成，體虛亦屬主因之一。由外感而發者，來勢迅速，起即咽喉腫痛吞嚥不利，並具全身証候時，疏解風邪爲先，如「荆防敗毒散」「桑菊飲」或「本草利膈湯」加減，外用「冰硼散」吹之。如日久，腫甚痰鳴，湯水難下者，急淺刺少商出血，以泄其毒，另用皂角燒炭吹探痰涎，待鬆再服「黃連解毒湯」，脈實便秘者，酌用「涼膈散」通腑泄熱。由內因而成者，來勢緩慢，無身熱等表証，脈象細散，或日輕夜重，口不甚渴，舌滑或絳，宜「六味丸」或桂附八味丸」以引火歸原。

，此症既不可過用寒涼之劑，又不可輕用刀針。

凡喉閉不刺血（指刺少商），喉風不倒痰，喉癰不放膿，皆非法之說，治法正確，但喉癰乳鵝除針刺少商外，刀針烙法皆已廢而不用。

時毒論第二十八

【原文】

夫時毒者。天行時氣之病也。春當溫而反寒。夏當熱而反涼。秋當涼而反熱。冬宜寒而反溫此四時不正之氣。感于人而爲疾也。宜分別陰陽表裏寒熱虛實施治。初起與風寒相類。惟頭面耳項發腫爲眞。其患寒熱交作。體強頭眩。脈浮緊數者。爲邪在表。以荆防敗毒散或萬靈丹。發汗以散之。如兩目鼻面。漸次傳腫者。乃正陽明受病。其患掀腫發熱。便祕口乾。多熱少寒。脈數有力。爲邪在裏。五利大黃湯。四順清涼飲下之。又頭角兩耳前後結腫者。乃手少陽經受之。其患耳鳴筋痛。寒熱嘔吐。口苦咽乾。煩燥時甚。當以知母石膏湯。小柴胡湯和之。通用防風通聖散。加牛蒡元參解毒攻裏。勞役凶荒。沿門闐巷傳染者。普濟消毒飲。藿香正氣散以安之。表裏俱解。腫尙不消。宜砭去惡血。腫熱甚者。如意金黃散敷之。微熱不紅堅硬者。沖和膏選而用之。自後仍不消者。必欲作膿。宜托裏散毒。加白芷皂角針托之。已潰體倦食少者。補中益氣湯。膿穢脾虛食而嘔吐者。香砂六君子湯。潰而不斂者十全大補湯。又有毒中三陽。自項以上俱發腫者。光如水色。雙目合縫唇似豬形。口角流涎。腫不消潰。聲音不出。飲食不入。咽喉腫閉。牙關難開。破流臭水。穢氣連綿不絕者。俱爲不治。

時毒看法

初起寒熱交作。頭面一處作腫。紅赤發熱。疼痛者輕。已成高腫。疼痛發熱。有時語聲清朗。湯藥易入者輕。已潰膿稠。堅腫漸消。疼痛漸減。飲食漸進。身溫者吉。潰後膿水漸止。腫退肌寬。神彩精寧。睡臥安穩者順。初起多寒少熱。頭面耳項俱腫。光如水晶。不熱者險。已成漫腫無頭。牙關緊閉湯水不入。聲音不出者逆。已潰膿水清稀。氣味敗臭。腫痛不除。如尸發胖者死。潰後臭水淋漓。腫不知痛。手足多冷。常出謔言死。

時毒治法

寒熱交作。頭眩體痛。六脈浮緊。邪在表也。宜汗散之。頭面赤腫作痛。口躁咽乾。大便秘實。邪在裏也。宜下之。外有寒熱。內亦口乾。脈弦有力。表裏俱實。宜發表攻裏。表裏俱解。腫痛仍不消者。乃瘀血凝滯。宜砭去惡血。砭血之後。腫痛不已者。已欲作膿。宜托膿健脾。腫日甚而脹痛者。已有膿。急針之。更兼補托調理脾胃。潰後腫痛不減。膿清腥穢。脾胃弱也。宜更溫中健脾。飢年時毒流行傳染者。忌用攻發。當和解兼養正氣。

時毒治驗

一男子耳項腫痛。發寒熱。脈浮數。以荆防敗毒散一劑。便行三次。內熱頓退。餘腫不消。本方去大黃。加川芎。數劑而愈。

一男子先發寒熱。次日頭面俱腫。又二日口噤。湯水不入。診之脈洪數而有力。此表裏俱實也。又咽喉妨碍。湯藥難下。先用針刺咽間去惡血鍾許。牙關稍開。用防風通聖散一劑。徐徐服之。便去三四次。腫上砭去惡血。以金黃散敷之。次日腫勢稍退。又用普濟消毒飲二劑。面腫漸消。惟兩耳下堅腫未退。此必作膿。又用托裏消毒散數服。候膿熟而針之。次用十全大補湯。去肉桂加陳皮。十餘劑而愈。

一男子牙根腫痛。次傳腮頸俱腫。頓生寒熱。此陽明濕熱上攻。用荆防敗毒散。加石膏一劑。寒熱頓退。惟腮腫不消。以針刺牙根腫上出毒血。以冰硼散搽之。外敷真君妙貼散。內服牛蒡子湯數劑而愈。

一男子冬月。耳面赤腫。發熱口乾。脈洪實而便秘。此三陽蘊熱症也。必捨時從症治之。以五利大黃湯。一劑便行。二次赤腫稍退。內熱稍疎。又以升麻解毒湯二服。腫亦消而病愈。

一婦人冬月。面腫咽痛。口噤難開。診之脈洪數有力。又見房中煖氣如蒸。此爐火盛也。用黃連解毒湯。加元參一劑。次日腫消咽利。又服二劑全愈。

一男子勞甚。鬚間腫硬。肉色不變。余曰。勞傷氣血。濕痰凝滯之故。與外感時毒不同。又診脈細數而無力。爲內傷損病。治當養氣血。調經脈理勞續損。彼欲內消。自服仙方活命飲二劑。腫不見消。脾胃已損。又請一醫。乃行攻利。復損臟腑。數日後飲食不進。便泄不止。腫硬愈堅。痰涎愈甚。復請余視之。余曰。今不可治。凡病有主末。治有權宜。此症初起。肉色不變者。血不足也。堅硬不熱者。脾胃弱也。脈細數無力。正

氣衰也。豈可用前有餘之藥。以攻不足之病。旋又強投溫中補劑。不應而死。

時毒主治方

荆防敗毒散 治時毒初起。頭眩惡寒。腮項腫痛脈浮者。荆芥 防風 羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 桔梗 茯苓 枳殼一錢 甘草 人參
五分 水二鍾薑三片。煎八分。食遠服。寒甚加葱二枝。

五利大黃湯 治時毒掀腫赤痛。煩渴便秘。脈實有力者。 大黃一錢 升麻五分 芒硝 梔子五分 水二鍾。煎八分。空心服。未利者。渣再煎服。

連翹消毒飲 治時毒表裏二症俱罷。餘腫不消。疼痛不退者。連翹 川芎 當歸 赤芍 牛蒡子 薄荷 黃芩 花粉 甘草 枳殼 桔梗一錢 升麻五分 水二鍾。煎八分。食後服。便燥者。加酒製大黃。

防風通聖散 治時毒發寒發熱。煩躁口乾。表裏脈症俱實者。 防風 白芍 薄荷 川芎 桔梗 山梔 黃芩 白朮 當歸 連翹 荆芥 麻黃 滑石 石膏一錢 甘草五分 芒硝五錢 大黃酒炒一錢 水二鍾。煎八分空心溫服。

普濟消毒飲 治時毒疫癟。初覺憎寒發熱。肢體沈重。次傳頭面作腫。或咽喉不利。口乾舌燥。煩渴不寧者。 黃芩 黃連一錢 人參三錢 陳皮一錢 元參 甘草 柴胡 桔梗一錢 連翹 牛蒡子 馬勃 板藍根 升麻 僦蠶五分 水二鍾。煎八分。食後服。如大便燥。加酒煨大黃一錢。或二錢。以利爲度。腫勢甚者。宜砭去惡血。

通氣散 治時毒掀腫疼痛。咽喉不利。語言不爽者。 延胡索五分 川芎 牙皂五分 藜蘆三分 蹤躅花二錢 共研細末。用紙撲蘸藥少許于鼻內。取嚏爲效。

托裏消毒散見瘡門 治時毒表裏俱解。腫尚不退。欲作膿者。

牛蒡子湯 治時毒熱甚腫痛。脈數而無力者。 葛根 實衆 甘草 江西 豆鼓 牛蒡子半錢半錢 水二鍾。煎八分。食後服。

十全大補湯見瘡門 治時毒潰後。膿水清稀。形容消瘦。脾胃虛弱。飲食減少。虛熱不睡。自汗盜汗。及不收斂者。

時毒應用方

金黃散見瘡門 黃連解毒湯見疔門 冰硼散見瘡門 升麻解毒湯見瘡門 真君妙貼散

【探究、按語】

時毒乃發於頭面之丹毒亦稱火丹，又名大頭瘡，輕者稱抱頭火丹，明「醫宗必談」稱大頭風，清「瘍科心得集」所記較為詳細而沿用至今，行之有效。

發於頭面，但每易波及咽喉。由感染天行邪熱疫毒之氣或創傷而發，能互相傳染。初起時，狀類傷寒，憎寒發熱，頭疼體痛等証，頭面赤腫無邊，脹疼如裂，甚者每每唇翻目閉，傳變生危。治療之法，以「普濟消毒飲」重用板藍根，加大青葉銀花為主。初期惡寒未除，「通聖消毒散」隨証加減，脈浮數而邪在表者，「犀角升麻湯」發之，脈沉濇而邪在深者，「五福化毒丹」攻之，實熱便秘者「涼膈散」下之，年高氣鬱者，「五香連翹湯」主之，症重而範圍較大者，可見心中煩躁，神昏譫語，心嘔吐諸逆証時，急以涼血解毒，清心開竅，「清瘡敗毒飲」「清營湯」，神昏譫語者加「牛黃清心丸」「安宮牛黃丸」「至寶丹」「紫雪丹」選用。此病在五六日內，如見頭面赤腫，精神昏亂，咽喉閉塞，語言不出，湯水難入者，都屬不治。外敷「如意金黃散」，輕者以瘦豬肉切片貼換亦效。初起如仙人掌，水芭蕉根、馬齒莧、大青葉，任選，搗爛外敷，乾則換之都效。如過十日無變，則病情自然減退，每可不藥而癒。大抵作法，初起時用藥不宜太峻，如藥力過猛，邪反內攻，易生意外之變，總宜先緩後急，先用退熱消毒之品，虛人兼扶元氣，胃弱食少者，兼助胃氣，非候大便熱結，方用大黃等猛藥下之。又此症之餘毒，每易結聚腦後成瘍，如不及時散去，必致釀膿開刀。

此外患者可每日用「通氣散」由鼻竇吸入取嚏，以泄熱毒，吸而不嚏者，難治，服侍及探病者吸之可免傳染。

瘍瘻論第二十九

【原文】

夫人生瘍瘻之症。非陰陽正氣結腫。乃五臟瘀血濁氣痰滯所成。瘍者陽也。色紅而高突。或蒂小而下垂。瘤者陰也。色白而漫腫。亦無瘻痛。人所不覺。薛立齋分別其詳。肝通筋。怒動肝火。血躁筋攀。曰筋瘤。心主血。暴急太甚。火旺逼血沸騰。復被外邪所搏而腫。曰血瘤。脾主肌肉。鬱結傷脾。肌肉消薄。上氣不行。逆於肉裏。而為腫。曰肉瘤。肺主氣。勞傷元氣。腠理不密。外寒搏為腫。曰氣瘤。腎主骨。恣慾傷腎。腎火鬱逼。骨無榮養而為腫。曰骨瘤。余謂筋瘤者。堅而色紫。累累青筋盤曲。

甚者結若蚯蚓。治當清肝解鬱。養血舒筋。清肝蘆薈丸是也。血瘤者。微紫微紅。軟硬間雜。皮膚隱隱。纏若紅絲。擦破血流。禁之不住。治當養血涼血。抑火滋陰。安歛心神。調和血脈。芩連二母丸是也。肉瘤者。軟若綿。硬似饅。皮色不變。不緊不寬。終年只是覆碗。然自當理脾寬中。疏通戊土。開鬱行痰。調理飲食。加味歸脾丸是也。氣瘤者。軟而不堅。皮色如故。或消或長。無熱無寒。治當清肺氣。調經脈理勞傷。和榮衛。通氣散堅丸是也。骨瘤者。形色紫黑。堅硬如石。疙瘩高起。推之不移。昂昂堅貼于骨。治當補腎氣養血。行瘀散腫。破堅利竅。調元腎氣丸是也。此瘤之五名。治瘤之五法。又立齋云。筋骨呈露曰筋癰。赤脈交結曰血癰。皮肉不變曰肉癰。隨憂喜消長曰氣癰。堅硬不可移曰石癰。此癰之五名也。通治癰瘤。初起元氣實者。海藻玉壺湯。六軍丸。久而元氣虛者。琥珀黑龍丹。十全流氣飲選服。自然縮小消磨。切不可輕用針刀掘破。出血不止。多致立危。久則膿血崩潰。滲漏不已。終致傷人。又一種粉瘤。作粉紅色。多生耳項前後。亦有生於下體者。全是痰氣凝結而成。宜拔針破去脂粉。以三品一條槍插入數次。以淨內膜自愈。又一種黑砂瘤。多生腎腿。腫突大小不一。以手攝起。內有黑色是也。亦用針刺。內出黑砂有聲。軟硬不一。又一種髮瘤。多生耳後髮下寸許。軟小高突。按之不痛。亦針之粉髮齊出。又一種蛔蟲瘤。生于脇下。又一種蛆瘤。連生肩膊。以上數瘤。詳在後治驗中非謬也。余觀古又有蟲瘤者。要皆五臟蘊熱。邪火濁起氣。瘀血所感而成。非正病也。

癰瘤看法

初起紅色光亮。微熱微痛。根腳浮淺。不堅實者輕。已成紅赤高腫。作熱掀痛。頂破皮穿。膿潰腫消者輕。已潰膿稠色鮮。根腳束小。內肉漸生。外皮漸緊者順。潰後氣體平和。飲食如故。腫消痛止。口平收斂者順。初起肉色不變。寒熱漸生。根腳散漫。時或陰痛者險。已成堅硬如石。舉動牽強。咳嗽生痰。皮寒食少者逆。已潰無膿。惟流血水。腫不消。痛不止。脾氣衰弱者逆。破後血水不止。腫硬更增。敗腐不脫。嘔氣惡心者死？

癰瘤治法

初起無表裏之症相兼。但結成形者。宜行散氣血。已成無痛無癰。或軟或硬。色白者痰聚也。宜行痰順氣。已成色紅。堅硬漸大。微癰微疼者。宜補腎氣。活血散堅。形如茄蒂。瘤大下垂者。用藥點其蒂。茄落生肌

收斂。已破流膿不止。瘤仍不消。宜健脾胃爲主。佐以化堅。己潰出血不常。瘤口開泛者。宜養血涼血。佐以清肝。潰後瘤腫漸消。脾弱不能收斂者。補腎氣。兼助脾胃。

瘻瘤治驗

一男子臂瘤五年。形如覆瓢。按之隱隱黑色。此黑粉瘤也。以針破之。按出黑砂兼黑粉。共約碗許。用三品一條槍。插入患內十餘日。每次搽出黑膜。其瘤漸消。內服十全大補湯。健脾胃。養氣血。月餘而愈。

一男子腮上生瘤半年。形若覆桃。皮色不變。按之微紅。此粉瘤也。針破之。搽去脂粉。插前藥半月而愈。

一義烏兵士肩膊下連生小瘤五枚。三月針發。其癢異狀。以手捫之。嗡嗡攻動如蝦。余謂此必有異虫。以針破其一枚。先出紅水一匙。少項。取出黑嘴粉紅虫一枚。形如蛆樣。長六七分。又破一枚亦然。其人漸覺昏暈。此泄氣之過也。餘瘤停針。服中益氣湯數劑。用膏蓋已針者。又五六十日。病者方健。漸次破之。仍用補藥十餘服而愈。

一婦人及一女子。耳後髮際下一寸。各生一瘤。半年餘漸大。用針破之。先出脂粉。後出頭髮數根。長約二尺餘。齊根剪斷。出血少許。俱用插藥。數日化出內膜立愈。以此觀之。知有髮瘤也。

一婦人腰間生一肉瘤。三年餘方漸微痛。一日午後。出小蛔三條。長約五寸。置溫水中。游動半時方息。時病者形體衰弱。面黃肌瘦。朝以八味丸。午用人參養榮湯。服至百日外。元氣漸醒。又百日。其口方收。余意其蛔。及經絡血氣所化。

一婦人氣衝穴生瘤。紅紫堅硬。乃血瘤也。心肝二脈。俱已洪數。此心氣鬱結。肝氣受傷之故。辭以不治後。請京師一醫治之。頭已穿潰。雖強投補托化堅涼血等劑。日潰日爛。終至不應。破經兩月。一日湧出紫血盆許而亡。人問其故。余曰。心脈洪數。心火旺也。肝脈弦數。肝氣傷也。火旺逼血妄行。肝傷不能藏血。破必出血不止。多致危亡。余所以預辭不治也。

瘻瘤主治方

清肝蘆薈丸 治惱怒傷肝。致肝氣鬱結爲瘤。堅硬色紫。累累青筋。結若蚯蚓。遇喜則安。遇怒則痛者。 川芎 當歸 白芍各二兩 生地三兩

青皮蘆薈 昆布 海粉 甘草節 牙皂 黃連各五錢 右爲末。神麴糊爲丸。如桐子大。每服八十九。白滾湯量病上下。食前後服之。

芩連二母丸 治心火妄動。逼血沸騰。外受寒涼結爲血瘤。微紫微紅。軟硬間雜。皮膚隱隱纏如紅絲。皮破血流。禁之不住者。 黃連 黃芩 貝母 知母 川芎 當歸 白芍 生地 蒲黃 羚羊角 地骨皮
甘草 等 右爲末。側柏葉煎湯。打寒食麵爲丸。如桐子大。每服七十九。燈心湯送下。或作煎劑服亦效。

順氣歸脾丸 治思慮傷脾。致脾鬱結。乃生肉瘤。軟如綿。腫似饅。脾氣虛弱。日久漸大。或微疼。或不疼者。 陳皮 貝母 香附 烏藥
當歸 白朮 茯神 黃耆 酸棗仁 遠志 人參 等 木香 甘草 等 右爲
末。合歡樹根皮四兩煎湯。煮老米糊丸。如桐子大。每服六十九。食遠白
滾湯送下。

通氣散堅丸 治憂鬱傷肺。致氣濁而不清。聚結爲瘤。肉色不赤。軟
而不堅。由陰陽失度。隨喜怒消長者。 陳皮 半夏 茯苓 甘草 石菖
蒲 枳實 人參 膽星 花粉 桔梗 川芎 當歸 貝母 香附 海
藻 黃芩 等 右爲末。荷葉煎湯。泛爲丸塞豆大。每服一錢。食遠燈心
二十根。薑三片。泡湯送下。

調元腎氣丸 治房慾勞傷。憂恐損腎。致腎氣弱而骨無榮養。遂生骨
瘤。堅硬如石。形色或紫或不紫。推之不移。堅貼于骨。形體日漸消瘦。
氣血不榮。皮膚枯槁。甚者寒熱交作。飲食無味。舉動艱辛。腳膝無力。
並宜服之。生地 荘肉 山藥 丹皮 茯苓 人參 歸身 澤瀉
麥冬 地骨皮 龍骨 木香 砂仁 黃柏 等 知母 各五錢 右爲末。
鹿角膠四兩。醇酒化稠。加蜜四兩同煎。滴水成珠。和藥爲丸。如桐子大。
每服八十九。空心溫酒送下。忌白蘿蔔火酒房事。

海藻王壺湯 治癰瘤初起。或腫或硬。或赤或不赤。但未破者。 海
藻 貝母 陳皮 昆布 青皮 川芎 當歸 連翹 甘草節 半夏 獨
活 等 海帶 等 水二鍾。煎八分。量病上下。食前後服之。凡服此門藥
。先斷厚味大葷。次宜絕慾虛心爲妙。

活血散癰湯 治癰瘤已成。日久漸大。無痛無癢。氣血虛弱者。 白
芍 當歸 陳皮 川芎 半夏 熟地 人參 茯苓 丹皮 紅花 昆
布 木香 甘草節 等 青皮 肉桂 等 水二鍾。煎八分。量病上下服。飲
酒一小杯。

六軍丸 治癰瘤已成未潰者。不論年月新久。並空服之。 蜈蚣 等
蟬蛻 全蝎 僵蚕 等 夜明砂 穿山甲 以上等分爲細末。神麃糊爲丸。

粟米大。硃砂爲衣。每服三分。食遠酒下。忌大葷煎炒。日漸可消。

枯瘤方 治瘤初起成形未破者。及根蒂而不散者。白砒硝砂 黃丹 輕粉 雄黃 乳香 没藥 硼砂 斑蝥 田螺壳三個 共研極細。糯米粥調和。捏作小碩子樣。曝乾。先灸瘤頂三炷。以藥餅貼之。上用黃柏末水調。蓋敷藥餅。候十日外。其瘤自然枯落。次用飲口藥。

秘傳飲瘤膏 治癰瘤枯藥落後。用此搽貼。自然生肌完口。血竭 輕粉 龍骨 海螵蛸 象皮 乳香 雞蛋黃蒸熟用 以上各爲細末。共再研和。入雞蛋油內攪勻。每日早晚。甘草湯洗淨患上。雞翎蘸塗。膏藥蓋貼。

琥珀黑龍丹 治五癰六瘤。不論新久。但未穿破者。琥珀 血竭 京墨 五靈脂炒 海帶 海藻 南星汁炒 木香 麝香 以上各爲細末。和勻再研。煉蜜丸一錢重。金箔爲衣。曬乾密收。每用一丸。熱酒一杯。量病上下。食前後化服。如患在下部。服後隨用美膳壓之。

十全流氣飲 治憂鬱傷肝。思慮傷脾。致脾氣不行。逆于肉裏。乃生氣癰肉瘤。皮色不變。日久漸大者。陳皮 赤苓 烏藥 川芎 當歸 白芍 香附 青皮 瓜甘草 木香 薑三片。棗二枚。水二鍾。煎八分。

瘤應用方

三品一條槍 人參養榮湯 補中益氣湯 八味丸 十全大補湯 寒食麵

【探究、按語】

癰瘤 古昔常將癰與瘤合稱爲癰瘤，癰者如癰絡之狀發於頸部，瘤者，隨氣血留住，發無定處，兩症均爲體表腫塊性慢性疾患，在病因及治療方面，亦有甚多相似之處，實功將五瘤配合五臟論治，方法恰當，可爲指南。

考癰作爲病名，首見於「山海經」。「神農本草經」已載海藻“主癰瘤氣”。晉「肘後備急方」「有海藻酒方」「療項下卒結、囊漸大欲成癰」。晉「小品方」「襄陽蠻人，其飲沙水，喜癰有核瘰疬耳，無根，浮動在皮中」。已注意及擾患氣結，與所飲之水質有關，且以海藻昆布海蛤等含碘藥物組方治療，至今仍被採用。隋「諸病源侯論」宗晉「小品方」之說，指出山區偏壞地帶患此病爲多，並將之分爲血癰、息肉癰、氣癰三種。至宋「三因極一病証方論」分石癰、肉癰、筋癰、血癰、氣癰五種，並云“五癰皆不可妄決破，決破則膿血崩潰，多至夭枉”此說均爲後世所宗。五癰中尤以肉癰、石癰、氣癰三種較爲常見。治療以理氣解鬱，活血散

結，化痰軟堅為原則，並以含碘之海生植物為常用藥。

瘤 乃留滯而不去也，凡瘀血、痰滯、濁氣等停留於組織之中，形成腫瘍者是也。

考瘤之病名，首見於殷墟出土之甲骨文。「靈樞、刺節真邪篇」載有三種，並分析症狀病因。「諸病源侯論」論及體表良性腫瘤之証狀及預後較為準確。唐「備急千金要方」載有骨瘤、脂瘤、石瘤、肉瘤、膿瘤、血瘤六種。宋「三因極一病証方論」中有氣瘤而無石瘤今則除膠瘤外，都以配合五臟定名。綜合患瘤之因，多由正氣不足，外受六淫之邪，津液氣血凝滯，日以聚居所發，或由內傷七情，飲食不節，房室勞倦，五臟受損，氣血逆亂，濁氣痰濕瘀血等留滯於組織之中所成，亦有受之父母，生而有之者。

肺癰論三十

【原文】

夫肺癰者。金受火刑之症也。蓋肺為五臟華蓋。其位至高。其質至清。內主乎氣。中主聲音。外司皮毛。又兼主乎貴賤壽夭。金清而氣管深長者。其音自清。其韵自高。其聲自洪。此三者。主貴主壽。亦主通達。如金濁而氣管短細者。其音自焦。其韵自低。其聲自小。此三者。主夭主賤。亦主蹇滯。故肺經獨旺於秋者。應其輕清之候也。倘有所剋。其病自生。患肺癰者。先因感受風寒。未經發越。停留肺中。初則毛聾惡風。咳嗽聲重。胸膈隱痛。項強不能轉側。是其真候也。久則鼻流清涕。咳吐膿痰。黃色腥穢。甚則胸脇脹滿。呼吸不利。飲食減少。脈洪自汗。法當清金甘桔湯主之。麥冬清肺飲調之。又久嗽勞傷。咳吐痰血。寒熱往來。形體消削。咯吐瘀膿。聲啞咽痛。其候傳為肺痿。如此者百死一生。治宜知母茯苓湯主之。人參五味子湯調之。又有七情飢飽。勞役損傷肺脾者。麥冬平肺飲主之。紫菀葶苈湯調之。又有房慾勞傷。丹石補藥。消燬腎水者。宜腎氣丸主之。金液戊土丹調之。又勞力內傷。迎風響叫。外寒侵入。未經解散。致生肺癰。初起脈浮微數。胸熱氣粗。寒熱往來。咳嗽生痰者。當以小青龍湯主之。麥冬清肺飲調之。通用金鯉湯。蠟礬丸。太乙膏。清金寧肺丸等。相間服之亦效。如手掌皮粗。六脈洪數。氣急顴紅。污膿白血。嘔嘔瀉水。鼻搗不滌飲食者。俱為不治。此症以身涼脈細。膿血交流。

痰色鮮明。飲食知味。膿血漸止者生。反此則死。

肺癰看法

初起脈浮虛細。身體不熱。咳嗽有痰。呼吸調勻者順。已成脈浮微數。咳吐膿痰。形色鮮明。語聲清朗者吉。潰後咳吐膿痰。間吐鮮血。時發時止。飲食知味者順。吐膿漸漸稀少。胸脇不痛。面色微微帶黃。便調多穢者順。初起脈洪弦數。身熱多寒。胸疼氣喘。面紅多汗。損壽已成。咯吐膿痰。氣味濁臭黃痰如膠堅固。唇反終亡。咯吐再兼白血。氣急多煩。指甲紫而帶黽。終歸冥路。手掌反如枯樹。面黯顫紅。咽痛音如鴨聲。鼻掀終死。

肺癰治法

初起風寒相入。頭眩惡寒。咳嗽聲重者。宜解散風邪。汗出惡風。咳嗽氣急。鼻塞項強。胸膈隱痛。宜解表清肺。日間多寒。喜覆衣被。夜間發熱。多煩去被。宜滋陰養肺。口乾喘滿。咳嗽身熱。脈弦數者。宜降火抑陰。胸滿喘急。咳吐膿痰。身熱氣粗。不得安寧。宜平肺排膿。熱退身涼。脈來短濶。精神減少。自汗盜汗。宜補脾健脾。

肺癰治驗

一義官仲冬時。河道督工。不當迎風呼喚。致肺受傷。初起寒熱交作。咳嗽聲重。氣急生痰。請內科醫治。越治越重。乃請余視。脈浮而數。面光而澤。此肺癰也。視其痰。果有膿意。用桔梗湯二服。咳嗽稍止。復用排膿散四服。其膿漸多。惟胸膈疼痛不減。脈亦帶芤。此胸有瘀血也。用四順散。加紅花牡丹皮二服。吐出紫血碗許。膈痛漸止。又以金鯉湯兼人參五味子間服。月餘而愈。

一男子久嗽不已。咯吐膿痰。面白神勞。胸下隱痛。脈浮微數。此屬肺氣不足。火尚有餘。用知母茯苓湯數服。其膿漸少。又以清金寧肺丸服之而愈。

一男子因勞傷咳嗽不止。至夜身熱尤甚。日久咯吐膿血。診之脈弦而數。此虛火假症也。先以童便日飲三四次。又服紫菀葶苈湯數劑。至夜身熱不發。又兼服金鯉湯月餘漸瘳。蓋童能退陰火。嘗治瘍瘍虛熱不退者極效。

一男子鬱鬱不遂意。患嗽半年。時或咳吐膿血。且形體衰弱。飲食減少。脈亦微數。聲漸將雌。惟面不紅。將成肺痿。而尚可治。投以清金二母湯十餘服。咳嗽減半。又以金鯉湯與人參五味子湯兼服。又早飲人乳。

晚飲童便。各一錘。調理百日。外而安。

一男子生平好飲。口乾作渴。致肺壅熱成癰。咳嗽膿痰。喘滿難臥。用葶苈散二服。而喘定易睡。又以紫菀草湯加乾葛花粉十餘服。而膿痰漸少。隨後早以加減八味丸。午用清金寧肺丸。服之兩月而愈。

一男子五十餘歲。早多寵妾。膏梁無厭。咳嗽發熱。吐痰腥臭。手掌枯澀。面隱微紅。痰中帶血。脈亦細微而數。此肺癰所忌也。辭不治。他醫許其可生。強爲用藥。終不應而死。人或問故。余曰。手掌枯澀。血枯土傷。不能生金也。面色微紅。相火已動。痰有白血。正肺受傷。脈弦而數。真氣虛敗。肺癰犯此。豈有不死。

肺癰主治方

麥冬平肺飲 治肺癰初起。咳嗽氣急。胸中隱痛。嘔吐膿痰者。人參 麥冬 赤芍 檳榔 赤苓 陳皮 桔梗 錢 甘草 五分 水二錘。煎八分。食遠服。

元參清肺飲 治肺癰咳嗽膿痰。胸膈脹滿。上氣喘急發熱者。元參 錢 銀柴胡 陳皮 桔梗 茯苓 地骨皮 麥冬 錢 薏苡仁 錢 人參 甘草 五分 檳榔 三分 水二錘。薑一片。集 黃 煎八分。臨服入童便一杯。食後服。

寧肺桔梗湯 治肺癰胸膈隱痛。兩脇腫滿。口燥咽乾。煩悶多渴。自汗盜汗。眠臥不得。時吐稠痰腥臭者。桔梗 貝母 當歸 瓜萎仁 黃耆 枳殼 甘草節 桑皮 防已 百合 米仁 錢八 五味子 甜葶苈 地骨皮 知母 錢五 水二錘。薑三片。煎八分。不拘時服。咳甚加百合。身熱加柴胡黃芩。大便不利。加蜜炙大黃一錢。小便滯澀。加燈心木通。煩燥兼血加白茅根。痛甚加人參白芷。

四順散 治肺癰吐膿。五心煩熱。壅悶咳嗽。氣急不能安。貝母 紫菀 桔梗 錢 甘草 杏仁 錢七 水二錘。煎八分。食遠服。或爲末。白湯調服二錢。

清金寧肺丸 治肺癰咳嗽日久。膿痰不盡。身熱虛羸。漸成勞瘵者。陳皮 茯苓 桔梗 貝母 人參 黃芩 錢五 麥冬 地骨皮 銀柴胡 川芎 白芍 胡黃連 錢六 五味子 天門冬 生地 酒浸 熟地 蜜浸 歸身 白朮 錢二 甘草 錢 右爲細末。煉蜜爲丸。如梧子大。每服七十九。食遠白滾湯送下。

人參五味湯 治氣血勞傷。咳膿或咯血。寒熱往來。羸瘦困乏。一切

虛損之症 人參 五味子 前胡 陳皮 白朮 桔梗 當歸 茯苓 熟地 甘草 蜜炒去甘草蜜炒 黃耆 地骨皮 桑白皮 枳殼 柴胡 水二錢 水二錢。薑三片。煎八分。食遠服。

紫菀茸湯 治高粱厚味。或煎炒法酒。飲食過度。致傷肺氣。咳嗽咽乾。吐痰唾血。喘急脇痛。不得安臥。紫菀茸 犀角 炙甘草 人參 水二錢 桑葉 蜜炒去桑葉蜜炒 疑冬花 百合 杏仁 阿膠 貝母 半夏 蒲黃 水二錢 水二錢。薑三片。煎八分。入犀角末。食後服。

排膿散 治肺癰已吐膿後。宜服此。排膿穢補肺氣。 黃耆 白芷 五味子 人參 水二錢 右爲細末。每服三錢。食後蜜湯調服。

知母茯苓湯 治肺痿喘嗽。咳吐痰涎或自汗盜汗。往來寒熱 茯苓 黃芩 蜜炒去黃芩蜜炒 知母 甘草 桔梗 薄荷 人參 五味子 柴胡 半夏 川芎 疑冬花 白朮 阿膠 麥冬 水二錢 水二錢。薑三片。煎八分。加童便一杯。食後溫服。

滌痰湯 治心火剋肺金。炙而不愈傳爲肺痿。咽喉嘶啞。胸膈痞悶。嘔吐痰涎。喘急難臥者。陳皮 半夏 茯苓 甘草 麥冬 膽星 枳實 黃連 人參 桔梗 水二錢 竹茹 水二錢 水二錢。煎八分。食後服。

寧肺丸 治日久咳吐膿血。胸膈不利。咳嗽痰盛。坐臥不安。言語不出。甚則聲音雌啞者。烏梅 蜜拌蒸取肉 鬱粟 炭火炒去鬱粟炒 八錢 蜜炒去烏梅蜜炒

清金二母湯 治肺痿多嗽少痰。午後發熱口乾煩燥不寧者。知母 貝母 桔梗 茯苓 當歸 白朮 陳皮 水二錢 桑皮 紫蘇 杏仁 柴胡 瓜蒌子 黃芩 五味子 甘草 麥冬 水二錢 水二錢。煎八分。入童便一杯。食後服。

梔子仁湯 治肺痿發熱潮熱。或發狂亂煩燥面赤咽痛者。梔子仁 赤芍 大青葉 知母 水二錢 黃芩 石羔 杏仁 升麻 水二錢 柴胡 水二錢 甘草 水二錢 淡豆豉 水二錢 水二錢。煎八分。食遠服。

加味理中湯 治肺胃俱虛。咳嗽聲重。發熱不已。及兼脈浮數而無力者。炙甘草 半夏 茯苓 乾姜泡白朮 陳皮 細辛 五味子 人參 水二錢 水二錢。煎八分。食遠服。

金鯉湯 治肺癰已成未成。胸中隱痛。咯吐膿血者。金色活鯉魚一尾 約四兩 貝母 蜜炒去貝母蜜炒 先將鯉魚連鱗刮去肚腸。勿經水氣。用貝母細末。繆在魚腹內。線扎之。用上白童子小便半大碗。將魚浸童便內。重湯頓煮。魚眼突出爲度。少頃取起。去鱗骨。取淨魚肉浸入童便內。頓熱。肉與童便作二

三次。一日食盡其功效甚捷。

葶苈散 治過食炙燙。或飲酒過度。致肺熱氣壅。喘急不臥。及肺癰濁吐腥臭。胸膈脹滿不食者。桔梗 瓜蔞仁 升麻 米仁 桑皮 葛根
炙甘草^{五分} 甜葶苈^{八分}

腎氣丸 治腎氣素虛。不交於心。津液不降。敗濁爲痰。致生欬逆。
乾山藥^{四兩} 山茱萸^{三錢} 泽瀉^{三錢} 牡丹皮^{三錢} 白茯苓^{三錢} 熟地^{三錢}
右爲末。地黃煮爛杵膏。蜜丸如桐子大。每服七八十九。空心用滾湯
。或鹽湯溫酒送下。

肺癰應用方

金液戊土丹 千金葷莖湯。治欬有微熱煩滿。胸中甲錯。是爲肺癰。 葷莖^{二升} 蕤苡仁^{半升} 桃仁^{五錢} 瓜瓣^{半升} 右四味。以水一斗。先煮葷莖得五升。去渣。納諸藥煮。取二升。服一升。再服當吐如膿。

【探究、按語】

肺癰一症「素問大奇論」「有肺之雍，喘而病胠滿」之記載。漢「全匱要略」「肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治」篇中如「風傷皮毛、熱傷血脉。風舍於肺、熱之所過，血爲之凝滯、蓄結癰膿」，「咳而胸滿、振寒、脈數，咽乾不渴，時出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者爲肺癰，桔梗湯主之」等原文，對此症之病因，脈證，治法方藥等，均有基礎性論述。實功對本病除論及肺臟蘊熱，復傷風邪鬱久成癰之成因外，並進而記述痰色痰質，面色脈象，咳嗽聲音，皮膚爪甲形色，預後順逆以及治療等等，至今仍具參考價值。

綜觀此症之主因爲，衛氣不固，腠理不密，感受風邪，或肺素蘊熱，復感風熱，合邪成癰，或痰熱內盛，薰蒸于肺，蓄結而成。特徵有發熱，胸痛咳嗽，及咯吐膿血，腥臭濁痰等。初起之時惡寒發熱，咳嗽胸痛，呼吸不利，咯吐粘痰，全身不適，舌白或黃，脈滑浮數時，宜清肺散邪，利氣疏痰，可選銀翹散桑菊飲，射干麻黃湯，酌加魚腥草，前胡，杏仁，浙貝，桑白皮。待身熱轉甚，寒戰或高熱，繼則但熱不寒，汗出咳嗽，呼吸迫促，胸悶脹痛或刺痛，咳則更甚，轉側不安，痰多粘膩，色白或黃，口渴煩躁，舌紅苔膩，脈滑數或洪數者，爲癰瘍已成，宜清熱解毒，化瘀消癰，可選千金葷莖湯加魚腥草敗醬草蒲公英紫花地丁，銀花，浙貝，咯痰腥臭，犀黃丸亦可酌用，胸滿痰濁者葶苈大棗瀉肺湯加減。如咳嗽頻頻，煩滿作痛，甚則胸高氣湧，喘不得臥，咯吐膿血濁痰，狀如米粥，腥臭異常，身熱面赤渴飲，舌紅苔黃膩，脈滑數或沉實時，爲癰破膿潰，咯吐而出，治宜泄熱解毒，祛痰排膿，可選桔梗湯仍加魚腥草，敗醬草，銀花，蘆根，血多加仙鶴草，白芨等。如熱

退咳減，膿血漸少，痰清色白，臭味漸消時改沙參清肺湯加減，清燥救肺湯加減酌用。如呼吸漸平，胸痛消失，納食漸進，已趨痊癒境地，若咽痛隱隱，氣短自汗盜汗，口渴咽燥，舌紅苔薄，脈細無力，或咳嗽時輕忽重，膿血不淨，身熱不清，納食不增則轉為慢性，如見皮膚甲錯，爪甲紫黑而帶彎凸不平等象者，總非佳兆。



卷七

流注論第三十一

【原文】

夫流者行也。乃氣血之壯。自無停息之機。注者住也。因氣血之衰。是有凝滯之患。其形漫腫無頭。皮色不變。毋論穴道。隨處可生。凡得此者。多生於體虛之人。勤勞之輩。不慎調變。夏秋露臥。縱意取涼。熱體當風。圖身快爽。或中風邪。發散未盡。或慾後陰虛。外寒所侵。又或惱怒傷肝。鬱結傷脾。榮氣不從。逆於肉裏。又或跌打損傷。瘀血凝滯。或產後惡露未盡。流宿經絡。皆成斯疾。既成之後。當分表裏寒熱虛實。邪正新久而治之。初因風寒所中。表症發散未盡者。人參敗毒散散之。房慾之後。體虛寒氣外侵者。五積散加附子溫之。勞傷鬱怒。思慮傷脾而成者。歸脾湯加香附青皮散之。跌撲傷損。瘀血凝滯而成者。復元活血湯逐之。產後惡露未盡。流注經絡而成者。木香流氣飲導之。此皆初起將成。治法一服至三四服皆可。外俱用琥珀膏敷貼。其中亦有可消者。十中五六。如服前藥不得內消者。法當大養氣血。培助脾胃。溫暖經絡。通行關節。木香流氣飲。十全大補湯。俱加熟附子香附。培助根本。如此則未成者自消。已成者自潰。已潰者自斂。而終無殘敗破漏不斂之症。如有膿。宜急開之。患者又當慎起居。戒七情。遠寒就溫。庶可保全。若誤用寒涼剋伐。內消等藥。終至不救者多矣。

流注看法

初起漫腫。皮色光亮。微熱微疼。筋骨不牽強者順。已成身體微熱。飲食有味。疼痛有時。腫生紅色者順。已潰膿稠而黃。腫消痛止。身體輕便。起坐如常者順。潰後內肉易生。膿水易止。精神易復。膿口易合者順。初起身體發熱。脈細而數。皮色微腫。痛徹筋骨者險。已成。飲食少思。口乾作渴。身體疼痛。四肢沈重者險。已潰膿水清稀。腫仍不消。虛熱不退。疼痛不減者逆。潰後膿穢不止。肌膚瘦削。飲食不食。發熱皮粗者死。

流注治法

初起風寒表散未盡。而後復生腫痛者。再宜和解之。表邪已盡。而後復生流注者。宜清熱消腫。行散氣血。暴怒所傷。抑鬱所致。胸膈痞悶。中氣不舒。宜順氣寬中。腫硬已成。而不得內消者。宜和氣血。更兼補助脾胃。跌撲閃肭。瘀血凝滯爲患者。宜調和氣血。通行經絡。寒邪所襲。筋攣骨痛。及遍身疼痛者。溫經絡。行氣血。產後敗血流注關節致生腫痛者。當散敗瘀養氣血。潰後膿水不止。而形衰食少者。宜滋氣血。峻補脾胃。

流注治驗

一男子風寒表散未盡。兩腮腫痛。微熱不退用小柴胡湯。加川芎天花粉 桔梗、連翹、二服熱頓退。又以二陳湯。加桔梗。黃芩。牛蒡子。連翹四服。十日而安。

一男子勞傷受寒。背生三腫。皮色不變。寒熱交作。至夜尤甚。先以萬靈丹洗浴發汗。寒熱頓退。惟腫硬不消。以琥珀膏敷之。三次腫消。痛止漸平。

一婦人因怒。脇下結腫。將近半年方痛。此肝氣鬱結之症。用木香流氣飲四服。其腫漸紅。蓋病久必欲作膿。不可內消。又以十全大補湯加木香、香附、青皮十餘服。腫漸高。又以本方加皂角刺五服。其膿乃潰。清而且多。此元氣已經虧損所致。服人參養榮湯。加熟附子。月餘膿始稠少。本方倍參耆歸尤。兩月而愈。

一男子元氣素虛。因暴怒脾生腫塊。疼痛牽強寒熱往來。飲食日減。以補中益氣湯。加香附、貝母十餘服。寒熱漸止。又服益氣養榮湯。月餘而腫潰。間服八珍湯。外用香附餅。日炙二次。脾胃健而安。

婦婦頓閭乳上各腫一塊將近一年。漸大而痛。診之脉細數而無力。此思慮過傷之症。用歸脾湯加桔梗香附十餘服。腫漸高。以琥珀膏敷之。色漸紅。欲其作膿。以十全大補湯。加桔梗、貝母。服之半月。膿熟針之。頭面膿清。虛熱復作。食少不睡。仍以歸脾湯。間逍遙散服之。三月而愈。

一男子平素怯弱。腰後敷腫一塊。飲食少思。口乾發熱。此腎傷也。治當朝以附桂八味丸。午用人參養榮湯。扶植根本爲要。彼以口乾發熱。爲內有火。欲投清涼之劑解之。余辭不治。彼請內科治之。以退熱爲主。正合其意。投藥三劑。腹痛作瀉。又以豬苓、澤瀉、厚朴。泄氣等藥投之。大熱發作。形體更變。復請余治。余曰。死期速矣。因虛致病。法當滋

補。況腫在腰間。內腎受傷。口乾作渴。腎水枯竭。發熱不退。陰虛血少。今以有餘之藥。而療不足之症。豈有不死者哉。又半月而死。

流注主治方

調和榮衛湯 治流注初起。氣血凝聚。結腫不散。已成未成並服。

川芎 當歸 陳皮 獨活五錢 赤芍 白芷 烏藥 大茴香 黃耆各八錢 甘草二錢
紅花五錢 牛膝下部加一錢 水二茶鍾。煎八分。入酒一盃。量病上下服。

木香流氣飲 治流注瘰疬。及鬱結爲腫。或血氣凝滯。遍身走注作痛。或心胸痞悶。咽嗌不利。脇腹臌脹。嘔吐不食。上氣喘急。咳嗽痰盛。或四肢面目浮腫者。 川芎 當歸 紫蘇 桔梗 青皮 陳皮 烏藥 黃耆 枳實 茯苓 防風 半夏 白芍五錢 甘草節 大腹皮 木香 檳榔 泽瀉 枳殼五錢 牛膝下部加一錢 水三茶鍾。薑三片。棗一枚。煎八分。食遠服。

六鬱湯 治諸鬱結腫。及左右二搭相串。溼痰流注等症。 川芎 半夏 茯苓 香附 陳皮 山梔五錢 蒼朮 砂仁 甘草各五錢 水二茶鍾。薑三片。煎服。

附子八物湯 治房慾後陰虛受寒。致生腫塊。又或遍身腿腳疼痛。不能步履。 川芎 白芍 熟地 人參 白朮 茯苓 當歸 附子一錢 肉桂三分 木香 甘草各三錢 水二茶鍾。薑二片。棗一枚。煎八分。食遠服。

瘡科流氣飲 治流柱及一切鬱怒。凝滯氣血。作腫疼痛。或胸膈痞悶。或風寒溼毒搏於經絡。結成腫塊者。 當歸 甘草 紫蘇 人參 白芍 官桂 黃耆 防風 枳殼 烏藥 桔梗 厚朴各七錢 檳榔 木香 川芎 白芷各五錢 水二茶鍾。煎八分。食前服。

通經導滯湯 治婦人產後敗血流注經絡。結成腫塊疼痛者。 香附 赤芍 川芎 當歸 熟地 陳皮 紫蘇 牡丹皮 紅花 牛膝 枳殼一錢 甘草節 獨活五錢 水二茶鍾。煎八分。入酒一小杯。食前服。

香附餅 治風寒流注襲於經絡。結成腫痛。用香附爲末酒和。量瘡大小做餅。覆患處。熱熨斗熨藥上。未成者自消。已成者自潰。風寒溼毒宜薑汁作餅。

醒脾湯 治懷抱鬱結思慮傷脾。致脾氣不行。逆於肉裏。乃生壅腫。疼痛不眠。心煩不安。神氣不清。白朮 黃耆 人參 茯神一錢 酸棗仁 地骨皮 遠志各七錢 柴胡 甘草 桔梗 黃連 木香 香附各五錢 龍眼肉七個 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

調中大成湯 治流注潰後膿水清稀。飲食減少。不能生肌收斂。白

朮 茯苓 歸身 白芍 陳皮 山藥 牡丹皮 黃耆一錢 人參三錢 薑香 砂仁 遠志 甘草五分 附子 肉桂八分 水二茶鍾。煨薑三片。棗二枚。煎八分。食遠服。

黃耆六一湯 治流注潰後膿水多出。口乾作渴。煩燥不寧。黃耆一錢半生火炒 甘草五分半生半火 人參三錢 水二茶鍾。煎八分。食遠服。

散血葛根湯 治跌撲損傷。瘀血凝滯結成流注。身發寒熱者。乾葛 半夏 川芎 防風 羌活 升麻 桔梗八分 白芷 甘草 細辛 蘇葉 香附 紅花六分 水二茶鍾。葱白二枚。薑三片。煎八分。不拘時服。

先天大造丸 治風寒溼毒襲於經絡。初起皮色不變。漫腫無頭或陰虛。外寒侵入。初起筋骨疼痛。日久逐腫。潰後膿水清稀。久而不愈漸成漏症者。紫河車一錢酒浸去黃精膏 熟地黃四兩酒浸去黃精膏 歸身 茯苓 人參 枸杞 菓絲子 肉蓴草酒浸去黃精膏 黃精 白朮 何首烏豆同鹽炒 川牛膝 骨碎補鵝鷄掌炒 仙茅去赤汁蒸熟去皮搗膏各二兩 川巴戟酒浸去黃精膏 破故紙卷心炒 遠志去心炒 木香 青鹽各五錢 丁香三錢 黑棗肉兩 右爲細末。外蜜丸如桐子大。每服七十九、空心溫酒送下。此方非獨流注成漏者可用。又補一切氣血虛羸。勞傷內損。及男婦久無嗣息。並有奇功。

琥珀膏 治一切皮色不變。漫腫無頭。氣血凝滯。結成流毒。毋論身體上下。年月新久。但未成膿者。大黃一錢 鐫金 南星 白芷一錢 共爲細末。用蒜頭去殼搗爛。入上藥再搗稠。入酒一二匙調勻。遍敷腫上。紙蓋或即熱痛。或不痛俱待藥乾便效。次日又有起泡。又有不起泡者。如有泡起挑去泡中黃水膏貼之自效。

附錄大活絡丹 治一切中風癱瘓。痿痺痰厥。拘攣疼痛。瘻疽流注。跌撲損傷。小兒驚癇。婦人停經。白花蛇 烏梢蛇 威靈仙 兩頭尖僵蠶 草烏 天麻一錢 全蝎一錢 首烏黑豆炒 龜板一錢 麻黃 貫仲 炙草 羌活 官桂 薑香 烏藥 黃連 熟地 大黃一錢 木香 沈香二錢 細辛 赤芍 没藥去油 丁香 乳香去油 僵蠶 天南星黑豆炒 青皮 骨碎補 白寇 安息香酒浸 黑附子一錢 黃芩一錢 香附酒浸去黃精 元參 白朮各一錢 防風五錢 葛根 虎脰骨一錢 當歸各半錢 血竭一錢 地龍一錢 犀角 麝香 松脂各五錢 牛黃 片腦各二錢 人參三錢 右藥各研稱準合和。再研。蜜丸如桂圓核大。金箔爲衣。陳酒送下。須用白蠟爲匱收藏以免泄氣。

流注應用方 十全大補湯 人參養榮湯 捕中益氣湯 歸脾湯 益氣養榮湯 八珍湯俱見清寒門 萬靈丹俱見寒門 小柴胡湯 二陳湯俱見寒門

【探究、按語】

流柱一症作爲病名，始見於明「仙傳外科集驗秘方」。實功流柱之論如流者行

也，行者由其自然，注者住也，注者由於瘀壅，氣血流行不暢，壅而形成，以及治則等較為詳細，但不若清「瘍科心得集」之論述精確。

起因多由於時邪外客，餘毒流阻，敗瘀凝滯所致，雖發無定處，但以胸腹臂腿為多，屬深部腫瘍，位在肌肉經脈之間，內不入臟腑，雖患部色白似陰症，但發病速，成膿快，潰後易斂，癒後良好。初起以祛邪消散為主，暑溼內蘊者，名暑溼流柱，宜清暑化溼，餘毒流阻者，清熱解毒，勞而傷筋者，名傷筋流柱，以和營通絡治之，瘀血停滯者，又稱瘀血流柱，用活血化瘀等法，靈活運用。初起時求消為貴，如消之不去而成膿，則刀剖排膿，初潰後仍應注意清解餘邪務使淨，免除餘毒未淨而流走竄生，竄生則又名瓜藤流柱，總之病由邪氣壅阻而生，去其致病之因為主要，若非毒甚，慎用寒涼，潰後不屬大虛，忌用峻補，以防留邪竄發。初起時如膿尚未未成，除因證選方外，如配合「礞峒丸」同服，則消散之效果更彰。

乳癰乳岩論第三十二

【原文】

夫乳病者。乳房為陽明胃經所司。乳頭為厥陰肝經所屬。孔子之母。不能調養。以致胃汁濁而壅滯為膿。又有憂鬱傷肝。肝氣滯而結腫。初起必煩渴嘔吐。寒熱交作。腫痛甚者。宜牛蒡子湯主之。厚味飲食。暴怒肝火妄動結腫者。宜橘葉散散之。又憂鬱傷肝思慮傷脾積想在心。所愿不得。致經絡痞濶。聚結成核。初如豆大。漸若圓棗子。半年一年。二載。三載不疼不癢。漸漸而大。始生疼痛。痛則無解。日後腫如堆粟。或如覆碗。紫色氣穢。漸漸潰爛。深者如岩穴。凸者若泛蓮。疼通連心。出血則臭。其時五臟俱衰。四大不救。名曰乳岩。凡犯此者。百人必百死。知覺若早。始用清肝解鬱湯。或益氣養榮湯。患者再加清心靜養。無累無碍。服藥調理。當可苟延歲月。若中年以後。無夫之婦得此。其死尤速。故曰夫乃婦之天也。惟初生核時。急用艾灸核頂。待次日起泡挑破。用拔針入四分。用冰蠅散條插入核內。糊紙封蓋。至十三日其核自落。用玉紅膏生肌斂口。再當保養。庶不再發。又男子乳癰。與婦人微異。女損肝胃。男損肝腎。蓋怒火房慾過度。以致肝虛血燥。腎虛精怯。血脉不得上行。肝筋無以榮養。遂結腫痛。治當八珍湯。加山梔牡丹皮。口乾作渴者。加減八味丸。腎氣素虛者。腎氣丸。已潰作膿者。十全大補湯。懷孕之婦乳疾曰

內吹。因胎氣旺而上衝。致陽明乳房作腫。宜石膏散清之。亦可消散。遲則遷延日久。將產出膿。乳汁亦從膿竅流出。其口難完。有此者純用補托生肌。其口亦易完矣。

乳癰乳岩看法

初起紅赤腫痛。身微寒熱。無頭眩。無口乾。微痛者順。已成掀腫發熱。疼痛有時。一囊結腫。不侵別囊者輕。已清膿黃而稠。腫消疼痛漸止。四邊作癢生肌者順。潰後膿水自止。腫痛自消。新肉易生。膿口易合者順。初起一乳通腫。但痛不紅。寒熱心煩。嘔吐不食者逆。已成不熱不紅。堅硬如石。口乾不眠。胸痞食少者逆。已潰無膿。正頭腐爛。腫勢愈高。痛勢愈盛。流血者死。潰後肉色紫黑。痛苦連心。嘔氣日深。形體日削者死。

乳癰乳岩治法

初起發熱惡寒。頭眩體倦。六脈浮數。邪正在表。宜散之。發熱無寒。惡心嘔吐。口乾作渴。胸膈不利者。宜清之。憂鬱傷肝。思慮傷脾。結腫堅硬微痛者。宜疏肝行氣。已成掀腫發熱。疼痛有時。已欲作膿者。宜托裏消毒。膿已成而脹痛者。宜急開之。脾胃虛弱。宜更兼補托。潰而不斂。膿水清稀。腫不消。疼不止。宜大補氣血。結核不知疼痛。久而漸大。破後惟流污水。宜養血清肝。

乳癰乳岩治驗

一婦人因怒。左乳腫痛。寒熱交作。服人參敗毒散一劑。表症已退。又用牛蒡子湯二服。腫消漸安。

一婦人憂思過度。久鬱成癆。左乳結核如桃。半年似痛非痛。咳嗽生痰。身發潮熱。診之脈微數而無力。此真氣雖弱。而邪火有餘。如用藥合理。尚堪調治。先用逍遙散。加香附。貝母十餘服。而咳嗽漸止。寒熱間作。又用八珍湯。加香附、牡丹皮、柴胡、遠志十餘服。身熱去其八九。又服益氣養榮湯。加青皮、木香。兩月餘胸膈得利。噯氣得舒。飲食漸進。肌膚漸澤。外腫以阿魏化痞膏貼之。半年餘而消。

一婦人右乳疼痛。腫如覆碗。診之脈數有力。此有餘症。欲作膿也。用托裏消毒散數服而脹痛。針之出膿碗許。又用十全大補湯。加香附十餘服而安。

一婦人暴怒。左乳結腫疼痛。自服仙方活命飲二劑。疼痛稍止。結腫不消。仍服清涼敗毒之劑。腫痛更作。形體日弱。診之脈浮數而無力。此

真氣虛而邪氣實也。非補不可。用益氣養榮湯四五服。其腫始高。寒熱亦退。又十餘服而膿潰。兼服十全大補湯。兩月而癒。此症非純補豈能得愈。

一男子年過五十。因妻喪子不成立。憂鬱傷肝。左乳結腫半年痛甚作癢。肝脈弦數。先用小柴胡湯。加青皮、山梔、遠志、貝母、數服。而肝脈稍平。又用八珍湯。仍加前藥十餘服。其腫漸腐爲膿。更服益氣養榮湯。庶保收斂。彼內醫所惑。謂鬱怒傷肝。肝經有火不必用補。更服降火流氣寬中等劑。致食少便秘。發熱作渴。復請余治。肝脈復弦。口乾作渴。邪火內淫。飲食減少。脾土受傷。便秘發熱。陰血竭而爲燥爲熱。已上俱內損症也。辭不治後月餘果死。

一婦人左乳結核。三年方覺腫痛。診之脈緊數而有力。此陽有餘而陰不足也。凝結腫如石。皮肉紫色不澤。乃真乳岩症。辭不治。又一婦左乳結腫。或小或大。或軟或硬。俱不作痛。至半年餘。腫如覆碗。堅硬木痛。近乳頭纍纍偏生瘡瘍。時痛時癢。診之脈弦而數。腫色慘黑不澤。此氣血已死。亦辭不治。又一婦已潰。腫如泛蓮流血不禁。亦辭之。後果俱死。

乳癰主治方

牛蒡子湯 治乳癰結腫疼痛。毋論新久。但未成膿者。陳皮 牛蒡子 山梔 金銀花 甘草 瓜蔞仁 黃芩 天花粉 連翹 角針針 柴胡 青皮姜 水二茶鍾。煎八分。入酒一盃。和勻。食遠服。

橘葉散 治婦人有孕胎熱爲內吹。有兒吃乳名外吹。致乳成腫痛。寒熱交作。甚者惡心嘔吐。柴胡 陳皮 川芎 山梔 青皮 石膏 黃芩 連翹姜 甘草姜 橘葉姜 水二茶鍾。煎八分。食遠服。

清肝解鬱湯 治一切憂鬱氣滯。乳結腫硬。不疼不癢。久漸作疼。或胸膈不利。肢體倦怠。面色萎黃。飲食減少。陳皮 白芍 川芎 當歸 生地 半夏 香附姜 青皮 遠志 茵陳 貝母 蘇葉 桔梗姜 甘草 山梔 木通姜 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

鹿角散 治乳癰新起結腫疼痛。憎寒發熱。但未成者俱效。鹿角尖三寸。用炭火煅稍紅存性碾末。每服三錢。食後。熱酒一茶鍾調服。甚者再用一服必消。

回乳四物湯 治產婦無兒吃乳。致乳汁腫脹堅硬。疼痛難忍。川芎 當歸 白芍 熟地姜 麥芽酒 水二茶鍾。煎八分。食遠服。用腳布束緊兩乳。以手按揉。其腫自然消散。甚者再用一服。

炙乳腫妙方 治氣惱勞傷。或寒熱不調。乳內忽生腫痛。用碗一隻。內內用粗燈草四根。十字排勻碗內。燈草頭各露寸許。再用平山粗紙。裁成一寸五分闊紙條。用水溼紙。貼蓋碗內燈草上。紙與碗口相齊。將碗覆于腫乳上。留燈草頭在外。將艾大圓于碗足底內。點火炙之。艾盡再添。炙至碗口流出水氣。內痛覺止方住。甚者。次日再炙一次必消。

保安萬靈丹 治乳癰初起。發熱惡寒。頭眩肢體作痛者。

益氣養榮湯 治鬱怒傷肝。七情內結。以致乳中生核。不疼不癢。日久方痛。甚者胸膈不利。香酸嘔吐。頭目昏眩。四肢倦怠。或已破潰。膿水清稀。不能收斂。飲食減少。口淡無味。自汗盜汗肢體羸瘦者。

治乳便用方 治乳癰初起。腫痛未成膿者。用蒲公英。春秋間開黃花似菊者。取連根帶葉二兩搗爛。用好酒半斤。同煎數沸。存渣敷腫上。其酒熱服。被蓋睡一時許。再用連鬚葱白湯一茶鍾。催之得微汗而數。此方鄉村偏僻無藥之所。用之極妙。亦且簡便。

下乳天漿散 治乳母元氣虛弱。乳汁微少。或生兒日久乳少。川芎當歸 白芍 熟地 茯苓 天花粉 甘草 王不留行 麥門冬 漏蘆 穿山甲 通草 用健豬前蹄一隻煮爛。取汁二碗。同藥煎至碗半。二次頓熱。食遠服之。以熱木梳梳其乳房。其汁如泉湧而來。

木香餅 治一切氣滯。結腫成核或痛或悶胸。風寒所傷。木香 生地黃 右木香爲末。同地黃和勻。量患處大小。作餅貼上。以熱熨斗熨之。堅硬木痛者。間日熨之。

乳癰應用方 十全大補湯 八珍湯見溝 逍遙散 冰蠍散 小柴胡湯見溝 托裏消毒散見溝 阿魏化痞膏見溝

【探究、按語】

乳癰之名，首見晉「針灸甲乙經」。「諸病源候論」中已記載有乳癰發病之原因。唐「千金備急要方」方載有“針之”之外治法，至宋「聖濟總錄」指出冲任經脈功能與乳癰有密切關係，對後世醫家影響頗深。元「丹溪心法」已肯定乳癰與經絡及所屬臟腑之關係，並對不同原因所致之乳汁瘀積作出分析。實功總觀前人之說，發展出治療法則，具有辨證論治之特點。

起由肝氣鬱結“乳頭屬肝”、胃熱壅滯“乳房屬胃”而成，以育嬰期間，乳汁湧滯，或哺乳時小兒鼻風吹之亦患，懷孕時亦生名內吹，故有外吹內吹之稱。初起結腫一處或數處，有紅腫熱痛特徵，或先不變色而後漸至紅者，有先起身熱往來，煩渴乾者，初服「桔梗牛蒡湯」，如熱退而腫不消「復元通氣散」消之、乳癰

釀膿快速，如消之不應，勢將潰膿，服「托裏透膿湯」，膿熟者剖切排膿、虛則補之。總之先當發表散邪，疏肝清胃，速下乳汁導其壅塞。若不散宜托裏，若潰後肌肉不生，膿水清稀者，宜補脾胃。若膿出反痛惡寒發熱者宜調營衛。若食少作宜補胃氣。慎用清涼解毒，免傷脾胃。

乳岩

“癌”字由“岳”又作“巖”變化而來，最早用“癌”字作病名者、為宋「衛濟寶書」，宋元以來，多以“岩”字立名。

乳岩一症，首見隋「諸病源候論」稱為“乳石癰”。至明代「校注婦人良方」始稱，“乳岩”載有起因，證狀，並斷為難治。明「瘡瘍經驗全書」並指出早期診斷與治療之重要性。實功對此症論述最詳，對後世影響亦大，至今對研究者仍有參考價值。

起由憂鬱思慮，積想在心，所慮不遂，肝脾氣逆，經絡痞塞為主要原因。初起乳房結核，如棗似栗，不痛不癢，不紅不熱，每不自覺，以致延誤，若能及早發現，從速治療，兼能心情愉快，安心靜養，病勢或可靜止。若經年累月後，始感疼痛，日漸加重，牽引胸腋，終至痛不可解，腫似覆碗，或如堆粟，頂現紫色光亮，紅絲滿佈，先腐後潰，時流污水，氣穢難聞，逐漸擴大，深似岩穴，或如翻花，若復因急怒，則暴流鮮血，根腫愈堅，即成敗症，即所謂百無一生矣。初服「神效瓜萎散」、次服「清肝解鬱湯」外貼「季芝鯽魚膏」，如核不消，反復不癒，勢已成時，不可過用剋伐峻劑，致損胃氣，宜「香貝養榮湯」，心煩不寐者「歸脾湯」，潮熱不退者「逍遙散」，視體質調養之，局部之艾灸，針挑挿條等外治法，今已不用，忌用，塗藥等亦應不傷患處皮膚組織為原則。

附骨疽論第三十三

附鶴膝風

【原文】

夫附骨疽者。乃陰寒入骨之病也。人之氣血壯實。雖遇寒冷。而邪不入骨。凡入者皆由體虛之人。夏秋露臥。寒溼內襲。或房慾之後。蓋覆單薄。寒氣乘虛入裏。遂成斯疾。初起則寒熱交作。稍似風邪。隨後脅腿筋骨作痛。不熱不紅。疼至徹骨。甚者曲伸不能轉側。日久陰變為陽。寒化為熱。甚而腐肉為膿。此疽已成也。凡治此症初起寒熱作痛時。便用五積散。加牛膝紅花。發汗散寒通行經絡。或萬靈丹發汗亦可。次以大防風湯

。行經活血滲溼補虛。又有生於尻臀部位。漫腫作疼者。宜內托羌活湯。腿內近膝股漫腫木痛者。內托耆柴湯。腿外側者。內托酒煎湯。初起通用人參敗毒散加木瓜牛膝蘇木紅花。虛者十全大補湯。加羌活防已牛膝。已成欲作膿者。附子八珍湯。膿成脹痛者。即針之。膿稠而黃。體實者。十全大補湯。膿清色白。體虛者。保元大成湯。食少體倦者。香砂六君子湯。脾虛寒熱者。補中益氣湯。以此調理可也。又有風溼相乘之症。初起寒熱交作。次傳腿腫作痛。其形光亮微紅發熱。按之如泥。不即起者。宜當歸拈痛湯。或茯苓佐經湯。間服萬靈丹和之。以上之症。皆由元氣不足中來。不可誤用損脾泄氣敗毒等藥。外禁寒涼等法。如誤用之必致氣血冰凝。內肉瘀腐。日久化爲污水敗膿。流而不禁。終死。又有房慾勞傷。寒熱互變。氣血乖違。經脈橫解。受病日深以成斯疾者。其患大腿漸漸腫如冬瓜。上過胯腹。下至足底。牽連漫腫。皮色不紅。日久潰膿色白腥穢。腫仍不消。痛仍不減。元氣日衰身體縮小唇舌乾焦二便枯秘。諸藥不效。飲食不進。終爲不治。又有鶴膝風乃足三陰虧損之症。初起寒熱交作時。亦宜五積散。加牛膝紅花。或萬靈丹發汗俱可。如汗後腫痛。仍不消減。此陰寒深伏。以大防風湯。溫暖經絡。重者灸膝眼二穴。敷以琥珀膏。亦可漸漸取效。如以上之法。俱不效者。終成痼疾。不必強藥消之。只宜先天大造丸。史國公藥酒。終年常服亦可轉重就輕。徐圖步履也。

附骨疽看法

初起身微寒熱。飲食如常。結腫微紅疼不附骨者順。已成舉動自便。結腫成囊。疼痛有時。膿易成者吉。已潰膿稠腫消痛減。身體輕便。睡穩不熱者吉。潰後元氣易復。飲食易進。內肉易實。膿水易乾者吉。初起身發寒熱。漫腫色白。肢體牽強疼痛附骨者險。已成舉動不便。通腿漫腫不熱不紅。不作膿者險。已潰膿水清稀。氣穢腥臭。腫痛不消。形體日削者死。潰後脾胃虛弱。飲食無味。口渴不止。唇白皮枯者死。

附骨疽治法

初起發熱惡寒身體拘急。腿腳腫痛。脈浮緊者散之。已成腿腳腫痛。皮色不變上下通腫者。散寒溫經絡。寒熱作腫色白光亮。按之如泥不起者宜健脾滲溼。身體無熱惡寒。脈遲而濁。腿腫不熱者。養血溫經絡。暑中三陰。脈洪而數。腿腳掀腫。口乾便燥者宜下之。已潰膿水清稀。飲食減少。形體消瘦者。補中健脾胃。潰後腫痛不減。膿水不止。虛熱不退者。溫中養氣血。愈後筋骨牽強。屈伸不便者。宜滋養氣血。通利關節。

附骨疽治驗

一男子中寒。發散未盡。大腿腫痛。脈浮數而無力。此風寒未盡。內虛故也。用五積散。去麻黃。加牛膝。二服疼痛稍減。又用內托黃耆酒煎湯四服。全腫俱消。惟腿外側結腫一塊不退。此瘀血凝滯欲作膿也。用托裏藥。候膿熟針之。再服十全大補湯而歟。

一男子勞碌。過寒每發腿痛。發則寒熱嘔吐。胸痞不食。此因氣惱飲食不節。脾胃受傷。故不能運化。痰滯中腕。溼熱動而下注為腳氣。投以開結導引丸二服。行去停痰。又用半夏佐經湯數服。嘔止膈利。更服附子六物湯數劑。消而不發。

一老人年六旬。過慾腎虛。致筋攣痙縮。腳膝無力。不能步履。外貼追風逐溼膏。內服三因勝駿丸而愈。

一男子右腿腫痛兩月餘。余曰。膿成已久。何不開之。彼曰。二老醫同治。俱稱內消無膿。再請二老決之。俱曰無膿。但病者昏沈不醒。命在危篤。余強開之。出膿盈許。以獨參湯連進二服而甦。後以十全大補湯。調理百日外而安。

一男子房事後受陰寒。大腿無形作痛。至夜尤甚不能步履。醫以散寒除消痰止痛藥治之。其疼益增。余診其脈濇而無力。此氣血不足。寒氣所乘之故。投以大防風湯二劑。疼痛頓減。又四劑而痊。

一男子暑月慾後。當風睡臥。寒氣襲於左腿。遂致腫痛。寒熱交作。胸痞不食。以保安萬靈丹。葱湯化服。洗浴發汗。以散骨寒毒。後以大防風湯。去羌活。加紅花破故紙。溫暖腎經。通行經絡。腫痛漸消。血脈漸和。又以三因勝駿丸間服調理兩月而愈。

一監生慾後受寒。致成腿痛。余以暖腎氣。溫經絡。散寒邪藥治之。彼以為緩請內醫投表散之劑。外邪散而內虛。又以小柴胡湯等藥調理致虛熱發作。口燥咽乾。煩渴不已。又以知母、石膏湯、清其上。防風、木瓜、威靈仙等劑攻其下。致病愈劇。仍請余治。其時患腿愈腫。其形縮小。余斷以必死。此症原屬腎經受寒非附子破故紙不能通達關節非羌活防風牛膝。不能通行閉滯。非人參、白朮、炙甘草。不能使脾氣行達四肢。非川芎、當歸、白芍、熟地、紅花。不能養血活血。凡病從虛而入者。先補其虛。後攻其病。今此病不加溫補。而發散解肌。以正風寒有餘之法治之。不死何待。後果死。

附骨疽主治方

五積散 治風寒溼毒。客於經絡。致筋攣骨痛。或腰腳痠疼。或偏身拘急。或發熱惡寒頭痛者。蒼朮分 陳皮 桔梗 川芎 當歸 白芍錢 麻黃 枳殼 桂心 乾薑 厚朴錢 白芷 半夏 甘草 茯苓錢 水二茶鍾。薑三片。煎八分。不拘時服。頭痛惡寒者。加連鬚葱頭三根。蓋汗爲效。下部加木瓜牛膝。

內托羌活湯 治尻臀患癰。堅硬腫痛。兩尺脈緊數。按之無力。羌活 黃柏 防風 歸尾 本肉桂錢 黃耆五錢 連翹 甘草 蒼朮 陳皮分 紅花分 水酒各一茶鍾。煎八分。食前服。

當歸拈痛湯 治溼熱下注。腿腳生瘡。赤腫作痛。或腰腳痠痛。或下肢偏身重痛。或下部頑麻作癢。或成血風。羌活 當歸 防風 茵陳 蒼朮錢 苦參 升麻 白朮錢 葛根 甘草 黃芩 知母 澤瀉 豬苓 人參錢 黃柏錢 水二茶鍾煎八分。食前服。

內托黃耆湯 治溼熱腿內近膝股患癰。或附骨癰。初起腫痛。此太陽厥陰之分也。脈細而弦按之洪緩有力。黃耆炒 當歸錢 柴胡 木瓜 連翹錢 羌活 肉桂 生地 黃柏分 水酒各一茶鍾。煎一半。空心服。

內托酒煎湯 治寒溼發於腿外側。少陽經分患癰。或附骨癰。堅硬漫腫作痛。或流至足陽明經作腫。黃耆 當歸錢 柴胡錢 連翹 肉桂 升麻 牛蒡子錢 黃柏 甘草分 水酒各一茶鍾。煎一半。食前服。

茯苓佐經湯 治足少陽經爲四氣所乘。以致腰腿發熱疼痛。頭目昏眩嘔吐不食。胸膈不利。心煩熱悶等症。茯苓 陳皮 半夏 白朮 蒼朮錢 藿香 澤瀉 甘草 葛根 柴胡 厚朴 木瓜分 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

附子六物湯 治四氣流注於足太陰經。骨節煩痛。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。手足或時浮腫。附子 甘草錢 防己 白朮 茯苓八錢 桂枝錢 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食遠服。

麻黃佐經湯 治風寒暑溼流注足太陽經。腰足攣痙。關節腫痛。憎寒發熱。無汗惡寒。或自汗惡風。頭痛等症。麻黃 葛根 羌活 防風 蒼朮 茯苓 防己錢 桂心 細辛 甘草錢 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

小續命湯 治寒溼之氣。中於三陽。致身不熱。所患煩疼。或腳轉筋或腫或不腫。或膝腿頑痙。或時緩縱不隨。或偏身百節攣痛。或小腸疝氣攻衝。川芎 白朮 防風 人參 防己 附子角 麻黃錢 桂心 黃

芩白芍錢一錢半 甘草五分 水二茶鍾。煎八分。入薑汁一匙和勻。食前服。又暑中三陰。所患必熱去附子。減桂枝一半。

大防風湯 治三陰之氣不足風邪乘之。兩膝作痛。久則膝愈大而腿愈細。因名曰鶴膝風。乃敗症也。非此方不能治。又治附骨疽。皮色不變。通腫疼痛無奈。及痢後腳痛。緩弱不能行。或腿膝腫痛。人參錢 防風錢 白朮 附子 當歸 白芍 川芎 杜仲 黃耆 羌活 牛膝 甘草 熟地錢 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

檳蘇散 治風溼流注腳腫酸痛。或麻痺不仁。嘔吐不食。檳榔 紫蘇 木香 香附 陳皮 大腹皮錢 木香分 羌活分 水二茶鍾。薑三片。葱白三莖。煎一鍾。空心服。

獨活寄生湯 治肝腎虛弱。風溼內攻。足脛緩縱。或膝痺攀重。獨活錢 茯苓 川芎 當歸 防風 白芍 細辛 人參 桂心 杜仲 秦艽 牛膝 熟地黃耆各 甘草五分 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

神應養真丹 治厥陰經爲四氣所襲腳膝無力。左癱右瘓半身不遂。手足頑麻。言語寒澀。氣血凝滯。偏身疼痛者。當歸 川芎 白芍 天麻 羌活 熟地黃耆 木瓜 莞絲子錢 右爲細末。入地黃膏。加蜜丸如桐子大。每服百丸。空心溫酒鹽湯任下。

三因勝駿丸 治元氣不足。真氣虛弱。及諸虛被寒溼氣侵襲。手足拳攣。腳指連腳而拘急。走注疼痛。筋脉不伸。行步不隨。常服益真氣。壯筋骨。黑鬚髮滑皮膚。一切足弱鶴膝風症並治。附子一枚去皮取肉 當歸 明天麻 牛膝 酸棗仁 熟地黃耆 防風各三錢 木瓜四兩 全蝎一錢 麝香錢 乳香 沒藥 木香 羌活 甘草各五錢 檳榔 草薢 肉蓯蓉 破故紙 巴戟去心 蒼朮各二錢 右爲細末。煉蜜丸桐子大。每服七十丸。空心淡鹽湯溫酒任下。病近者七日。年深者半月見效。

健步丸 治生平好飲燒酒。傷於脾肺。膝中無力。伸不能屈。屈不能伸。膝脊腿腳沈重。行步艱難者。苦參酒洗 防已酒浸 羌活 柴胡 滑石 芍藥 甘草各五錢 防風 內桂錢 澤瀉五錢 川烏酒二兩 右爲細末酒糊爲丸。如桐子大。每服三十九。空心溫酒送下。

大腹子散 治風毒腳氣上攻。寒熱交作。肢節煩疼。心神壅悶。大腹子 紫蘇 木瓜 羌活 荆芥 赤芍 木通 獨活 桑白皮 青皮錢 枳殼錢 甘草二錢 水一茶鍾。薑五片。葱白三莖。煎八分。空心服。

加味敗毒散 治足三陽經溼熱毒氣流注。腳踝掀赤腫痛。寒熱如瘡自

汗惡風。或無汗惡寒。或惡聞飲食者。人參 羌活 獨活 前胡 柴胡 川芎 桔梗 茯苓 枳殼 甘草 木瓜 蒼朮_{等分} 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。便祕加炒大黃。

千里健步散 治遠行兩腳腫痛。若用之。輕便可行千里。甚妙。細辛 防風 白芷 草烏 右等分爲末。繆在鞋底內。如底乾即以水微溼過繆藥著腳。行走自不費力。再不作腫。

雷火神鍼 治風寒溼毒襲於經絡爲患。漫腫無頭。皮色不變筋骨疼痛。起坐艱難不得安臥者。斬艾_錢 丁香_{五分} 麝香_{一分} 丁麝研末。與斬艾揉和。先將夾紙作筒。如指粗大。以艾藥灌入筒內疊實。臨用以蕭山紙七層。平放患上。將筒點著一頭。隔紙捺實針之。待不痛方起針。痛甚者再針一次。七日後火瘡大發。自取功效矣。

追風逐溼膏 治風寒暑溼所傷致骨筋疼痛。筋攣不能步履。或麻木溼痺等症。 簾草 麻黃 川烏 草烏 海風藤 半夏 南星 羌活 麻子_{切碎} 桂枝_兩 獨活 細辛 當歸 白芷 蒼朮 大黃_{等分} 以上藥各切片。用葱汁薑汁各二碗拌藥先浸一宿。次日用香油半觔。先將藥入鍋內慢火煎至葱薑二汁將乾不爆時。方下油與藥相煎。渣枯爲度細絹濾清。每油一觔配飛過炒丹十兩爲準。將前油入鍋內煎滾。至滴水成珠不散。方下黃丹。徐徐攪入。其膏已成。再下碾淨松香淨末一觔四兩同熬化。取下鍋來。將盆頓攪再下乳香木香胡椒輕粉各末二兩。白芥子細末四兩。漸入攪勻。傾入鉢內盛貯。用時熱湯頓化。綾緞攤貼七日後諸病可痊。百發百中。

附骨疽應用方 保安萬靈丹見續門 大全大補湯見續門 小柴胡湯見續門

【探究、按語】


(靈樞、癰疽篇)有“發于股脛、名曰股脛疽，其狀不甚變，而癰膿搏骨，不急治三十日死”之記載。唐「備急千金要方」有更深入之論說。其後宋元明代，亦各有論及，待明，實功將脈因證治作出歸納性結論，主張早期宜消散，已成則溫經通絡，膿成宜瀉，潰後宜補，關節不利者，當滋補氣血之論治法則，較爲中肯而實用。

此症多生臀腿或膝關節附近等處。由體虛之人露臥風冷，浴後乘涼，寒溼侵襲，房後覆蓋單薄，寒邪乘虛入裏，或體虛之人受凍或水浸等等，皆是生發之原因。其症初起只覺臀部或腿部筋骨痠痛，如同風溼痛，或疼痛徹骨，不能屈伸，轉側牽掣，或有身熱等症。繼則見及有形結腫成塊，堅硬附骨，頑木不紅，不熱不紅，日久則轉陰爲陽，化寒爲熱，熱甚則腐而爲膿，久久不歟，初起可用「陽和湯」或「

麻黃左經湯」加減，以溫解寒邪而和散，或以「萬靈丹」及「五積散」加淮牛七，紅花發汗散寒，通行經絡，次以「大防風湯」、「小續命湯」行經活血，祛風滲溼，兼補其虛，又如「獨活寄生湯」、「真人活命飲」等均可選用。此症屬陰寒之候，忌用損脾敗胃，泄氣敗毒等藥，以保體元，總宜化則化之，潰則見膿，身體如常為順，如見日久潰腐，色白腥穢，膿勢不減，元氣日衰，體形縮小，唇乾舌焦，食小難眠，二便枯秘或失禁等者，終為不治，其他如外敷亦忌太寒或過辛熱之藥，以防冷凝或瘀腐而致敗壞。

鶴膝風

此症由驟感風寒溼邪，或因傷而成，初起膝關節痠痛，漸漸腿足不能屈伸，膝部周圍皆腫，但無塊核，或起身熱等證，誤醫或失治，繼則皮色微紅，掀熱光亮，腿形日漸瘦削，形如鶴之膝故名。有乾水兩種，暴發者，常會積水可以抽取，名水鶴膝。緩者無水，稱乾鶴膝。治法以「獨活湯」、「獨活寄生湯」、「健步丸」等選而用之。



卷八

腸癰論第三十四

【原文】

夫腸癰者皆溼熱瘀血流入小腸而成也。又由來有三。男子暴急奔走。以致腸胃傳送不能舒利。敗血濁氣壅遏而成者。一也。婦人產後體虛多臥。未經起坐又或坐草艱難用力太過。膏肓失逐敗瘀。以致停積腸胃而成者。二也。飢飽勞傷擔負重物。致傷脾胃又或酒醉房勞。過傷精力。或生冷並進。以致血氣乖違。溼動痰生。腸胃痞塞。運化不通。氣血凝滯而成者。三也。總之初起外症。發熱惡寒。脉芤而數。皮毛錯縱。腹急漸腫。轉側急痛。大便墜重。小便澀滯若淋。甚者臍突腹脹。轉側水聲。此等並見則內癰已成也。初起未成時。小腹殷殷作痛。儼似奔豚。小便淋漓者當大黃湯下之。瘀血去盡自安。體虛脉細。不敢下者。活血散瘀湯和利之。已成腹中疼痛。脹滿不食。便淋刺痛者。薏苡仁湯主之。腹濡而痛。小便急脹時時下臍者。毒未解也。用牡丹皮湯治之。如臍從臍出。腹脹不除。飲食減少。面白神勞此皆氣血俱虛。宜八珍湯。加牡丹皮 肉桂 黃耆 五味子飲而補之。如日久因循。不識此症。誤作脹痛治之。以致毒攻內臟。腸胃受傷。或致陰器攻爛。腐齧黑斑。色敗無膿每流污水。腹連陰痛。煩躁不止。身熱口乾。衾幘多臭。臥房難進者。俱爲難治宜斟酌之。

腸癰看法

初起小腹疼痛。小便不利。六脉微緩不作寒熱者輕。已成小腹腫而堅硬小便數而不利。六脉洪數者險已潰時時下臍。裏急後重。日夜無度。疼痛不減者重。潰後臍腥臭穢。或流敗水濁瘀虛熱更增不食者死

腸癰治法

初起小腹疼痛。小便或硬脉芤數者瘀血也。宜下之。小腹作痛有塊。大便秘澀。小便如淋者。宜和而利之。已潰時時下臍。腹痛不止。飲食無味者。宜托而補之。產婦惡露不盡。流注小腸作痛。脈數者。宜和而導之。腹脹日久。臍高突出。轉側響如水聲。臍內蓄急針之。

腸癰治驗

一男子小腹脹痛。裏急後重。時時下臘，醫作痢疾治之愈重。余診其脈芤而數。此小腸癰也。投以薏苡仁湯一服下臘升許即不後重。更用牡丹散六服而安。

一幼婦產後月餘腹中漸痛腫脹如鼓內科紛紛認為蠭病。又月餘沉重昏憊。已棄不治，適其家童稚患癰。請余往視。偶言及此。余自請診之。人雖昏憊不甦而脈細數有力余曰。此內癰也尚可治，其家不信余曰。請視其腹。一決生死何如。視之則腫皮緊急光亮。臍下大熱。余曰。確係內癰。治之萬無一失其家乃善。因命先備淨桶，用滾湯半桶，蓋之聽用先以薏苡仁湯加酒炒大黃二錢。徐徐灌服。待腹中作痛扶起患者坐桶上。熱氣薰蒸。其臍下如湧泉連湯與臍。約共半桶。病者即甦。更服八珍湯。加牡丹皮 五味子。調理月餘而安。

一婦人小腹腫痛。小便如淋。診之脈緩而芤。此得之行經時。誤食生冷。又兼惱怒。肝火急迫。瘀血而成內癰，臍尚未能也。以大黃湯下之。瘀血出盡而安。

一婦人小產。瘀血未盡。勞動太早。小腹內外。腫痛月餘。大便秘燥。小便澀滯。口燥咽乾。煩悶不睡。內醫調理。其病日重。余偶往診之。脈數實而有力。謂曰。此腸癰已成也。用薏苡仁湯。加大黃一服下臘數碗。脹痛頓退。外腫堅硬不散。仍作掀痛。此餘臘尚欲外泄也。投以十全大補湯三服。臘脹痛而針之。更服八珍湯。加牡丹皮 五味子。月餘而愈。

一婦人腹脹如鼓。臍突寸許。小水澀滯。轉側腹有水聲。此內臘已成。用針刺臍上突頂。出臘盈許。用牡丹皮散五六劑。其臘漸少。朝以八味丸。暮以八珍湯。加澤瀉 牡丹皮 黃耆 破故紙。服之月餘而愈。

腸癰主治方

大黃湯 治腸癰小腹堅硬。如掌而熱。按之則痛。肉色如故。或掀赤微腫。小便頻數。汗出憎寒。脈緊實而有力。日淺未成臘者。 大黃炒

朴硝蜜 牡丹皮 白芥子 桃仁去皮尖 水二茶鍾。煎八分。食前或空心溫服。

活血散瘀湯 治產後惡露不盡。或經後瘀血作痛。或暴急奔走。或男子杖後瘀血流注。腸胃作痛。漸成內癰及腹痛大便燥者。 川芎 歸尾 赤芍 蘇木 枳壳 牡丹皮 瓜蔞仁蜜 桃仁去皮尖 檳榔炒 大黃酒炒 水二茶鍾。煎八分。空心服渣再煎服。

牡丹皮散 治腸癰腹濡而痛。以手重按之則止。或時時下臘 人參

牡丹皮 白芍 茯苓 黃耆 薏苡仁 桃仁 白芷 當歸 川芎 甘草 官桂五分 木香三分 水二茶鍾。煎八分。食前服。

七賢散 治腸癰潰後疼痛淋瀝不已。或精神減少。飲食無味。面色萎黃。四肢無力。自汗盜汗。臥睡不安 茯苓 山藥 牡丹皮 山茱萸 熟地 人參一錢 黃耆三錢 水二茶鍾。煨姜三片。大棗二枚。煎八分。食前服。

失笑散 治產後心腹絞痛欲死。或血迷心竅。不省人事。及尋常腹內瘀血。或積血作痛。又婦人血氣爲病。作痛之聖藥也及治男子諸疝疼痛不已者。 五靈脂 蒲黃俱炒 右爲細末。每服三錢。醋一合調稠。熬數滾。入水一茶鍾。煎七分。食前連藥服。如用醋爲丸。每服二錢。淡醋湯下。治前症亦妙。

排膿散 治腸癰小腹脹痛。脈滑數。裏急後重。時時下膿。 黃耆 當歸 金銀花 白芷 穿山甲 防風 川芎 瓜蔞仁一錢 水二茶鍾。煎八分。食前服。或爲末。每服二三錢。食遠蜜湯調下亦可。

瓜蔞子湯 治產後惡露不盡。或經後瘀血停滯。腸胃作痛。縱非是癰。服之亦效。薏苡仁 桃仁 牡丹皮 瓜蔞仁一錢 水二鍾。煎八分。食前空心服。

薏苡仁湯 治腸癰腹中疼痛。或脹滿不食。小便澀滯。婦人產後多有此病。縱非癰。服之多效。薏苡仁 瓜蔞仁一錢 牡丹皮 桃仁去尖 白芍 水二茶鍾。煎八分。空心服。

腸癰應用方 八珍湯 十全大補湯 八味丸俱見濟產門

【探究、按語】

腸癰之名首見（素問・厥論）。東漢「金匱要略」作出辨證及治法、所立「薏苡附子敗醬散」及「大黃牡丹皮湯」兩方，至今仍在沿用。隋「諸病源侯論」腸癰候中首先論及病因。實功對此症之起因、證候、治法等有較精辟之論述。

起因多由溼熱氣滯凝結、或暴急奔走，努力瘀血，或產後敗瘀蓄積，流注腸中而成，或由膏粱原味，飲食不節，糟粕積滯，生濕生熱，留爲敗瘀，積于腸道而成，或感寒而氣血凝滯，以致腸胃傳送失利，氣道壅塞，化熱成癰。起必右少腹痛，或固定壓痛，或先胃痛，數小時後轉至右腹，或見身熱惡風自汗，身倦頭痛，身皮甲錯，大便不爽，小便澀滯，脈遲而緊，此時癰膿未成，宜「大黃湯」下之，若小便閉滯，加琥珀末，木通利之。若身皮甲錯，內無積聚，腹急腹痛，身無熱而脈數者，係腸內陰冷，宜「薏苡附子散」主之。若脈見洪數，肚臍高突，腹痛脹滿不脹者，宜「丹皮湯」治之。如膿從臍出，腹脹不除，飲食減少，面白神勞，屬氣

血俱虛，宜「八珍湯」加丹皮、肉桂、黃耆、五味等飲而補之。

此症雖急，但如極早處理，治法恰當，痊愈亦快，在十二到二十四小時內，無惡化加重者，大都不必手術切除。

臟毒論第三十五

【原文】

夫臟毒者醇酒厚味。勤勞辛苦。蘊毒流注肛門。結成腫塊。其病有內外之別。虛實之殊。發於外者。多實多熱。脈數有力。肛門突腫。大便秘結。肚腹不寬。小水不利。甚者肛門肉泛如瘤。孔頭緊閉。此爲外發。屬陽易治。宜四順清涼飲。內消沃雪湯。通利大小二便。痛甚者珍珠散。人中白散搽之。膿脹痛者針之。發於內者屬陰虛。溼熱滲入肛門。內臟結腫。刺痛如錐。小便淋瀝。大便虛秘。咳嗽生痰。脈數虛細。寒熱往來。遇夜尤甚。此爲內發。屬陰難治。宜四物湯。加黃柏 知母 天花粉 甘草。兼以六味地黃丸調治。候內臟膜出則安。又有生平情性暴急。縱食膏梁。或兼補術。蘊毒結于臟腑。火熱流注于肛門。結而爲腫。其患痛連小腹。肛門墜腫。二便乖違。或瀉或秘。肛門內蝕。串爛經絡。污水流通大孔。飲食不食。作渴之甚。犯此未有見其生者。又有虛勞久嗽。痰火結腫。肛門如粟者。破必成漏。瀝盡氣血必亡。此二症。乃內傷之故。非藥可療。不必強治也。

臟毒看法

初起腫痛。紅色光亮。疼痛有時。肛門不墜。便和者順。已成掀赤腫痛。發熱不渴。小便不數。展轉自便者順。已潰膿稠。色鮮不臭掀腫漸消。疼痛漸減。能食者順。潰後膿水漸止。新肉易生。不疼多癢。瘡口易乾者順。初起堅硬漫腫。內臟閉痛。小便頻數。大便秘結者險。已成疼痛日甚。腫連小腹。肛門閉緊。下氣下通者重。已潰臭水淋漓。疼痛不減。腫仍不消。身熱唇焦者逆。

臟毒治法

初起寒熱交作。大便墜痛。脈浮數者。宜用輕劑解散。已成內熱口乾。大便秘結。脉沈實而有力者。當下之。肛門腫痛。常欲便而下墜作痛者。導溼熱。兼瀉邪火。肛門掀腫疼痛。小便澀滯。小腹急脹者。清肝理小

水。出膿腥臭。疼痛不減。身熱者。養健脾胃。更兼滲溼。膿水清稀。脾胃虛弱。不能收斂者。滋腎氣。補脾胃。

臟毒治驗

一男子肛門腫突紅紫。痛甚。投以內消沃雪湯二服。大便數次。疼痛稍減。腫突處以珍珠散清蜜調搽。早晚二次。其腫漸消。更以涼血地黃湯服之全愈。

一婦人產後用力太過。肛門墜腫。疼痛之甚。先以枳殼紫蘇煎湯薰洗。後以珍珠散。加冰片豬脊髓調搽。內以四物湯。加升麻 蒼朮 丹皮 枳殼。服之而消。

一男子夏月。好飲火酒。熱毒流入肛門結腫堅硬。形色紫黑。墜痛便祕。用黃連解毒湯。加大黃 枳殼二劑。便通。疼痛稍止。又用四物湯。合前湯數劑。其腫漸消。惟存栗大堅腫不消。以臟連丸服至月餘而愈。

一婦人肛門腫突。堅硬痛極。用攻利解毒藥。俱不應。以神燈照法照之。早晚兩次。其痛方減。以蟾酥錠磨濃塗之。堅硬漸腐爲膿。仍服內消沃雪湯二劑。便通。痛苦減其大半。內服四物湯。加黃柏 知母 厚朴 蒼朮。外以珍珠散。加冰片豬髓調搽。月餘而平。

一男子素有內痔。便血。常欲脫肛。一朝肛門墜重不收。腫痛突起。光亮紫色。此溼熱流注結腫。故難收入。內服黃連除溼湯一劑。外用珍珠散。加冰片清蜜調塗。腫痛漸減。後以補中益氣湯。加生地 黃連 蒼朮 花粉 丹皮。服至數劑漸平。

一監生素性急暴。每縱膏梁。積毒流于大腸。內如針刺。外肛不腫。常欲後重。便則秘結。診之脈空數而無力。此真氣不足。邪火有餘內臟虧損症也。辭以不治。請他他醫用藥。月餘肛門內腐。敗水無禁。復請余視。余曰。決不可療。脈來虛數。邪勝正也。手掌不澤。脾氣敗也。至夜發熱。陰虛火旺。敗水無禁。幽門已壞。面若塗脂。元氣走散。鼻如烟媒。肺氣將絕。口乾舌燥。腎水已竭。豈有不死之理。他醫仍強用毒藥。滋陰藥。不效而死。

臟毒主治方

黃連除溼湯 治臟毒初起。溼熱流注肛門。結腫疼痛。小水不利。大便秘結。身熱口乾。脈數有力。或裏急後重。 黃連 黃芩 川芎 當歸 防風 蒼朮 厚朴 枳殼 連翹甘草 大黃 朴硝 水二茶鍾。煎八分。空心服。

涼血地黃湯 治臘毒已成未成。或腫或不腫。肛門疼痛。大便墜重。或泄或秘。常時便血頭暈眼花腰膝無力者。 川芎 當歸 白芍 生地 白朮 茯苓見門 黃連 地榆 人參 山梔 天花粉 甘草見五 水二茶鍾。煎八分。食前服。

內托黃耆散 治臘毒已成。紅色光亮。已欲作膿。不必內消。宜服此藥潰膿。 川芎 當歸 陳皮 白朮 黃耆 白芍 穿山甲 皂角針見門 槟榔見門 水二茶鍾。煎八分。食前服。

黃連解毒湯 治平生好飲。縱食膏梁。積熱流入大腸。致肛門紅成腫痛。疼刺如鑽。堅硬如石。

金液戊土膏 治口腹習于奢侈。情性慣于急暴。烈火猖狂。思不如願。水已枯竭。火不發泄。旺而又鬱。鬱而又旺。以致肛門結腫毒攻內。臟痛如芒刺。熾如火坑。臭水淋漓。生命難望。宜服此藥。

珍珠散 治肛門腫泛如瘤。紅紫急脹。堅硬痛極。本方加冰片研極細。豬脊髓調塗。早晚日用二次。

臘毒應用方 六味地黃丸見肺門 四順清涼飲見瀉門 內消沃雪湯 神燈照法 四物湯 蠕酥錠俱見膏門 補中益氣湯俱見門 人中白散 珍珠散俱見下 臘連丸見膏門

【探究、按語】

凡生於肛門直腸周圍之化膿性腫瘍，俱紅，腫、熱、痛者，稱癰，如肛門癰、盤肛癰等，古稱臘毒，或稱懸癰、海底漏。偷糞鼠等，名稱繁多，但病因證治大都相仿，因發病部位肌肉組織特殊，如體虛者，潰後每不易收口而成漏管。

起因不外膏梁厚味，燙灸熱毒，負重勞碌，體虛虧損，溼熱壅滯而成。初生腫似蓮、棗、紅腫熱痛、實症成膿較快。尙未成膿時「黃連解毒湯」或「醒消丸」。日漸長大兼有小水澀滯者宜「九龍丹」或「龍膽瀉肝湯」利溼祛熱。如只胸發熱者「小柴胡湯」去人參半夏加黃柏川芎當歸甘草等清解。外用「如意金黃散」合「太乙紫金錠」調敷。體虛者腫痛不顯，成膿亦慢，「仙方活命飲」去角刺。若不消而膿未成時「托裏消毒散」或「透膿湯」。膿成宜適時開刀排膿。潰後外用拔膿生肌。若延久不歛而現虛象者補之「六味地黃丸」加當歸白芍、「十全大補湯」加丹皮澤瀉、脾虛食少者「六君子湯」或「補中益氣湯」。外用「八寶生肌丹」。變爲瘡瘍者亦復不少，則又須與肺同治矣。

【原文】

夫痔者。乃素積溼熱過食炙博。或因久坐而血脈下行。又因七情而過傷生冷。以及擔輕負重。竭力遠行。氣血縱橫。經絡交錯。又或酒色過度。腸胃受傷。以致濁氣瘀血。流注肛門。俱能發痔。不論老幼男女皆然。有生於肛門之內。有突于肛門之旁。大者若蓮花蜂窠鱗花雞冠菱角珊瑚等狀。小者如櫻珠鼠尾牛奶雞心核桃蜆肉之形。毒深者。其形異而頑惡。毒淺者。其形正而平常。久則崩潰成漏。新則墜重刺痛。甚者糞從孔出。血從竅流。氣血日有所傷。形容漸有所削。若不早治。終至傷人。尋常多用針刀。砒硝線墨等治法。患者受之苦楚。聞此因循。都不醫治。予療此症。藥味數品。從火煅煉性即純和。百試百驗。凡療內痔者。先用通利藥。湯滌臟腑。然後用喚痔散。塗入肛門。片時。內痔自然泛出。即用葱湯洗淨。搽枯痔散。早午晚每日三次每次溫湯洗淨搽藥。輕者七日。重者十一日。其痔自然枯黑乾硬。痔邊裂縫流膿。停止枯藥。換用起痔湯。日洗一次。待痔落之後。換搽生肌散。或鳳雛膏等藥。生肌飲口。虛者兼服補藥。其口半月可完。外痔用消毒散煎洗。隨用枯痔散。照內痔搽法用之。完口百日。入房乃吉。至於穿腸久漏者。此則另有二方。亦具於後。患者服之。不用針刀挂線。效如拾芥。

痔瘡看法

初起形如牛奶。不腫不紅無掀無痛。行走不覺者輕。已成腫痛。有時遇勞而發。或軟或硬。頭出黃水者輕。久如雞冠蜂窠蓮花鱗花等狀。流膿出血不止者重。久漏竅通臀腿。膿水淋漓。疼痛不已。糞從孔出者逆。

痔瘡治法

初起及已成漸漸大。而便澀作痛者。宜潤燥及滋陰。肛門下墜。大便出血。時或疼痛堅硬者。宜清火滲溼。紫色疼痛。大便虛秘。兼作癢者。涼血祛風疏利溼熱。腫痛堅硬。後重墜刺。便出難者。外宜熏洗。內當宣利。內痔出血。登廁脫肛。而難上收者。當健脾升舉中氣。便前便後下血。面色萎黃。心忪耳鳴者。宜養血健脾。諸痔欲斷其根。必須枯藥。欲完其竅。必杜房勞。乃愈。

痔瘡治驗

一男子患痔六年。每遇酒色房勞。痔則發腫。堅硬疼痛。十餘日方得稍可。彼欲斷其根。以枯痔散敷上。至七日外。其痔漸黑裂縫。至十六日。痔枯脫落。孔若雞心。以生肌散逐日用之。內服養血健脾藥而愈。

一男子患痔。掀腫作痛。大便急燥。脈數有力。投以內疏黃連湯二服。便行痛止。又服四物湯。加芩連枳殼花粉。數劑而腫消。更服臟連丸一料。而不復發。

一男子患痔。遇勞則發腫而痛。以枳殼湯熏洗。內服防風秦艽湯數劑。腫痛俱減。令彼煎湯常洗。每日五六次。又以六味地黃丸。加黃柏知母。服之不發。

一男子好飲多欲。內痔虛墜下血服四物湯。加芩連升麻葛根數服。虛墜乃止。又服當歸郁李仁湯二劑。痔腫亦消更服臟連丸月餘便血亦止。兼節酒色。逐不發。大抵醉飽入房。經脈橫解。精氣一泄。脈絡必虛。酒食之毒。乘虛流結。或淫極強固精氣以致敗精濁血。遂傳大腸。又或飲食厚味。燥溼流注。俱成斯疾。所受病者。燥氣也。爲病者。溼氣也。初宜瀉火和血。潤燥疏風。久宜養血滋陰健脾滲溼自愈。若不節酒色。不慎起居。不戒口味。破必成漏。久則穿腸串脣。穢從孔出。臭水淋漓。雖不傷生。每苦瘀汗。可爲歎息。

一男子患痔十餘年。頭已穿潰。未至通腸。每發疼痛。以三品一條槍。插至七日。痔變黑色。瘡邊漸漸裂縫。至十五日脫落。以鳳雛膏搽至半月。口歛而平。

一男子怯弱。內痔便血。面色萎黃。自服涼血止血藥不應。診之脾脈虛而無力。此中氣不足。不能統血。服補中益氣湯十餘劑。精神頓倍便血亦止。又以加味四君子湯。兼前湯間服月餘。不發。大約此症所致之由不同。當究其因治之。如元氣有餘。形黑氣盛。先糞而後紫血。更兼脈實有力者。此屬有餘。用涼血止血藥自效。至若形體瘦弱。面色萎黃。先鮮血而後糞。更兼脈虛無力者。此屬不足。豈可反用涼藥止之。致傷脾胃。此人脈症。若不溫中健脾。升舉中氣。則其血不得歸原。安能取效。

痔瘡主治方

防風秦艽湯 治痔瘡不論新久。肛門便血。墜重作疼者。 防風 秦艽 當歸 川芎 生地 白芍 赤茯苓 連翹
蜜 檳榔 甘草 梔子 地榆 枳殼 槐角 白芷 蒼朮
蜜 水二茶鍾。煎八分。食前服。便秘者。加大黃二錢。

提肛散 治氣虛肛門下墜。及脫肛便血。脾胃虛弱等症。 川芎 歸身 白朮 人參 黃耆 陳皮 甘草
蜜 升麻 柴胡 黃芩 黃連 白芷
蜜 水二茶鍾。煎八分。食遠服。

加味四君子湯 治痔瘡痔漏。下血不止。面色萎黃。心忪耳鳴。腳弱氣乏及一切脾虛口淡。食不知味。又治中氣虛不能攝血。致便血不禁者。
人參 白朮 白扁豆 茯苓 黃耆_{各一錢} 甘草_{半錢} 水二茶鍾。薑一片。棗二枚。煎八分。食前服。

當歸郁李湯 治痔大便結燥。大腸下墜出血。苦痛不能忍者。當歸 郁李仁 澤瀉 生地 大黃 枳實 蒼朮 秦艽_{一錢} 火麻仁_{五分} 皂角_{半錢} 水二茶鍾。煎八分。空心服。

芎歸湯 治便血或失血過多。兼婦人產後。血虛煩熱。頭眩昏暈。盜汗等症。
川芎_{三錢} 當歸_{五錢} 水二茶鍾。煎八分。食前服。自汗手足冷者。加人參二錢。

三黃二地湯 治腸風諸痔。便血不止及面色萎黃四肢無力。
生地 熟地_{各二錢} 蒼朮 厚朴 陳皮 黃連 黃柏 黃芩 歸身 白朮 人參_{各一錢} 甘草 防風 澤瀉 地榆_{六錢} 烏梅_{三錢} 水二茶鍾。煎八分。食前服。

粟殼散 治諸痔作疼及腸風下血諸藥不止者。
粟殼泡去內殼去壳 當歸 陳皮 秦艽 黃耆 生地 熟地_{一錢} 黃柏 黃芩 蒼朮 人參 厚朴 升麻_{六錢} 荷葉蒂_錢 甘草_{五錢} 地骨皮_{三錢} 水二茶鍾。煎八分。食前服。或爲細末。每服二錢。空心溫酒調服。

洗痔枳殼湯 治痔瘡腫痛。肛門下墜。無論新久。洗之腫自消。
枳殼_{一兩} 癩蝦蟆草_{一名荔枝有面青背白麻效} 河水三大盆。同上二味。煎數滾先薰後洗。良久。再將湯煎熱薰洗。甚者三次即消。洗淨當搽後藥。

五倍子散 治諸痔舉發堅硬。疼痛難忍或膿毒肛門泛出。腫硬不收。
五倍子大者敲一小孔。用陰乾癩蝦蟆草揉碎。填塞五倍子內。用紙塞孔。溼紙包煨。片時許取出待冷去紙。研爲細末每一錢加輕粉三錢。冰片五厘。共研極細。待前湯洗後。用此乾搽痔上。即睡勿動。其腫即除。凡外痔用二方搽洗。亦可除根。永不再發極效極效。

田螺水 治痔瘡堅硬作痛。及脫肛腫泛不收者。以大田螺一枚。用大冰片五厘。研末用尖刀挑起螺蓋。將冰片入內。平放片時。待螺滲出漿水。用雞翎蘸搽患上。勤勤搽之。其腫痛自然消散。

喚痔散 凡醫內痔不得出。用此藥填入肛門。其痔即出。
草烏_{半錢} 刺蝟皮_{一錢} 枯礬_{五錢} 食鹽_{炒三錢} 麝香_{三分} 冰片_{三分} 右研細末洗用。溫湯洗淨肛門。隨用津唾調藥。填入肛門片時。痔即當出去藥上護痔膏。

護痔膏 用喚痔散。痔出之後先用此藥圍護四邊好肉。白芨 石膏

黃連一錢 冰片 一錢 麝香一分 共研細末。雞蛋清調成膏。護在四邊好肉。方上枯痔散。

枯痔散 凡痔瘡泛出。即用此藥塗之。年淺者五七日。年深者八九日。待痔乾黑後。不用此藥。每日用落痔湯洗之。白麝一錢 蟾酥三分 輕粉一錢 砒霜二錢 天靈蓋 共研極細末入小新鐵鍋內。上用粗磁盃密蓋鹽泥封固。炭火煅至二炷京香。待冷取開。將藥研末搽痔上。每日辰午申三時。用溫湯洗淨。上藥三次。上至七八日。其痔枯堅硬。住藥裂縫。待其自落。換洗起痔湯。

起痔湯 治諸痔上枯藥之後黑色堅硬裂縫。宜此藥洗。黃蓮 黃柏 黃芩 大黃 防風 荆芥 梔子 槐角 苦參 甘草一錢 朴硝五錢 以上藥分三次。用水煎洗。待痔落之後。換搽生肌散。

生肌散 治痔上枯藥之後脫落。孔竅不收者。宜用此粉。乳香 没藥一錢 海螵蛸五錢 黃丹四錢 赤石脂七錢 龍骨四錢 血竭三錢 熊膽四錢 輕粉五錢 冰片二錢 麝香八錢 珍珠炒二錢 共研極細末。磁罐收貯早晚日二次。蓋膏漸斂而平。

洗痔腫痛方 魚腥草 苦棟根 朴硝 馬齒莧 瓦松花一錢 水五大盃煎三盃。先熏後洗。諸痔腫痛可消。

人中白散一錢 治諸痔腫痛堅硬。墜重脫肛等症。先用溫湯洗淨。隨後搽藥。即臥勿動。其腫痛漸減。

三品一條槍見瘻瘍門 治十八種痔漏。用藥線插入痔孔內。早晚二次。初時。每次插藥三條。四日後。每次插藥五六條。至七八日。藥力滿足。痔變紫黑方住插藥。候痔四邊。裂縫流膿至十四日期滿痔落。用甘草湯洗淨。換搽鳳離膏。或玉紅膏。俱可生肌收斂。虛弱者。兼服養血健脾之藥。

生肌鳳離膏 用雞蛋煮熟去白。用黃十餘個。銅杓內熬油。傾入盞內。約油三錢。加輕粉細末一錢。乳香血竭龍骨末各五分。共入油內和勻。每日早午晚雞翎蘸入孔內。膏蓋避風。深者半月可以完口。

煮線方 治諸痔及五癰五瘤。凡蒂小而頭面大者。用此線纏繫其根。花五錢 壁錢三錢 用白色細扣線三錢同上二味。用水一碗。盛貯小磁罐內。慢火煮至湯乾爲度。取線陰乾。凡遇前患用線一根。患大者二根。變扣繫於根蒂。兩頭留線。日漸緊之。自然紫黑。冰冷不熟。輕者七日重者十五日後必枯落。後用於珍珠散收口。至妙。

臟連丸 治痔無論新久。但舉發便血作痛。肛門墜重者。黃連淨末八

兩。用公豬大臍盡頭一段。長一尺二寸。溫湯洗淨。將黃連末灌入臍內。兩頭以線扎緊。用生酒二斤半。砂鍋內煮酒將乾爲度。取起臍藥。共搗如泥。如藥爛。再晒一時許復搗。丸如桐子大。每服七十九。空心溫酒送下。久服除根。

胡連追毒丸 治痔漏不拘遠年近日。有漏通腸。污從孔出者。先用此丸追盡毒膜。服後丸藥自然取效。最穩。胡黃連一兩切片
姜汁拌炒 刺皮二錢炙切片
再炒黃爲末 麝香三分 軟飯爲丸麻子丸。每服一錢。食前酒下。服藥後膜水反多。是藥力到也。勿懼。

胡連閉管丸 胡黃連一兩 穿山甲鱗肉去骨 石決明煅 槐花微炒各半錢 煉蜜丸如麻子大。每服一錢。空心清米湯送下。早晚進二服。至重者四十日而愈。此方不用鍼刀挂線。不受苦楚。誠起痼疾之良方也。如漏之四邊有硬肉突起者。加蠶繭二十個炒末。和入藥中。凡偏身諸漏亦效。

痔瘡應用方 內疎黃連湯鷄血 補中益氣湯 四物湯俱見清門 六味地黃丸

見筋
瘡門

【探究、按語】

痔者峙也，突出之意。痔之病名治法，在先秦文獻中已有記載。漢「全匱要略，五臟風寒積聚病脈證并治」有“有熱者必痔”之記述。隋「諸病源候論，痔病候」將痔分爲五種。唐「備急千金要方」首載“薰洗法”。“千金翼方”用含硯訊石之“膏”治療內痔，今之枯痔散即由此而來。「外台秘要，諸痔方」總結前人經驗，首先提及“內痔”將痔分爲內痔外痔兩種。金元「丹溪心法」主“痔瘡專以涼血爲主或以解熱調血順氣先之”。實功論痔瘡篇，除詳述治痔諸法外，強調“諸痔欲斷其根，必須枯藥”之論述，是承前人之基礎後所發展之創新，方法雖簡，要點俱備，至今仍爲臨床借鑑。

起因多由久坐少動，飽食用力，大便失常，食物刺激，妊娠生產，生活失常，溼熱下注等，以致氣血縱橫，經絡交錯，濁流鬱積而成。內痔初起時只覺肛門有物阻塞不舒，又似大便未盡然者，即屬患痔之徵兆，久則便後刺痛或見鮮血，便結或用力時坐者常噴射而出，出血時反無痛苦，日久而嚴重者，痔核常隨大便脫出肛外，年久者常因勞力咳嗽遠走時脫肛痔垂。外痔則生於肛門周圍，及目即見。治療時必先求證，除見血者外，必將肛門翻開察看或以手指塗油伸入探觸，或用吸筒吸之。如見血而疼痛者，必屬肛門破裂，禁用枯藥，夫痔血必無痛楚，如不痛而且色深紅或紫黑者屬便血。初起可服「消痔止痛方」。若久瀉久痢，時時脫肛者「補中槐莢湯」。便秘潮熱者「清涼飲」。如產後用力太過而生者，宜「活血補中湯」。

飽食久坐者「三神丸」。流血過多「川歸止血丸」。如內服無效而且多，不時發作，即必用枯痔法將之枯落，始可一勞永逸。但枯痔之先，必確定屬痔無誤始可。

敷用「枯痔散」時，先用「護痔膏」塗佈四邊好肉，然後將枯藥乾摻或油調敷上，一日一二換，換時先將前藥溫水洗淨，枯至三四日，如有燒灼或疼痛可加「解毒膏」敷于周圍。約過六七天，痔核即由紫色變為黑色。乾枯變硬，即換敷「脫痔膏」即易脫落。枯落後改用「珍珠散」生肌收口，兼用溫水浸洗進佐滋養，即可告痊。初起時外敷亦可收效尤以外痔。如「清涼露」「田螺水」「五倍散」「消腫膏」等，配服「臟連丸」亦效。總之除手術枯脫外，見血者先止其血，便秘或燥者先通或潤，腸熱者清腸，溼多者利溼，體虛者補益，隨證應變，惟久咳癆嗽者患痔，往往不易杜根。

下疳論第三十七

【原文】

下疳者。邪淫慾火鬱滯而成。其來有三。一由男子慾念萌動。陽物興舉。淫火猖狂。而未經發泄。以致敗精濁血。流滯中途。結而爲腫。初起必小便澀淋作痛。次流黃濁敗精。陽物漸損。甚則腫痛腐爛。法當疏利肝腎邪火。如八正散清肝導滯湯之類是也。二由婦人陰器。瘀精濁氣未淨。便與交媾。以致淫精傳襲而生。初起皮腫光亮。甚如水晶。皮破流水。腫痛日生。癢麻時發。治當解毒消風龍膽瀉肝湯。兼平胃散合而用之。三由房術熱藥。塗抹玉莖。洗搽陰器。興陽助火。煽動陰精。僥倖不衰。久頓不泄。以致火鬱未發而成。初起陽物癢痛。堅硬紫色。疙瘩漸生。腐爛漸作。血水淋漓。不時興舉。治當瀉火解毒。如黃連解毒湯蘆薈丸之類是也。外治之法。皆以銀粉散珍珠散人中白散選用。又有先發時瘡。誤用薰條擦藥結毒於此者。詳註結毒門。

下疳看法

初起不紅不腫。睡不舉陽。玉莖微損。小水自利者輕。已成微熱微腫。皮色光亮。小便赤色。更兼白濁者平。已損肉色紅活。掀無堅腫小便不疼。大便不秘者順。初起小便淋漓。次損陽物。堅硬作疼。腐爛漸開者險。已成腐潰內攻。傷損玉莖。色紫無膿。疼如鍼刺者重。

下疳治法

初起腫痛發熱。小水澀滯肝經溼熱也。宜瀉肝滲溼。腫痛堅硬。掀發寒熱。口燥咽乾。大便秘者。通利二便。玉莖腫痛。小便如淋自汗盜汗。時或尿血者。清心滋腎。莖竅作癢。時出白濁。發熱口乾津液少者。益腎清心。潰後腫痛。小便赤澀。日則安靜。夜則疼甚者。滋陰瀉火。潰爛不已。腫硬又作疼痛日深。穢氣不回者。清肝解毒。

下疳治驗

一童子十五歲。玉莖腫痛。外皮浮腫。粗大一倍。他醫治之。以解毒清肝等藥。愈腫愈痛。予用瀉火清熱滲溼等劑。亦不見效。診其脉細數而無力。知爲中氣不足。脾經溼水乘虛流注。停聚不散。當行從治法也。用四物湯。合平胃散。加木香熟附子人參各五分。一服腫痛頓退。四五服而全消。

一男子腫痛發寒熱。用荆防敗毒散。二服而退。又服龍膽瀉肝湯腫痛亦減。更服四物湯。加黃柏知母而消。

一男子年四十。色慾過度。小便澀痛。出如白漿結煉成塊此腎經溼熱爲患。朝以八味丸。午用八珍湯。加山萸牡丹皮黃柏知母服之。月餘而澀腫退。小便漸清。但竅中常有滑精不時滲出久致腰痙腳膝無力。偶用三因勝駿丸。服月餘。前症悉愈。

一男子莖頭腐爛。小水澀痛。外繆珍珠散。內服木通湯四劑。澀痛漸止。更服四物湯。加黃柏花粉而痊。

一男子初婚。玉莖損傷。出血疼甚。先以葱湯浸洗良久。隨用珍珠散。加冰片繆之。腐皮漸乾。痛亦漸止。內服四物湯。加木通山梔四劑而愈。

一男子皮腫光亮。發熱疼甚外敷如意金黃散。內服龍膽瀉肝湯。加大黃便痛稍愈。去大黃再服而消。

下疳主治方

清肝導滯湯 治肝經溼熱。玉莖腫痛。小水澀滯作疼者。 扁蓄
瞿麥_錢 滑石_錢 甘草_錢 大黃_錢 水二茶鍾心二十根煎八分。空心服。

龍膽瀉肝湯 治肝經溼熱。玉莖患瘡。或便毒懸癰。小便赤澀。或久潰爛不愈。又治陰囊腫痛。紅熱甚者。 龍膽草 連翹 生地黃 澤瀉_錢
車前子 木通 歸尾 山梔 甘草 黃連 黃芩_錢 大黃_{錢加} 水二茶鍾。
煎八分。食前服。

清肝滲溼湯 治陰囊玉莖溼腫如豬肚。小水不利。墜重作痛。 蒼朮 白朮 茵苓 山梔 厚朴 澤瀉 陳皮 木通 天花 昆布_錢 甘草

五分 木香三分 川芎 將歸六分 作熱紅色。加黃連、龍膽草七分 水二茶鍾。煎八分。空心服。

清心蓮子飲 治心經蘊熱。小便赤澀。玉莖腫痛。或莖竅作疼。及上盛下虛。心火炎上。口苦咽乾。煩躁作渴。或虛陽口乾。小便白濁。夜則安靜。晝則發熱者。石蓮肉 黃耆 黃芩 赤茯苓 人參一錢 炙甘草 澤瀉 麥門冬 地骨皮五分 水二茶鍾煎八分。空心併食前服。

八正散 治肝經積熱小便淋閉不通。及一切淋病。大黃 車前子 瞿麥 扁蓄 山梔 木通 甘草一錢 滑石錢 水二茶鍾。煎八分。食前服。

解毒木通湯 治男婦房術熱藥所傷。致玉莖陰戶癢痛。小水澀滯白濁滑精。至夜陽物興舉。不得眠者。木通 黃連 龍膽草 瞿麥 滑石 山梔 黃柏 知母一錢 蘆薈 甘草五分 水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。食前服。

蘆薈丸 治下疳潰爛作痛。又治婦人陰蝕瘡作癢。及小兒疳積發熱。口鼻生瘡。牙齦蝕爛等病。胡黃連 黃連 蘆薈 白蕪荑 青皮 白雷丸 鶴虱草一錢 露香錢 木香三分 右爲末。蒸餅糊丸如麻子大。每服一錢。空心清米湯送下。

銀粉散 治下疳無論新久。但腐爛作痛。及楊梅瘡薰後結毒。玉莖腐爛。或陽物半傷半全者。好錫六錢化開。下硃砂末二錢。攬炒砂枯。去砂留錫。再化開。投水銀一兩和勻。傾出聽用。杭粉一兩。研細鋪夾紙上。捲成一條。一頭點火。煨至紙盡爲度。吹去灰用粉與汞錫同煎。加真輕粉一兩。共成一家研細。凡遇前患。先用甘草湯淋洗涸乾。隨用此藥擦上。此痛生肌收斂妙。

珍珠散 治下疳皮損腐爛痛極難忍。及諸瘡新肉已滿。不能生皮。又湯潑火燒。皮損肉爛。疼痛不止者。青缸花五分如無用頭刀鮮花替處
色者代之終不及缸花爲妙 珍珠

一錢大小以新白爲上入豆
蕊內煮數滾研至極細末方用 真輕粉一錢 右三味共研千轉。細如飛麵。方入罐收。凡下疳初起。皮損搽之即愈。腐爛疼痛者。甘草湯洗淨。豬脊髓調搽。如諸瘡不生皮者。用此乾膠。即可生皮。又婦人陰蝕痛。或新嫁內傷痛甚者。亦可搽此極效。湯潑火燒痛甚者。用玉紅膏調搽之。

疳瘡簡便方 用油透羅緞舊帽沿燒炭。杭粉瓦上煅黃色。各等分。共研極細。磁罐收貯。先用紅棗十五枚。甘草三錢煎湯。溫洗患上。涸乾。搽藥即效。

太乙膏見門 治莖皮損。疼痛不止者。用此貼之。其疼即止。

下瘡應用方 四物湯 八味丸 八珍湯俱見瘡門 三因勝駿丸見附骨瘡門

【探究、按語】

古稱精瘡，又名疳瘡，生下體“前後陰”，多由冶游而得，習稱花柳病，常在染毒後不到一月發病，初起紅斑或紅疹、無痛、繼則腫起，觸之堅硬，漸漸腐爛。如兼有小便淋濁澀痛者「八正散」「清肝導滯湯」主之。如癢痛紅斑、色紫腐爛者「黃連解毒湯」「蘆薈丸」選用。重則皮腫紅亮，破流腥水疼痛日增時「龍膽瀉肝湯」「二子消毒散」。外用大豆甘草湯洗，破爛時以「鳳衣散」「旱螺散」「珍珠散」「回春脫疳散」敷之。

魚口便毒論第三十八

【原文】

夫魚便者。左爲魚口。右爲便毒。總皆精血交錯。兩胯合縫之間。結腫是也。小腹之下。陰毛之旁結腫。名曰橫痃。又名外疝是也。得之入房。忍精強固不洩。或慾念已萌。停而不遂。以致精血走動凝滯。結而爲腫。治當散滯行瘀。通利大小二便。九龍丹山甲內消散是也。七日以後服之。根本堅固恐其作膿。宜用火鍼法刺之亦妙。已出膿者。服十全大補湯。庶易收斂。遲則恐生別症難愈。

魚口便毒看法

初起結腫不紅微熱行走利便。無寒熱交作者輕。已成紅赤腫痛。發熱疼痛。舉動艱辛。至夜尤甚者順。已潰膿被肉色紅活。腫消痛止。新肉易生。作癢者順。初起結腫堅硬如石。牽強刺痛。起坐不便。寒熱者重。已潰腐爛。腫痛不減。膿水清稀。孔深口大不斂者險。

魚口便毒治法

初起慢慢結腫疼痛。兩胯牽強。身發寒熱。宜散表邪。已成堅硬發熱疼痛。內熱口乾。大小便祕。宜通利之。發散疏利之後。腫痛仍作。欲作膿。宜用托裏消毒散。掀腫發熱。疼痛日久急脹若甚。內膿已成。宜急開之。已潰之後。膿水不乾。新肉生遲不斂。宜健脾胃。補血氣。

魚口便毒治驗

一男子左胯腫痛。身寒熱脉弦而數。用人參敗毒散一劑。表症悉退。次用山甲內消散。二劑而痊。

一男子橫痃。腫痛堅硬。二便澀滯。以九龍丹一服。通利大便。腫痛漸減。間日又用一服。二便通利而消。

一男子於此十餘日。形勢已成。腫痛日甚。因公事急欲出而不能行。以火鍼法鍼之。出紫血鍾許。外用膏貼。拔出微膿。托裏消毒散而可行。且速愈。

一男子潰而口大不斂。此先時泄藥之過也。用十全大補湯。加澤瀉丹皮十餘劑。外搽玉紅膏月餘而斂。

一男子先出宿瘡。久而不愈後發橫痃十餘日始覺痛。余欲托裏潰膿。以泄毒氣。彼欲內消。自服槐花酒、蜈蚣、全蠍等藥。腫未得消元氣已損。轉致筋骨疼痛。舉動艱辛仍請余治形體瘦弱。脉虛而數。此真氣受傷。邪氣隨入。雖宜補養。必發時瘡乃愈。彼不之信。仍服數毒消風等藥。元氣愈虛飲食不進。筋骨疼甚。徹夜不睡。又復請治。先用補中益氣湯。倍參耆六服。元氣稍醒。惟疼不大減。此內虛瘡毒下陷之故。朝服六味丸。午用十全大補湯。十餘服偏身方發紅點。此瘡毒欲出。仍服前藥。紅點漸高。始成瘡形。瘡毒一出。疼痛頓減。元氣漸復。更服八珍湯。加米仁銀花土茯苓服至半年。方得漸愈。彼悔執方治病之誤。始信因病用方之妙。

魚口便毒主治方

山甲內消散 治魚口便毒騎馬癰橫痃等症。初起未成膿者。當歸梢 甘草節 大黃錢 穿山甲尖 僵蠶 黑牽牛錢 土木鼈錢 水酒各一碗。煎八分。空心服。渣再煎服。大便行三四次。方吃稀粥淡味飲食爲妙。

九龍丹 治魚口便毒。騎馬癰橫痃。初起未成膿者。兒茶 血竭 乳香 沒藥 木香 巴豆油 右各等分爲末。生蜜調成一塊。磁盒盛之。旋丸綠豆大。每服九丸。空心熱酒一杯送下。行四五次。方吃稀粥。腫甚者。間日再用一服自消。

紅花散瘀湯 治入房忍精強固不泄。以致瘀精濁血凝結兩胯或小腹之旁。結成腫痛。小水澀滯者。當歸尾 皂角鍼 紅花 蘇木 僵蠶 連翹 石決明 穿山甲 乳香 土貝母 大黃錢 牽牛錢 水酒各一碗。煎八分。空心服。行五六次。方食稀粥補之。

黃耆內托散 治魚口便毒橫痃等症。已成不得內消者。川芎 當歸 黃耆錢 白朮 金銀花 天花粉 皂角鍼錢 甘草 澤瀉錢 水二茶鍾。煎八分。食前服。

玉紅膏藥 治魚口便毒橫痃。腐潰口不合者。用此搽之。

火鍼法 治魚口便毒橫痃等症。用行藥不得內消者。用粗線針二條。


將竹筷一頭臂開。將鍼離分半許。夾在筋頭。內以線扎緊。用桐油燈盞。內貯之。燈草五根。排入油內點著。將鍼蘸油燒紅。向患頂重手刺入五六分。隨出或血或膿。以膏蓋貼。即得輕便。以後漸愈。虛者兼服十全大補湯完口。

魚口便毒應用方 托裏消毒散藥 十全大補湯 補中益氣湯 八珍湯

俱見潰瘍門 六味地黃丸見補腎門

【探究、按語】

俗稱橫痃，生少腹之下，腿根之上摺紋縫中，亦屬花柳病之一種，常在淋病或下疳後二三星期發病。初腫如杏核，漸大如鵝卵，堅硬不痛，微熱不紅，或令人寒熱往來。初宜「荆防敗毒散」兼服「角刺粥」，若煩燥作渴以「山甲內消散」消解。若過於堅硬大痛者，宜「紅花散瘀湯」，不應者，選「九龍丹」或「五虎消毒丸」攻之。不易破潰，如膿勢將成，以「黃耆內托散」。虛者「托裏透膿湯」，如潰改「五虎丹」提毒，虛者「八珍湯」、「十全大補湯」或「補中益氣湯」加減，因證用藥。外用「琥珀膏」、「萬應膏」貼之。其他如「八將丹」亦可選用。此症因生于摺紋縫中潰後每不易速愈，身立則口合，身屈則口必張，形如魚口開合之狀，故有魚口之名。



卷 九

囊癰論第三十九

【原文】

夫囊癰者。乃陰虛溼熱。流注於囊。結而爲腫。至潰後。睪丸懸挂者。猶不傷人。以其毒從外發。治當補陰清利溼熱。取效者十有八九。近時人誤用疝家熱藥。多致熱甚爲膿。慮難收斂。初宜龍膽瀉肝湯。稍久。滋陰內托散。外敷如意金黃散。俱可內消。又一種水疝。皮色光亮。無熱無紅腫痛有時。內有聚水。宜用鍼從便處引去水氣則安。如腫痛日久。內膿已成。脹痛者可即鍼之。內服十全大補湯。加山茱萸牡丹澤瀉治之。間以六味地黃丸服之。亦愈。

囊癰看法

初起不紅微腫。腎子引痛。不作寒熱。起坐自便者輕。已成紅腫發熱。形色光亮。疼痛有時。飲食有味者順。已潰膿稠腫消痛止。新肉漸生。不痛作癢。收斂者吉。潰後腐爛。囊皮脫落。甚者睪丸突出。能食不痛者順。初起堅硬紫色。日夜痛甚。小便不利。大便秘泄者重。已成堅而不潰。頭腐無膿。疼痛無時。常流血水者重。潰後膿口張開。腫痛不減。身發寒熱。睡臥不寧者重。

囊癰治法

初起寒熱交作。腎子腫痛。疼連小腹者。宜發散寒邪。已成紅腫發熱。口乾掀痛。小水不利。大便秘者利之。已潰疼痛不減。膿水清稀。朝寒暮熱者。宜滋陰內托。潰後不能收斂。日晡發熱。飲食減少者。宜養血健脾。潰後睪丸懸掛。不能收斂者。當外用生肌。內加補托。

囊癰治驗

一男子風寒未經發散。寒中腎囊作腫痛甚。以萬靈丹洗浴發汗。寒邪頓退。又服四物湯。加澤瀉蒼朮山梔天花粉。外敷如意金黃散。數次而痊。

一男子囊腫甚大。脹疼不熱。按之軟而即起。此溼水流注。聚而不散。以拔鍼導去黃水碗許。服導水消腎丸。月餘而消。又以木香補腎丸服之。

不發。

一男子患此十餘日。腫甚脹痛。內膿已成。鍼之出膿碗許。服十全大湯。加澤瀉丹皮十餘劑而收斂。

一老年人素有疝氣。因怒傷肝。舉發疼痛。自服盤葱散熱藥腫痛益甚。腎囊半邊堅硬。皮損紫黑。此欲爛見睾丸候也。余語之不信。尚欲內消。請他醫治之。內服龍膽瀉肝湯外敷四黃散寒涼等藥。堅硬果腐。飲食少進。虛熱不睡。痛甚昏憊。又復請治。余曰。此症初起似疝。實非疝也。凡疝小腹作痛。牽引腎子多寒少熱。好飲熱湯。此症乃惱怒傷肝。陰虛溼熱爲患。其囊紅腫發熱。小便赤澀。內熱口乾。墜重作痛。是爲囊癰之候。初宜清利溼熱。而反用疝家熱藥。已成宜補陰。而又用瀉肝涼劑。老年氣血既虧。攻補機關又誤。安得不殆。當養氣血固根本爲主。而佐以安神定痛之藥。接補元氣。生死在進退之間。尚可轉也。內服八珍湯。加麥冬五味子遠志丹皮。外以甘草湯淋潰腐處。將已壞黑肉。盡行剪落。其睾丸已露數日。後因得補藥之力。前症漸退。飲食漸進。外腐已盡。腎子已突出大半。搽以玉紅膏。外用膏益。肌長漸收。調理半年外始安。

一男子腫痛十餘日。堅硬無膿。囊頭紫色作爛。此欲外腐。以蟾酥錠爲末繆上。膏蓋兩日。腐肉脫下。搽玉紅膏。以太乙膏掩之。內服補陰滋腎藥而愈。

一男子慾後受寒。致陰囊牽引小腹作痛。惡寒發熱。診之脉緊數而無力。服五積一劑。寒熱乃退痛亦稍止。更用八珍湯。加肉桂丹皮澤瀉數服而愈。

囊癰主治方

清肝瀨溼湯 治囊癰肝經溼熱結腫。小水不利。發熱掀痛者。 川芎 當歸 白芍 生地 柴胡 龍膽草 山梔 天花粉 黃芩錢半 澤瀉 木通 甘草錢五 水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。食前服。

滋陰內托散 治囊癰已成。腫痛發熱。服之有膿。即可穿潰。 當歸 川芎 白芍 熟地 黃耆錢半 皂角針 澤瀉 穿山甲錢五 水二茶鍾。煎八分。食前服。

導水消腎丸 治內傷生冷。外受風寒。以致寒溼侵入囊中。小者如升。大者如斗。皮膚頑厚。陽物短縮。小水不利。不痛多冷。俗稱沙店是也。宜服此藥引導水氣。日久漸消。不爲廢疾。此方常驗。茅山蒼朮一斤米泔水浸切片炒黃 木通半 肉桂一錢刮去粗皮 牽牛二錢 木香半 共爲細末。陳米粉打糊丸。如桐子大

。每服百丸。空心白滾湯。清米湯任下。忌生冷麵食。此囊雖夏月炎天。亦以衣被覆之爲妙。

灸偏墜法 候取天晴。不犯人神日。患者平身仰臥。取木腎子根下硬根盡處。以墨點記。用安豆大艾炷。三年之內灸七壯。年久者灸九壯十一壯爲止。內服木香補腎丸。或戒食生冷。兼忌房事。百日爲妙。

木香補腎丸 治偏墜。一名木腎。不疼不癢。漸漸而大。最爲頑疾。有妨行動。多致不便。灸後宜用此。可內消。此藥功效。不獨治疝。中年後宜服之益壽延年。黑髮壯筋。填髓明目。聰耳補腎助元陽。調飲食其功不可盡述。婦人服之。顏如童女。肌膚瑩潔如玉。又精寒血冷。久無嗣息者。服之更妙。懷慶生地四兩_蜜 茵絲子 肉蓴蓉 黃精 黑棗肉打 牛膝打 蛇床子炒 茯苓 遠志各一兩_錢 歸身二兩_錢 丁香五錢 大茴香 木香各六錢 枸杞子二兩_錢 巴戟 杜仲各一兩 青鹽五錢 人參五錢 右爲細末。煉蜜丸如梧桐子大。每服六七十九。空心溫酒送下。又諸疝不常舉發者服之亦宜。

如意金黃散調 治囊癰初起。紅赤腫痛。發熱墜重者。用葱湯同蜜調敷。夏月溼熱紅甚者。溫茶湯同蜜調敷妙。

囊癰應用方 萬靈丹 蠕酥錠太乙膏 玉紅膏俱見清火解毒內 十全大補湯 四物湯俱見清火解毒內 五積散俱見清火解毒內 龍膽瀉肝湯俱見清火解毒內

【探究、按語】

生於陰囊之上，俱紅腫熱痛之特徵者，名囊癰，屬足厥陰肝經所主，由陰虛肝腎溼熱流注於陰囊而成。初起結腫或掀腫疼痛，或身熱口渴，小便赤濁，如散之不應者，釀膿甚速，此處組織（皮膚）較弱，如症重而熱甚者，腐潰後常有腎子懸掛似脫者（又名囊脫），但亦無妨，用紫蘇湯日洗，杉木灰或紫蘇爲末托敷，另以蘇葉或鮮荷葉包之，囑患者仰臥靜養，內以補陰兼清溼熱，如「瀉熱湯」。初用「清肝滲溼湯」或「龍膽瀉肝湯」輕用龍膽草，色紅熱甚疼痛者，外敷「如意金黃散」。如內膿已成，恰時針刺排膿。體虛者「十全大補湯」加山萸、丹皮、澤瀉、間以「八珍湯」「六味地黃丸」調理，不難痊癒。

又水疝者，形似囊癰，但皮色光亮，無紅不熱，按之不痛，或痛有定時者，內有積水也，宜針之引去水氣則安。

子癰者，腎子腫脹作痛而不上升，亦因溼熱下注而成，與囊癰不同者，一爲囊腫紅痛而腎子不腫痛，一爲腎子腫痛而外囊則不痛，或微有紅色而已，未成膿時即服「枸橘湯」，有表證者、「荆防敗毒散」汗之，熱甚「龍膽瀉肝湯」清之。遲則膿潰糜爛者，預後不良。

懸癰論第四十

【原文】

夫懸癰者。乃三陰虧損。溼熱積聚而成。此穴在於穀道之前。陰器之後。謂之海底穴。初生狀如蓮子。少癰多痛。日久漸如道桃李。赤腫掀痛。欲潰爲膿。破後輕則成漏。重則瀝盡氣血。變爲癆瘵。不起者多矣。初起時。元氣壯實。宜用九龍丹瀉去病根。稍虛者。內消沃雪湯。利去溼熱。十中亦有三四可消。如十餘日後。腫勢已成。不得內消。宜托裏消毒散。加山甲皂角刺服之自破。如腫高光亮。膿熟不破頭者用鍼急破之。穢膿一出。其患易安。如膿出之後。朝以六味地黃丸。午以十全大補湯。加牡丹皮澤瀉溫補滋陰。又有厚味高粱之人。氣體壯實者。初服龍膽瀉肝湯。瀉服滋陰八物湯。以清蘊熱。體瘦房勞。氣血虛弱者。初服八珍湯。加澤瀉炙甘草。瀉後十全大補湯。加牡丹皮熟附子。脾弱者。補中益氣湯。以滋化源。日久成漏者。國老膏化湯。吞服蠟礬丸。首尾誤服寒涼。損胃傷脾。冰凝氣血。以致患孔漸開。穢膿不止者。定成虛羸勞瘵。終爲難愈。

懸癰看法

初起如松子。漸大若梅李。紅赤腫痛。光亮發熱者輕。已潰高腫作痛。根腳不散。皮薄易破。膿成脹痛者輕。已潰膿稠而黃。氣味不臭。掀腫易消。痛止作癰者順。初起色紫堅硬。根腳漫腫。痛連臂膝。二便不利者重。已成腫如黃瓜。紫斑腐爛。穢水無膿。痛甚氣臭者逆。已潰穢膿不絕。瘡口開張。肉不紅活。虛熱食少者逆。

懸癰治法

初起寒熱如瘻。喜覆衣被。口乾好飲熱湯。宜發散。已成掀熱作痛。內熱口乾喜冷。大便秘澀者。微利之。日久內膿已成不破頭面脹痛者。急鍼之。法當補托。瀉後膿水清稀。虛熱不退腫痛不消者。宜滋陰健脾。瘡口不斂。飲食減少。餘腫不消。新肉不生者。峻補脾胃。

懸癰治驗

一男子結腫四日。作癰微痛。用九龍丹一服。利五六次。其腫漸消。又用四物湯。加花粉黃柏知母而愈。

一男子患此十餘日。掀腫作痛。至晚發熱尤甚。又兼小水不利。服龍膽瀉肝湯三劑。小水稍通。微痛不止。此欲作膿。用托裏消毒散。加穿山甲。皂角刺。澤瀉二服。而膿出。又服十全大補湯。月餘而歟。

一男子患此腫甚脹痛。此內膿已成鍼之出膿碗許。疼痛頓減。服十全大補湯十餘劑。而飲食漸進。掀痛亦消。惟瘡口潰甚難合。間用炙甘草香蠟繭丸。外以附子餅炙之。調理三月而愈。

一男子素有痰火。久服降下之藥。以致結腫疼痛。脉細而數。此陰虛溼熱流注而成。潰後必難收斂。醉不治。後果出臭膿不禁。日漸開大發熱不止。飲食不進。強投溫中健脾補托氣血藥。終不效而死。

懸瘻主治方

滋陰八物湯 治懸瘻初起。狀如蓮子。紅赤漸腫。悠悠作痛者。 川芎 當歸 赤芍 生地 牡丹皮 天花粉 甘草^{各一錢} 澤瀉^{五錢} 大黃^{便祕加一錢蜜炒} 水二茶鍾。燈心二十根。煎八分食前服。

炙粉草膏 治懸瘻已成。服藥不得內消者。服之未成者即消。已成者即潰。既潰者即歟。此治懸瘻良藥也。大粉草四兩。用長流水浸透。炭火上炙乾。再浸再炙。如此三度。切片。 甘草三兩。 當歸身三兩。 水三碗。 慢火煎至稠膏。去渣再煎。稠厚爲度。每日三錢。無灰好熱酒一大盃化膏。空心服之最妙。

還元保真湯 治懸瘻已潰。瘡口張開。膿水淋漓。不能收斂者。 當歸 川芎 白芍 熟地 白朮 茯苓 人參 黃耆^{各一錢} 牡丹皮 柏杞子^{各八錢} 甘草^{一錢} 熟附子^{各五錢} 肉桂 澤瀉^{二錢} 水二茶鍾。煨薑三片。大棗三枚。煎八分。食前服。

滋陰九寶飲 治懸瘻厚味高梁蘊熱結腫小水澀滯。大便秘結。內熱口乾。煩渴飲冷。及六脉沈實有力者。 川芎 當歸 白芍 生地 黃連 天花粉 知母 黃耆 大黃^{各二錢} 水二茶鍾。煎八分。空心服。

懸瘻應用方 托裏消毒散^{見外門} 腎氣丸^{見內門} 十全大補湯 八珍湯 补中益氣湯 四物湯^{俱見外門} 內消沃雪湯 蠟繭丸^{見外門} 九龍丹^{見魚口門} 附子餅^{見外門}

【探究、按語】

屬肛門周圍之化膿性腫瘍，其病因證治大都與臓毒相仿，參考臓毒。

臀癰論第四十一

【原文】

臀癰生於小腹之後。位遠僻與。氣亦罕到。血亦少來。凡生此者。溼熱凝滯結聚而成。毒必外發。庶不內攻。初起毒從五臟蘊積者。患必有頭紅熱。墜重如石。內必口乾。發熱。宜內消沃雪湯。通利積熱。外以膏貼癰頂。四邊以如意金黃散敷之。拔出癰膿紫血。內兼托藥自愈。常有內服敗毒寒劑。外敷涼藥。氣血冰凝。毒氣不得外發。反致內攻。其瘡頭軟陷無膿。根腳平散不痛。內熱口乾。煩躁譫語。痰喘氣粗。恍惚不寧者。俱爲不治。此病從毒積於內。自裏至表者。十有八九。而從風寒暑溼。自外裏者。百中一二。既出而復入裏者。終爲死候。

臀癰看法

初起有頭紅赤腫痛。頂高發熱。根腳高聳者爲易治。已成掀熱發腫。疼痛有時。皮薄光亮。色紅易膿者順。已潰膿稠而黃。色如豬腦。腫消痛止。起坐自便者順。初起粟米形。或黃泡一點。平塌作癰。根腳散漫者重。已成色紫堅硬。臀腿俱痛。小便澀滯。日久無膿者險。潰後無稠膿。頂空根軟塌。手接不知痛。神昏無治法。

臀癰治法

初起惡寒體倦。喜覆衣被。脉浮緊而在表者。微散之。已成內熱口乾。好飲冷物。小水澀而大便秘者通之。頂高色赤。掀痛發熱。疼痛有時者。宜托裏更兼解毒。腫已高而作疼。膿已熟而不破。脹痛難忍。宜急鍼之。潰後堅硬不消。膿水不止。飲食無味者。宜補虛健脾。

臀癰治驗

一男子患此四五日。始覺疼痛。至晚作寒。六脉浮而帶數。服人參敗毒散二劑。寒熱頓退。疼痛稍止。彼有公事。急欲出門。乃用鍼點入癰頂五六分。流去紫血。用蠟酥條插入膏蓋。服活血散瘀湯二劑。紫血既去。便可行動。更服托裏藥五六劑而安。

一男子患此六七日。掀痛發熱。口乾便燥。用托裏消毒散。加花粉大黃二服。便通渴止。仍用前湯。加角針山甲數服而膿潰。又服十全大補湯。半月而歟。

一男子患此。堅硬不潰。此先用涼藥之過也。用十全大補湯。加角針
蒼朮丹皮四劑。堅硬漸軟。又服透膿散二劑。膿熟鍼之。仍用前湯。倍參
耆歸朮。月餘而歟。

一男子暑月患此。自以爲內毒。用老鴉藤搗爛敷之。每日續飲涼水十
餘盃。如此三日。瘡毒內陷。平塌冰冷。口禁不言。六脉虛細如絲。辭不
可治。至夜而死。又一人冬月患此。外用四黃散。涼水調敷。內服敗毒涼
藥。毒亦內陷。煩燥口乾。鼻掀氣急。瘡頭平塌。原有一孔。無水無膿。
亦辭不治。他醫皆言無事。余曰。腎居小腹之後。肌肉頑厚。毒既到此。
必須內托爲膿。潰後最易收斂。今內外俱用涼藥。毒既入內。豈能再出。
衆醫強投內消解毒。定躁除煩之藥。半月而死。

腎癰主治方

活血散瘀湯 治腎癰初起。紅赤腫痛。墜如重石。及大便秘澀。 川
芎 當歸 防風 赤芍 蘇木 連翹 天花粉 皂角刺 紅花 黃芩 枳
殼 大黃 水二茶鍾。煎八分。食前服。便通者。去大黃。加乳香。

黃耆內托散 治腎癰已成。服前藥勢定者。欲其潰膿。宜服之。 黃
耆 當歸 川芎 金銀花 皂角刺 穿山甲 甘草 水二茶鍾。煎八分。
入酒一杯。食前服。

腎癰應用方 內消沃雪湯 如意金黃散 人參敗毒散 托裏消毒散
透膿散俱見瘡門 蠕酥條見疔門 十全大補湯見癰門

【探究、按語】

發於腎部，屬膀胱經，由溼熱結聚所致，來勢暴急，此處肌肉豐厚，病位深，範圍廣，難於起發，成膿快，但潰破較難。初起標盛邪實，宜「內消沃雪湯」「仙方活命飲」，清熱解毒，行氣活血。散之不去而釀膿時「托裏消毒散」、膿熟宜切開排膿。潰後如腐肉難脫，瘡口不斂者「六君子」加當歸黃耆。陰虛口渴者「六味丸」加五味子。氣虛者補氣「補中益氣湯」、兩虛者「十全大補」調之。

楊梅瘡論第四十二

【原文】

夫楊梅瘡者。以其形似楊梅。又名時瘡。因時氣乖變。邪氣湊襲。又
名棉花瘡。總由溼熱邪火所化。但氣化傳染者輕。精化慾染者重。氣化乃
肺脾受毒。其患先從上部見之。皮膚作瘡。筋骨不痛。其形小而且乾。精

化乃肝腎受毒。其患先從下部見之。筋骨多疼。小水澀淋。其形大而且硬。如氣化者毒在皮膚。未經入裏。宜服萬靈丹。先浴發汗。解散皮膚之毒。精化者。毒在骨骼。未透肌膚。宜服九龍丹。通利大小二便。以消骨中之毒。甚者二服皆可。行散之後。體實者。升麻解毒湯。體弱者。歸靈內托散。服至筋骨不疼。瘡根淡白。內毒已解。方用點藥。輕者半年。重則一載始愈。如患者欲速。妄用薰條擦藥哈吸等法。必貽後患。宜熟思之。

楊梅瘡看法

初起無頭疼。筋骨不作痛。小水無澀淋。瘡乾細者輕。已生頭面稀少。口角無瘡。項下胸背雖多。穀道無者輕。初生瘡發下疳。次生魚口。筋骨疼痛瘡發非祥。瘡生紅紫堅硬。手足偏生。形如湯潑泡狀害非輕淺。

楊梅瘡治法

初起先澀淋。次筋骨作痛。後發瘡者。宜攻利。生後外無疳瘡。內無筋骨作痛。時氣所感者。微散之。瘡由交媾不潔。先生下疳。小水澀滯不通者。當行導利。上部作瘻瘡多宜消風清熱。下部作疼瘡甚宜瀉溼為先。紅紫毒甚瘡高。宜涼血解毒。淡白毒輕瘡薄。宜攻補兼行。手足皮膚枯槁。鵝掌風生。柏葉二鬱煎湯。薰洗即好。頭髮眉毛脫。油風何須說。神應養真丹。早服稀疎脫。點點楊花癬。片片癩風瘡。宜服換肌丸。效應如同掃。

楊梅瘡治驗

一男子患此兩月餘。自服敗毒涼劑不應。筋骨疼痛。此表裏寒涼毒沈難出。必以辛熱發之。用萬靈丹。葱酒煎服。仍洗浴蓋之。先令冷汗如雨。次出熱汗。疼痛減其大半以歸靈湯服之月餘。瘡勢始定。更服草薢湯。兼服補中益氣湯。又兩月餘。始全愈。

一男子小便白濁作痛。次出疳瘡。發腫作爛。筋骨微痛。余曰。將發時瘡。彼不之信。請他醫以薰藥照之。瘡似稍愈。而筋骨更疼。頭脹欲破。又復請治。紅點滿面。此火氣鬱遏難出。先用黃連解毒湯二服。瀉其火毒。次以蟾酥丸發汗。使其毒透出肌表。紅點漸漸成瘡。筋骨頭疼亦漸減。更以加味餘糧湯。服至兩月。瘡始出盡。骨疼方止。又兼服解毒天漿散。至百日其始退。又百日而平。

一女人因丈夫生瘡傳染。筋骨極疼。遇晚寒甚。服人參敗毒四劑。其寒乃退。疼尚不止。又以萬靈丹發汗兩次。方出點如豆大。頭面及背肉無餘隙。此毒盛也。用防風通聖散二劑。通利大小二便。去硝黃。加皂角鍼

金銀花。又十餘劑。其瘡小者如錢。大者若杯。氣穢作爛。起坐不堪。外以石珍散繆爛處。令結疤。又爛又繆。內服加味遺糧湯。兩月餘瘡始漸乾。輕者收斂脫痂。重者半年方愈。

一庠生患此月餘。欲求速愈。余曰。此非他恙可比。若速愈遺毒於後日。辭不敢治。更醫對曰。半月全愈。後亦無患。聞言大喜。用水銀膽礬等藥搽擦手足二心。半月果愈。隨後骨疼。諸藥不應。半年後內毒方出。爛疼不堪。偏腿連串。並無一空。又二年腿腳曲而不直。廢疾終身。又兼耳聾。全不聞聲。又一人嫖妓生瘡。筋骨疼痛。余曰。升發方可。彼欲內消。他醫謂用藥丸七圓可治。每用一圓。置炭上燃著。以口吸烟至三圓。鼻流鮮血。至夜而死。又一妓者患此。欲其速愈。以照藥薰之。三日後吐鮮血數盆而死。此皆欲速自取危亡。

楊梅瘡主治方

加味遺糧湯 治楊梅瘡初起。筋骨疼痛。及已成數月。延綿不已。并楊梅風毒。誤服輕粉。癰瘍骨疼。不能動履。 川芎 當歸 防風 薏苡仁 木瓜 金銀花 木通 白蘚皮 蒼朮 威靈仙_錢 甘草_{五分} 皂莢子_{五個}_{切片炒} 仙遺糧_{二兩即俗土茯苓是也} 人參_{用人氣虛者加此味} _{除動此不必} 水二盞。煎八分量病上下。食前後服。腿腳之下。加牛膝_錢。病淺者一月可退。病深者百日可痊。忌牛肉燒酒海腥煎炒。此瘡發時。多先起於下疳。預服此方。可以止其不發梅瘡也。

解毒天漿散 治楊梅瘡不問新久。偏身潰爛及筋骨作疼者。 天花粉_錢 防風 防已 皂角針 白鮮皮 連翹 川芎 當歸 海風 木瓜 金銀花 蟬蛻 米仁_錢 甘草_{五分} 土茯苓_兩 牛膝_錢_{下加} 水二盞。煎八分。臨服入酒一杯。量病上下服之。

升麻解毒湯 治楊梅瘡。筋骨疼痛。久而不愈。及治遠年近日流注結毒。皮肉破爛咽喉損破者。用升麻新鮮皂角鍼各四錢。上白土茯苓一觔。項以上加白芷。咽內加桔梗胸腹加白芍。肩背加羌活。下部加牛膝各一錢。用水八碗。煎至四碗。作四次一日服盡。每次頓熱。加麻油三茶匙和勻。量病上下。食前後服之。瘡甚者不過十服。

歸靈湯 治楊梅瘡不問新久。但元氣虛弱者。宜服此藥。 川芎 當歸 白芍 熟地 米仁 木瓜 防已 天花粉 金銀花 白蘚皮 人參 白朮_錢 甘草_{五分} 威靈仙_錢 牛膝_錢_{下加} 土茯苓_兩 水三盞。煎二碗。二次量病上下。食前後服之。再煎八分服。

防風必效散 治楊梅瘡溼熱太盛。瘡高稠密。元氣素實者。 防風

防己 荆芥 白鮮皮 連翹 槐花 蒼朮 皂角針 海風藤 木通 白芷 花粉 木瓜 金銀花 番白草一錢 甘草五分 土茯苓四兩 大黃三錢初加 水三碗
。煮二碗。二次服。渣再煎一碗。服後飲酒一大杯。即靜睡一時許。更妙。

金蟾脫甲酒 治楊梅瘡。不拘新久。輕重皆效。好酒五斤。用大蝦蟆一隻。浸酒封瓶口。煮香二枝取起。待次日。隨量之大小。以醉爲度。冬夏蓋煖出汗爲效。存酒次日只服量之一半。酒盡瘡愈。又治楊梅結毒。筋骨疼痛。諸藥不效者更妙。服酒七日後。不可見風爲要。忌口及房事百日。絕根矣。

翠雲散 治楊梅瘡已服內藥。根腳不紅。瘡勢已退者。 銅綠 膽礬五錢 輕粉 石膏一兩 共研細末。磁罐收貯。溼瘡乾繆。乾瘡公豬膽汁調點。三日點三次。其瘡自乾而愈。

又點藥方 杏仁四十九粒去皮尖 雄黃一錢 輕粉三錢 先將杏仁搗細。加雄黃輕粉細末再研勻。豬膽調點。

鵝黃散 治楊梅瘡潰爛成片。膿穢多而疼甚者。 石膏 輕粉 黃柏炒 以上各等分爲極細末。乾繆爛處。即可生疤。再爛再繆。毒盡乃愈。此解毒止痛收乾之效藥也。

楊梅瘡應用方 萬靈方 黃連解毒湯俱見瘡門 人參敗毒散 防風通聖散
俱見瘡門 蠕酥丸屬疔 補中益氣湯屬疔 九龍丹見瘡門 神應養真丹見瘡門 桂風換肌散
俱見瘡門 柏葉二鑿湯見瘡門

【探究、按語】

其瘡形似梅，故名，亦稱霉瘡。據考霉瘡傳入我國應在十六世紀初，由西歐東航海員傳至廣東，漸漸傳至全國，故亦名廣瘡，因中國古代文獻中並無此症之記載。至明清兩代，外科書籍始有記述，論述最詳者推明「霉瘡秘錄」，書中論及在我國之起源，傳染方式，並有驗案以及採用砷，汞劑之治療方法，並列有飲食及藥物之宜忌等，總之本書總結十六至十七世紀防治本病之經驗，至今仍有參考價值。

梅瘡多由不潔性交傳染，始發爲下疳或淋，中期則現梅瘡，晚期爲楊梅結毒，故有初期二期三期之稱，並可傳入臟腑而使病情複雜，且能遺傳。此症有氣化精化之別，氣化者輕，由不慎接觸患梅毒者，鼻聞其氣，或共飲食而得之，其瘡往往先見上部，皮膚結核凸起如梅又似棉子，形小而乾堅，皮膚作癢，其毒在表，宜發散解毒，如「防風通聖散」「麻黃一劑飲」或「楊梅一劑飲」等選用。如屬直接而精化者，乃肝腎受毒，或先見下疳或便毒，然後生發，往往先自下部見之，漸及全身。

，漸大而硬，先溼後爛，每見筋骨疼痛，小便淋澀，其毒內入骨髓，外達皮毛，非汗下兼行，難以洗滌其臟腑之毒，即用「雞子大黃丸」「九龍丹」等瀉之。待瘡色轉淡，再用「金蟬脫壳酒」。初起服表藥時，宜預服「護面散」以防上攻頭面。潰爛時，以「鵝黃散」撒之。其他如「仙餘糧湯」、「五寶丹」、「十味淡齋方」等，均為梅瘡有效方劑，皆可擇而用之，總之治法宜清利解毒或攻下為主，祛其毒，杜其後患。

結毒論第四十三

【原文】

結毒者。薰火收遏瘡毒。而沈於骨髓。又有未經薰擦。見苗未久。服藥不多。內毒未盡。便用點藥收斂。鬱遏毒氣者。亦能致之。發則從筋骨疼痛。自後漸腫起。發無定處。隨便可生。發在關節中。則損筋傷骨。縱愈曲直不便。發於口鼻。則崩梁缺脣。雖痊破形。更相發於咽喉者。更變聲音。發在手足者。妨於行走。原來情闕一錯。禍起百端。苦楚一生。毒遺數代。初起筋骨冷痛。金蟾脫甲酒發汗自愈。虛弱者。芎歸二朮湯。頭疼欲破者。天麻餅子。併吹鼻碧雲散。年餘流串筋骨不愈者。五寶散。虛弱潰爛。疼痛不斂者。十全大補湯。同土茯苓煎服。初起筋骨疼痛者。雷火針法。已潰腐爛者。解毒紫金膏。依法施治。年遠毒盛者。玄武丹。兼外搽靈藥。年近毒淺者。只在百日。自然可愈。毋得再薰。為禍傷人耳。看法治法。本論已詳。不復重出。

結毒治驗

一男子因薰藥之過。六年之後。兩腿骨痛。半年始腫以雷火鍼。腫小者一處。腫大者三處。七日後作膿腐潰。內服仙遺糧湯兩月餘。疼漸止。腫亦漸消。又兩月。方得腐盡肌生。更服十全大補湯。三月而斂。

一男子玉莖患此。半年陽物已損七八。遇一方士。以薰藥照之。血流不止。人似鬼形。余曰。毒發已傷元氣。再薰一次一逼。血得熱而妄行。此有限之物也。去之益許。恐其難保。先以四物湯。兼黃連解毒湯。合服二劑。其血乃止。更用八珍湯。加麥冬 五味子。黃柏 知母十餘服。元氣乃定。外以甘草湯浴洗。銀花散搽之。如此月餘。氣血漸醒。紅肉漸生。陽物復長大半。仍用前湯。加土茯苓二兩煎服。約四月餘乃愈。

一男子患此。頭疼欲破至夜尤甚。苦楚不堪。自以解毒藥治之不應。診之。寸關脉細數而無力。此虛陽之火上攻。以補中益氣湯加土茯苓一兩服至三劑。其疼漸止。又十餘劑全愈。

一男子患此。自膝以下。腐爛無空。伏枕半年。內服芎歸二朮湯。外以甘草 白芷 歸尾 葱白煎洗。三日一度。以解毒紫金膏搽之。如此三月餘漸愈。惟不能步履。以史國公藥酒。加土茯苓一觔浸煮服至半年。始能步履。又一料行步如常。

一婦人患此。頭疼腕痛。診之脉滑而絃。此痰毒相兼之病也。以天麻餅子服之。半月而頭疼愈。又用二陳兼四物。加紅花 升麻 黃芩。服至月餘全愈。

一男子頭額腐爛。外搽解毒紫金膏。內服草薢湯。兩月餘而斂。又一人小腿患此年餘。亦用前藥而愈。

一婦人咽喉損壞半年。湯藥難下幾死。內服結毒紫金丹。外吹結毒靈藥一月內全愈。又一女人。手膊頭背腫痛。六七年不潰。諸藥不應。亦服前藥而安。

一男子咽喉腐爛。余令內服遺糧湯。外用解毒生肌藥。彼以為緩。用薰藥照之。薰入 口爛幾死。大便純下黑血。偏身浮腫飲食不進。肌破三月而死。

結毒主治方

仙遺糧湯 治楊梅結毒初起。筋滑疼痛。已破肌肉潰爛者。 仙遺糧 防風 荆芥 川芎 當歸 天花粉 金銀花 白蒺藜 蒼朮仁 威靈仙一錢 山梔 黃連 連翹 乾葛 白芷 甘草 黃芩六錢加水五分 牛膝五錢加水三錢 水三盞。煎二碗。量病上下。食前後服。渣再煎一盞。服後飲酒一杯。忌牛肉火酒房事等件。更妙。

芎歸二朮湯 治楊梅結毒。已成未成。筋骨疼痛。步履艱辛。及潰後腐肉臭敗。不能生肌收斂者。 白朮 蒼朮 川芎 當歸 人參 茯苓 蒼朮仁 皂角刺 厚朴 防風 木瓜 木通 穿山甲炒 獨活錢 金銀花錢 甘草 精豬肉兩 土茯苓四兩 水三盞。煎一半。量病上下服之。渣再煎服。

消風脫甲散 治楊梅結毒。筋骨疼痛。腐爛作臭。氣血壯實者。番白草 紅花 甘草 威靈仙 山梔 蟬蛻 連翹 皂角刺 大楓子 薄荷 海風藤 金銀花 冬瓜皮 木通 蒼朮錢 土茯苓四兩 水三盞。煎二盞。二次服。用好酒一大杯過口。渣再煎服。

薰洗結毒方 蒼朮一兩。點紅川椒三錢。水五盃。煎至四盞。入罐內。將瘡對罐口。以熱氣薰之。半熱。傾藥盆內。淋洗瘡上。以潔淨布浥乾。搽後解毒紫金膏。

解毒紫金膏 治楊梅結毒。腐爛作臭。膿水淋漓。諸藥不效者。細塊礬。紅明淨松香各一斤。共研極細末。麻油調稠。先將瘡上用前湯薰洗潔淨。搽上此藥。油紙蓋上。以軟布條緊扎。毋令血行。三日一換。如無前湯薰洗。只煎葱艾甘草等湯。俱可洗換。又治諸毒頑癰等瘡神效。愈後忌發物煎炒。

神仙碧玉膏 治結毒潰爛臭穢。疼痛不斂。及風癰等瘡。及風癰等瘡
五味子蜜 輕粉兩 杭粉兩 白蠟錢 乳香 没藥錢 檀腦錢 用公豬淨熟油五兩。同白蠟熬化。傾入盃內。入上藥和勻。水內頓一時取起臨用抿腳挑膏。手心中捺化。攤油紙上。用葱湯淨瘡。對準貼之。

五寶散 治結毒筋骨疼痛。口鼻腐爛。諸藥不效者。滴乳石如乳頭下垂較易碎亮似鑄鐵頭膏方減四錢 琥珀 珍珠 珠砂錢 冰片錢 右各研極細。對準共爲一處。再研數百轉。磁罐密收。用藥二錢。加飛羅麵八錢。再研和勻。每用土茯苓一斤水八碗。煎至五盞瀘清作五次。每次加五寶散一分和勻。量病上下服。一日服完。十服自愈。如鼻子腐爛。每日土茯苓內加辛夷三錢煎服。引藥上下。忌食海腥煎炒房事等件。

結毒紫金丹 治遠年近日。楊梅結毒筋骨疼痛。日久腐爛。臭敗不堪聞者。或咽喉唇鼻破壞。諸藥不效者。龜板放炭火上炙火魚用新安酒發漬等藥燒上反復炙盞三次 煎黃爲末二兩 石決明兩 用九孔大者燒紅 珠砂錢 共再碾極細爛。米飯爲丸麻子大。每服一錢。量病上下。食前後服腐爛者土茯苓湯下。至重者四十日而愈。此功力勝於五寶散。

結毒靈藥方 治楊梅結毒腐爛作臭。或咽喉唇鼻腐壞日甚者。水銀兩 珠砂 雄黃 硫黃錢 共碾細。入陽城罐內。鐵蓋蓋口。以鐵絲扎緊。用泥封口留出蓋面。火煉三炷香爲度。不住用水擦蓋內。勿令乾。火畢。次日取出蓋底靈藥約有一兩五六錢。治尋常腐爛之症。靈藥五錢。輕粉五錢和勻碾細。小罐盛貯。紗封罐口。臨用甘草湯洗淨瘡上。將罐倒懸。紗眼內篩藥繆之。用後單油膏藥蓋貼。一日一換自效。男子婦人咽爛者。靈藥二錢。加入中白二分。研細吹之。日用三次。內服不二散。其疼即止。隨可飲食。

硫黃不二散 治楊梅結毒。發於咽內腐爛疼痛。湯水難入者。硫黃錢

，酸花。共爲細末涼水一大酒杯調服，其疼即止，隨可飲食。

鉛回散 治楊梅結毒。筋骨疼痛朝輕夜重。喜熱按揉者。用鉛半斤。銅杓內化開。傾在水內。將鉛取起再化再傾。如此百偏鉛盡爲度。候半日。待水澄清。傾去。用鉢底內沈下鉛灰。傾入三重紙上。下用灰收乾水氣。起取晒乾。與硫黃等分。研細罐收。每服一錢。溫酒調服至重者不過三次即效。

單油膏 貼結毒繆藥上。用麻油二斤。熬至滴水成珠。續下炒黃杭粉十三兩攪勻成膏。傾水內片時。取起攤用。

草薢湯 治結毒筋骨疼痛頭脹欲破及已潰腐爛者。
川萆薢 苦參 防風 生首烏^{各五錢} 威靈仙 當歸 白芷 蒼朮 胡麻 石菖蒲 黃柏
六味 羌活 川椒^{各四錢} 龜板^{五錢} 紅花^{三錢} 甘草^{二錢} 水二茶鍾。煎八分。臨服入酒一杯。量病上下服之。

碧雲散 治結毒入於顛頂。以致頭脹痛如破者。
鵝不食草 **川芎** **青黛** 共爲細末。患者口噙涼水。以蘆筒吹藥疼之左右鼻內。取嚏爲效。

結毒應用方 **十全大補湯** **補中益氣湯** **四物湯** **八珍湯**俱見渙鑑門 **金蟾脫甲酒**見清門 **二陳湯**見清門 **天麻餅子**見清門 **雷火神針**見附骨疽門 **史國公藥酒**見風濕門 **黃連解毒湯**見清門 **銀粉散**見清門

【探究、按語】

結毒者見于梅瘡後數年乃至四五十年者，初覺筋骨疼痛，或隨處結腫，潰後瘡深，除發皮膚外，重者于骨節頭面喉鼻之間，經絡交會之處，形成毀損，發于關節則損筋傷骨，曲直不利，發于口鼻則崩樑缺唇，雖愈形破，發于咽喉者上腭穿潰，改變聲音。治法參考原文。治驗處方中每加土茯苓一二兩，此藥至今仍認爲對梅毒具某些效果。

多骨疽論第四十四

【原文】

多骨疽者。由瘡潰久不收口。氣血不能運行。骨無營養所致細骨由毒氣結聚。化成大骨。由受胎時精血交錯而結。

腎主骨。宜服腎氣丸。十全大補湯。先補脾腎。宜用艾附餅炙之。令

溫煖腐毒。朽骨自然脫盡。生肌斂口而愈。

多骨疽治驗

一男子上膊腫痛。月餘。治以散風清熱藥又兩月。破流血水。百日外方出細骨大小三十餘塊。用十全大補湯。併吹生肌散。兩月餘而斂。中有一小孔簪腳大。通鼻透氣。致難全斂爲愈而不愈也。

一男子左手上膊結腫年餘。方出爛班破流稀膿又半年。方出多骨一條。如鵝脢骨。長約四寸。內服養血健脾藥。外搽玉紅膏。膏蓋又月餘而斂。

一男子小腿正面臙骨腫痛二年。諸藥不應。後破出骨一塊肌肉腐爛。元氣虛弱。用十全大補湯。加山茱萸 牛膝 木瓜。服至兩月餘不斂。每日以神燈照法。將火氣助之。又出朽骨一塊。上有蛆眼數十。遂將二骨炭火煅紅爲末。入生肌藥中用之而斂。或問用骨何也。余曰。此骨原稟氣血結成故用之復還元氣也。

一女人口左上牙根突腫如栗。堅硬如石不痛。服藥不效。後三年始痛。破流臭膿。漸出多骨。形如小鱉。腫仍不退。稍久又出小骨二塊。枯色礪增。其腫方退。內服四君子湯 加升麻 陳皮。外用甘草煎湯漱口。日搽生肌散。三次而收斂。

多骨疽主治方

固本養榮湯 治骨疽已成。骨不吐出。或既出不能收斂。由氣血虛脾胃弱也。宜服此湯。骨不出者自出。不收斂者自斂。 川芎 當歸 白芍 熟地 白朮 山藥 人參 牡丹皮 山萸肉 黃耆錢 甘草 肉桂 五味子錢 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。食前服。

生肌散 治腐骨脫出。肌肉生腫。不能收斂。 石膏 輕粉 赤石脂錢 黃丹 錢 龍骨 血竭 乳香 樟腦錢 右爲細末。先用甘草 當歸 白芷各一錢。煎湯洗淨患處。用此乾繆。軟油紙蓋扎二日。一洗一換。

多骨疽應用方 神燈照法 玉紅膏俱見瘡門 十全大補湯 四君子湯俱見瘡門 脊氣丸 見瘡門

【探究、按語】

古稱多骨「疽」，常與骨「疽」或附骨「疽」混雜，且常以部位或形狀命名，如患于胸背，病損成前隆後突畸形者，稱雞胸或龜背，患于腰背，痰流腎俞附近者，稱腎俞虛痰，病損于踝，瘡孔內外相通者，稱穿拐（踝）痰，結于指節，形似蟬肚者，稱蟬蟆肚，痰積前臂，附骨而生孔上流漿者，稱蠅蛆串等。今稱流痰或穿骨

流痰，清朝始見記述，至晚清始趨於一致，證治明確。

起因多由先天不足，肺腎虧損，骨空絡虛、後天失調、脾失健運、濁痰凝結，或外受寒溼浸襲，著于筋骨，或傷損後處理未妥，久延多能成病。病變之初，寒痰損筋腐骨，為陽虛盛陰之候，積久則寒化為熱，陰轉為陽，此時即見肝腎陰虧，虛火內積等證，病至後期，氣血為膿所耗，遂成虛怯，虧損病狀。

此病發病緩慢，常無任何不適，患部腫脹不顯，不紅不熱，輕痛或不痛，動則痛加，逸則輕減，兒童患者常在睡眠時痛醒哭叫，如生於腰椎者，不能彎腰，生於髓、膝部者，走路跛行等。日久則病變周圍萎縮，關節患處明顯腫脹、甚則形成膿腫，仍不紅熱，膿熟時，患處皮膚透紅一點，按之微軟，一般化膿都在病後半至一年以上。潰後流膿清稀，夾有敗絮，久則瘡口凹陷，周圍皮色紫暗，形如漏管，不易收口。

初起以補益肝腎，溫經通絡，散寒化痰，如「陽和湯」「補腎湯」之屬。久則扶正托毒如「托裏散」加減。虛熱者「秦艽鰲甲散」「大補陰丸」合「清骨散」加減。氣血兩虛者「人參養榮湯」或「十全大補湯」選用。總之應度其內外，審其虛實，辨其寒熱，詳察而治。本病之初，陽衰陰盛，宜溫通經脈，調其氣血，及至病成，寒化為熱者，應培補肝腎為本，兼清虛熱，使腎水得滋。潰後日久，氣血兩損，非大補其虛，壯其脾胃，以滋生化之源，此症成則難消，潰則難歛，如膿成而不潰，亦可刀剖引流，膿泄之後，治同一般潰瘍。唯宜窮本求源，多方合治，去其病骨，方可痊癒。

陰瘡論第四十五

【原文】

婦人陰瘡。乃七情鬱火。傷損肝脾。溼熱下注所致。其形不一。總由邪火所化也。陰中有挺出一條。如蛇形尺許。墜重流水溺澀者。乃脾氣下陷。肝火從之。宜朝服補中益氣湯。晚服龍膽瀉肝湯。外塗雄黃藜蘆散。其患漸收。陰中突出如菌子如雞冠。四邊腫痛者。乃肝鬱脾虛所致。先以補中益氣湯加山梔 茯苓 青皮。清肝補脾。兼升中氣。更以歸脾湯。加山梔 川芎 茯苓 香附 陳皮調理。陰戶忽然腫突作痛。因勞傷血分。溼火下流。宜四物湯。加丹皮 澤瀉 花粉 柴胡治之。陰中生蟲蠶如小蛆者。乃心氣鬱而邪火所化。宜四物加黃連膽草木通石菖蒲。以通散心竅。

鬱滯。外以銀杏散納入陰戶。陰器外生疙瘩。內生細蟲。作癢不可忍者。此蟲入食臟腑即死。令人多發寒熱。與癆瘍相似。婦人畏羞。都不肯說。因循日久。面黃肌瘦。身發寒熱。咳嗽生痰。往往不治。如有此症。急與逍遙散。吞蘆薈丸。早晚二服。外用銀杏散。綿裏塞入陰中。殺蟲止癢。半月漸愈。陰戶開而不閉者。憂思過也。宜逍遙散。歸脾湯。俱加柴胡山梔 白芍 丹皮。間服。交接出血者。肝虛有火。不能藏血。四物湯加膽草 黃芩 山梔 柴胡。新交房事。傷而腫痛者。珍珠散。豬脊髓調搽。又婦人久居寢室。淫火妄而又鬱。鬱而又妄。邪火久注。多致陰中作癢生蟲。此蟲食人內藏。陰中腐爛。攻刺疼痛。臭水淋漓。口乾發熱。形削不食。有些症者。非藥能愈。終歸於死。又名失合症也。

陰瘡治驗

一婦人陰器腫痛。小水澀滯。遇晚寒熱交作。此肝經溼熱爲患。服龍膽瀉肝湯二劑。小水通利。又以四物湯兼小柴胡。加天粉 木通 炒山梔 服之而愈。

一婦人發熱月餘。忽陰中突出如雞冠一片。此肝鬱脾虛所致。內服補中益氣湯。加青皮 山梔 柴胡 黃芩。以外甘草 白芷 蒼朮 紫蘇煎湯每日薰洗十餘日。其患漸小。仍用前湯倍參尤。月餘而安。

一婦人陰中作癢。遇夜五心煩熱。作渴不睡。此思慮太過。致心腎不交。內服四物湯。加龍膽草 山梔 黃連 知母。外以銀杏散納入陰中三日其癢漸止。朝服八味丸。午服歸脾湯。加銀柴胡 茵陳。月餘而愈。

一婦人陰器半邊腫痛。身發寒熱。口乾便秘。脉實有力。服內疏黃連湯三劑。大便通利。口乾乃止。惟腫痛尤重此溼熱結聚。欲爲膿也。用四物湯加角針 澤瀉二服。膿熟脹痛。又用透膿散一服。出臭膿鍾許。疼痛頓止。服八珍湯。加丹皮 澤瀉 十餘劑而安。

一婦人肝經風溼下流。陰器浮腫癢甚。抓出血不痛。內服消風散。加苦參 膽草 澤瀉 木通 山梔。外以蛇床子湯薰洗。搽擦銀杏散。十餘日癢止腫消而愈。

一婦人孀居十餘載。陰器作癢生蟲。含忍不說。後陰器蝕腐。已食內臟。人形消瘦。發熱作渴。脉洪浮數。方請醫治。詢問癢痛日久。陰器黑腐。小水不禁。此內臟已壞。不可用藥。彼苦求治。余曰。癢者蟲也。痛者損也。用鯽魚數枚。繫以香料炙熟。以絲棉薄裹納入陰中。夾之良久。取出紅蟲長者一寸。短者五六分。細如絲線。約有二十餘條。置溫水中。

搖擺片時方死。其家懼悅。以爲可治。余曰不然。再取再有。生化無窮。強投養血清肝藥。終不應而死。

陰瘡主治方

清肝膠溼湯。治肝經鬱滯。邪火流行。致陰腫痛。或風熱作癢。 川芎 當歸 白芍 生地 山梔 黃連 連翹 龍膽草一錢 銀柴胡 澤瀉
木通六錢 滑石三錢 蘆薈五錢 甘草三分 防風八分 水二茶鍾。淡竹葉燈心各二十件。
。前八分。食前服。

涼營瀉火湯。治婦人懷抱憂鬱。致生內熱。小水澀滯。大便秘結。及
陰中火鬱作痛。亦如澀淋。宜此瀉之。 川芎 當歸 白芍 生地 黃
芩 黃連 山梔 木通 柴胡 茵陳 龍膽草 知母 麥冬一錢 甘草五錢
大黃四錢 水二茶鍾。煎八分。空心服。便利去大黃。

銀杏散。治婦人溼熱下注。陰中作癢。及內外生瘡 杏仁去皮研 輕粉
水銀一錢 雄黃一錢 右各爲細末。共和一處。每用五分。棗肉一枚。和丸。
用絲綿包裹留一線條。燃線在外。用搗瘡湯煎洗。藥裹安入陰內。留線在
外。如小便取出再入。一日一換。重者只四五枚全愈。乃兼服前湯。

塌瘡湯。治症同上。以此薰洗之。 苦參 威靈仙 蛇床子 當歸
尾 狼毒一錢 鶴虱草二錢 用河水十碗。煎數滾。瀘清貯盆內。乘熱先薰。
待溫後洗。臨洗和入公豬膽汁二三枚更妙。

雄黃藜蘆散。治婦人陰中突出如蛇。或似雞冠菌樣者。雄黃一錢 葱管
藜蘆二錢研細末 輕粉鼈頭一錢 冰片三分 已上各研極細末。和勻再研。磁罐收
貯。先用芎歸湯煎洗。隨後搽藥。早晚二次。其患漸收。

芎歸湯。川芎 當歸 白芷 甘草 龍膽草 右各等分。每用五錢。
煎湯浴洗患上。隨後搽藥。

陰瘡應用方 內疏黃連湯 透膿散 補中益氣湯 八珍湯 歸脾湯
四物湯 八味丸俱見清瘡門 逍遙散 小柴胡湯俱見瘡門 蘆薈丸 龍膽瀉肝湯 珍珠
散俱見下消風散 蛇宋子湯 俱見瘡門

【探究、按語】

生於婦女前陰部之疾患，統稱爲陰瘡，如陰腫、陰蝕、陰蟲，陰挺等，都由七情鬱火損及肝脾，濕熱下注以及陰部不潔引起。

陰腫係外陰部腫痛，如陰門癰等，照一段癰處理。

陰蝕亦名蠶瘡，如陰門生瘡或成潰，照一般潰瘍處理，外敷「珍珠散」加洗。
內服選「龍膽瀉肝湯」「四物湯」之類。

陰蝨及陰部虫病，有虫則癢，故亦稱陰癢，多由寡室鬱火，或沾染虫毒而起，內服選「草薢滲濕湯」「龍膽瀉肝湯」「蘆薈丸」等，腎陰虧損者「大補陰丸」。外用「銀杏散」塞劑、「塌癢湯」洗劑。

陰挺乃子宮垂脫症，「補中益氣湯」主之。如有涉及花柳病而引起之疾患，則又必須參合梅瘡之治法，始克見功。



卷十

傷寒發頤第四十六

【原文】

傷寒發頤。亦名汗毒。此因原受風寒。用藥發散未盡。日久傳化。爲熱不散。以致項之前後。結腫疼痛。初起身熱口渴者。用柴胡葛根湯。清熱解毒。患上紅色熱甚者。如意金黃散敷之。初起身涼不渴者。牛蒡甘桔湯散之。患上微熱不紅疼痛者。沖和膏和之。腫深不退。欲作膿者。宜托裏消毒散。已潰氣血虛弱食少者。宜補中益氣湯。以此治之。未成者消。已成者潰。已潰者斂。用之最穩。

柴胡葛根湯。治頤毒表散未盡。身熱不解。紅腫堅硬作痛者。柴胡 天花粉 乾葛 黃芩 桔梗 連翹 牛蒡子 石膏生 甘草炙 升麻引 水二茶鍾。煎八分。不拘時服。

牛蒡甘桔湯。治頤毒表邪已盡。耳項結腫。微熱不紅疼痛者。牛蒡子 桔梗 陳皮 天花粉 黃連 川芎 赤芍 甘草 蘇木生 水二茶鍾。煎八分。食後服。

傷寒發頤應用方 如意金黃散 托裏消毒散 沖和膏俱見頭門 补中益氣湯見清頭門

【探究、按語】

乃傷寒餘熱之毒或溫邪走入少陽所致，結毒之屬，類頸癰等症。治宜清熱解毒，涼營泄熱內消爲法。初起宜及時消散，在表在經則治以辛涼佐以苦寒使邪毒得透，在裏在腑，治當寒涼通利，使邪得出，及至膿成時宜適時切開排膿，潰後扶胃和營托補，按頭面癰以清散祛風爲原則處理。

瘡發第四十七

【原文】

瘡發乃天時不正之氣。所感而發。非毒內作也。此患多生於手足掌心。或腰腿脣下伸縮之處。漫腫無頭。憎寒發熱。四肢沈重。煩渴爲甚。初起宜服萬靈丹。發肝解表。腫仍不消者。必欲作膿。托裏消毒散兼蠟礬丸。

間服。以後俱照潰瘍法治。

癟發應用方 萬靈丹 托裏消毒散 蠟燙丸俱見癟瘍門

【探究、按語】

亦屬急性化膿性腫瘍之類。治則照癰處理，初則消，成膿者剖潰，潰後照潰瘍法治。

癟瘍第四十八

【原文】

癟瘍一名蛇瘍。川廣烟瘴地面有之。初出先作紅點。次變黑色。腐爛筋骨。小者如粟如豆。大者如梅如李。發無定處。初用蠟酥餅膏貼。寒熱交作者。黍米寸金丹。或飛龍奪命丹亦可。紅腫遊走不定者。真君妙貼散。加雄黃敷之。自然截住。破後脾胃虛弱。食少乾嘔者。補中益氣湯加黃連 麥冬。補而不應。腫高疼甚。惟出清水穢汁者不治。

癟瘍應用方 飛龍奪命丹即蠟酥丸加金頭蠟鈎各二錢 黍米寸金丹 真君妙貼散俱見癟瘍門 补中益氣湯俱見癟瘍門

【探究、按語】

江南地帶未見過此症。

小腹癰第四十九

【原文】

小腹癰乃七情火鬱。以致脾虛氣滯而成。其患小腹漫腫堅硬。肉色不變。有熱漸紅者。屬陽易治。無熱不紅者。屬陰難治。初起七日以前。用艾當腫頂灸七壯。膏蓋。首尾內服健脾胃。養氣血。行經補托之劑。可保終吉。如誤用剋伐攻利涼藥者。敗症必出。十全大補湯。倍加參 薑 薑 附以救之。內腐深陷者。玉紅膏長肉收斂。補托不應者。雖愈終久成漏。

小腹癰應用方 十全大補湯 玉紅膏俱見癟瘍門

【探究、按語】

亦稱少腹癰或腹癰，生小腹皮裏膜外。由膏粱厚味或七情火鬱，以致脾虛氣滯

而成，小兒乃驚，積、虧損所致。初起隱隱作痛，漫腫堅硬，皮色不變或微紅，按之微熱。如皮色白，按之不熱者屬虛，緩慢難治，皮色紅按之烘熱者屬實，快速易治。此處生癰不能過用攻伐之劑，過用則難潰難歟，易變敗症。但壯實者，亦可用攻下之法，如「雙解貴金丸」「仙方活命飲」「化毒除濕湯」等。虛者「內補十宣散」「四君子湯」加芎歸白芷枳殼等。潰後「托裏消毒散」。總應健脾行經和絡或托補為法，其他如「托裏透膿湯」「十全大補湯」皆可加減選用。

鶴口疽第五十

【原文】

鶴口疽乃三陰虧損。督脈之經。濁氣濕痰流結而成。其患發在尾閨之穴高骨頭尖。初起形似魚肫。久則突如鶴嘴。朝寒暮熱。日輕夜重。潰後稀膿出而無禁。又或鮮血出而不停。凡發此者。壯年猶可。老年可慮。初起宜滋陰除濕湯和之。已成未潰者。和氣養榮湯托之。潰而不歛者。滋腎保元湯補之。久而成漏者。琥珀蠟礬丸。兼先天大造丸。服之甚妙。

滋陰除濕湯。治鶴口疽初起。朝寒暮熱。日輕夜重。如瘻等症。川芎 當歸 白芍 熟地錢 柴胡 黃芩 陳皮 知母 貝母分 澤瀉 地骨皮 甘草五 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

和氣養榮湯。治前症已成。不得內消者。宜此藥托之。人參 陳皮 白朮 黃耆 茯苓 丹皮 當歸 熟地錢 沈香 甘草五 水二茶鍾。煎八分。食前服。

滋腎保元湯。治前症元氣虛弱。膿水淋漓。久而不歛者。人參 黃耆 白朮 茯苓 歸身 杜仲 山萸肉 丹皮 熟地錢 附子 肉桂 甘草五 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。蓮肉七枚。食前服。

鶴口疽應用方 琥珀蠟礬丸見瘻 先天大造丸見瀉

【探究、按語】

疽先於尻尾骨尖者名鶴口「疽」，亦稱銳「疽」，屬督脈之經。由三陰虧損，濕痰濁氣流結而成，偏濕熱者居多。治法參考原文，總之濕重者祛濕，熱甚者泄熱，不足者托補。疽得膿即吉，暢泄則順。

龍泉疽虎鬚毒第五十一

【原文】

此二毒乃任督二脈分合行布。驟被外邪所搏而成。龍泉疽發在人中之間。虎鬚毒生於地角之上。初起疙瘩。次生腫痛。漸發寒熱。甚者惡心乾嘔。腮項俱腫。此穴忌灸。初起宜線針挑破患頂。以蟾酥餅放上膏蓋。使毒有門而泄。四邊掀腫。用如意金黃散圍之。內有表症者。荆防敗毒散加芩連牛蒡子。裏症。內疏黃連湯。已成欲其作膿。芎歸內托散。膿成脹痛者針之。即愈。潰膿後。只宜膏藥換貼。其口易完。此症多生於元氣壯實者。故多不必服藥自愈。

芎歸內托散。川芎、當歸、陳皮、茯苓、天花粉、桔梗、銀花、黃耆、甘草、水二茶鍾。煎八分。食後服。

龍泉疽虎鬚毒應用方 如意金黃散 內疏黃連湯 荆防敗毒散見肺門

【探究、按語】

都為面部疔瘡，龍泉疽位在上唇溝中人中穴，應稱龍泉疔，或人中疔。虎鬚毒應稱虎鬚疔，生人中兩旁，係陽明經行之處。

頭面疔瘡以人中疔最易毒散，往往一二天即能劇變，成膿甚速，膿出即消，其起亦速，癒亦快，患處忌灸外，並忌針忌挑。如三數日不見膿泄，不見腫止或身熱不退者屬逆，如見心嘔吐，肢體拘急或噤口如瘻，神識模糊至不省人事，牙關緊閉者，有危在旦夕之急，急則急治，用藥宜猛，「蠟礬丸」及犀角等亦應早用，臟躁者「拔疔毒丸」以瀉其火，見紅絲遊走者砭其絲頭，此症非大解其毒，往往能毒入絡而生發疔毒流注為患。

虎鬚疔較人中疔緩慢而痛劇，範圍亦較廣大，初生結腫，中間有頭，治法以解毒及清泄陽明為主。疔瘡腫痛甚者都可行刺，但不刺局部，而刺臍中，亦稱委中放血法，其他參考疔瘡論。

石榴疽第五十二

【原文】

石榴疽者。乃少陽相火。與外濕相搏而成。其患生在肘尖上一寸。初起一點黃粟小泡。根便開大。色紅堅硬。腫如覆碗。皮破泛出。疊如榴子。令人寒戰。猶如重瘡。初起即灸九壯。內服蟾酥丸發汗。以解蘊毒火。頂上蟾酥餅貼之膏蓋。掀腫處金黃散敷之。內服菊花清燥湯。琥珀蠟礬丸。煩燥熱甚者。護心散。金液戊土丹。九日後。患上作瞼稠黃。疼苦稍減。

。表裏症退。飲食微進者。可保無虞。反此爲逆。潰後元氣虛弱。雜症相兼者。照瘻疽調理法治之。

菊花清燥湯。甘菊_錢 川芎 當歸 知母 貝母 白芍 生地 麥門冬 地骨皮_錢 升麻 犀角 甘草 柴胡 黃芩_錢 水二茶鍾。淡竹葉燈心各二十件。煎八分。食後服。

石榴疽應用方 蟬酥丸_{見疔} 琥珀蠟礬丸 護心散 如意金黃散_{俱見瘻門}
金液戊土丹_{俱見疔}

【探究、按語】

屬濕火爲病之「疽」，不宜用灸，治法參考「疽」論。

穿踝疽第五十三

【原文】

穿踝疽。乃足三陰濕熱下流停滯而成。初起內踝腫痛。疼徹骨底。舉動艱辛。甚則串及外踝通腫。有頭者屬陽易破。無頭者屬陰難潰。此二者初起。必寒熱交作。宜荆防敗毒散。加牛膝散之。日久膿成脹痛者針之。腐而不斂。孔大者。玉紅膏培之。形體虛弱者補之。此症若不早治。久成廢疾。

穿踝疽應用方 荆防敗毒散_{見疔} 玉紅膏_{見瘻}

【探究、按語】

生踝部，內踝屬肝胃兩經，外踝屬膽與膀胱兩經。由寒濕或濕熱下注，血澀氣阻而成。初起寒熱往來，踝腫色紅，熱作痛，遇冷痛減，行動艱難，終則潰膿，膿稠黃爲順，清稀爲逆屬陽。初服「荆防敗毒散」加淮牛膝，或「五神湯」合「三妙散」加減，熱甚口渴者「竹叶黃耆湯」，已潰膿清久久不斂者，酌補，「八珍湯」、「十全大補湯」、「人參黃耆湯」選而加減。若漫腫無頭，皮色不變，足踝隱痛，遇寒痛增，形寒怕冷者屬陰。初服「祛濕消邪湯」加減，或以「陽和湯」加丹皮、銀花牛膝等。夾有風熱者「海桐皮湯」、虛熱者「榮衛返魂湯」加減。纏綿之症也，應囑少行動，小心休養，配合得宜，始可告痊。

大麻瘋第五十四

【原文】

大麻瘋。乃天地間異症也。但感受不同。有體虛之人。因驟被陰陽暴曠。露霧風雨之氣所侵。感之不覺。未經發泄。凝滯肌膚積久必作。有房慾後體虛。爲風邪所襲。或露臥當風。睡眠濕地。或洗浴乘涼。希圖快意。俱能致之。其患初起時。麻木不仁。次發紅斑久則破爛。浮腫無膿。其症最惡。故曰皮死麻木不仁。肉死刀割不痛。血死破爛流水。筋死指節脫落。骨死鼻梁崩塌。有此五症。俱爲不治。又曰心受之先損於目。肝受之面發紫泡。脾受之偏身如癬。肺受之眉毛先脫。腎受之足底先穿。又爲五敗症也。總皆風濕相乘。氣血凝滯。表裏不和。臟腑痞塞。陽火所變。初起麻木不仁。肌肉未死者。宜萬靈丹洗浴發汗。以散凝滯之風。後服神應養真丹。加白花蛇等分。久服自愈。年久肌肉死者。先用必勝散。疎通臟腑。次服萬靈丹。每日酒化一丸。通活血脉。服至一月。換服苦參丸。輕者半年。重者一載。漸愈。或兼服酒藥。戒房事厚味動風等件。可保不發。

萬靈丹 見講 治大麻風初起。麻木不仁。或既久皮膚破裂。手足拳攣。肢體不便。但未指脫足穿者。

必勝散。治大麻風。血熱秘結。臟腑不通。宜用此藥利之。**大黃** **檳榔** **白牽牛** 各一錢 **粉霜** 五分 右各爲細末。年壯者作五服。中年久虛者作七服。用生薑四兩搗汁。赤砂糖三錢加水一大杯。三味和勻。臨睡時腹中稍空。頓溫通口服之。即睡至三更。徧身麻木如針刺頭目齒縫俱痛。此藥尋病之功已達。行出大小二便。或青白黑黃。又或紅蟲之類。此乃病根也。一月內服藥三次漸痊。眉髮俱生。肌膚如舊。齒縫有血。宜漱後藥。

漱藥方。貫衆 **黃連** 各三錢。水二茶鍾煎至一杯。加冰片少許。每日陸續漱之。其血自止。切忌動風油膩之物。

苦參丸。治大麻風。不分新久。穿破潰爛。老幼俱可服之。**苦參** 一斤 **大楓子肉** 半兩 **荆芥** 半兩 **防風** **白芷** 六錢 **全蝎** **何首烏** **白附子** **枸杞子** **威靈仙** **當歸** **大胡麻** **川芎** **蒺藜** **大皂角** **川牛膝** **牛蒡子** **獨活** 各五兩 **蔓荆子** **風藤** **羌活** **連翹** **蒼朮** **天麻** **杜仲** **草烏** 各一錢 **甘草** 各二兩 **人參** 半兩 **杏仁** 二兩 **白花蛇** 二兩切片去頭 右藥共爲細末。醋打老米糊爲丸。梧桐子大。每服三四十丸。溫酒食前後任下。避風忌口爲妙。

麻風藥酒方。防風 **當歸** **虎骨** **秦艽** **羌活** **苦參** **牛膝** **僵蠶** **松節** **鼈甲** **蒼朮** **枸杞子** **白茅根** 各三兩 **麻子仁** 二兩 用好雪酒二十五斤。將袋盛藥浸酒內封罐口。煮香二枝取起。水內浸一伏時。取服數杯自效。

雄硫散。治大麻風眉毛鬚髮脫落作癢者。宜此藥擦之。雄黃 硫黃 凤凰皮即雞糞變黃
存性各五錢 穿山甲炒黃
一斤 滑石兩 右各爲細末。用半油核桃肉一兩搗爛同公豬膽汁一箇。並前藥和勻。用青紗包藥擦之。日用三次。其髮漸生如舊。

又擦麻風病。面生紫塊疮瘡方。穿山甲燒去毛
一錢 川椒炒研
二錢 右用薑汁土大黃根汁調稠。絹包擦之。如藥乾。加水調擦亦效。忌動風發物等件。

【探究、按語】

此症首見（內經）、（素問）稱爲“大風”，（靈樞）稱爲“癘風”。晉唐以後稱“癩”。明清以來稱爲“麻瘋”。唐「備急千金要方」「千金翼方」「外台秘要」均收載不少治療麻瘋病之處方。宋「三因極一病證方論」首先指出傳染之說。本症屬一種嚴重毀形性傳染疾病，特徵有皮膚麻木不仁，閉汗，起紅堆紫塊等等。一因風土所生，毒風客于肌膚脈絡，中原少有，一因傳染，常接觸患麻瘋病者，或家人遞相傳染，一因自不調攝，洗浴乘涼，露臥當風，濕地睡眠，毒風襲入而發。

初起某一處或遍身麻木，次起日屑紅斑，日漸蔓延，形若蛇皮，脫落成片，始發之時，自上而下延者順，自下而上延者逆。漸漸而來可治，突發者難醫，如風毒入裏，化生爲虫，虫蝕五臟，則形有五損，又有五死之証（見原文）。初發覺時，即服「萬靈丹」汗之，隨以「神應消風散」「追風散」「磨風丸」，次第服之，配以「掃風丸」。牙齦出血時，用黃連，貫衆等分煎湯漱口，外搽「類聚祛風散」，兼用地骨、荆芥、苦參、細辛各二兩，煎湯浸浴薰洗，若遇損敗之証，上部服「醉仙散」，下部服「通天再造散」，鼻樑塌壞服「換肌散」，稍露虛象，即服「補氣瀉榮湯」兼用「何首烏酒」飲之。若能極早發覺，配合治療，或可得痊。今列爲傳染病，有收容場所，必須隔離治療。

翻花瘡五十五

【原文】

翻花者。乃頭大而蒂小。小者如豆。大者若菌。無苦無疼。揩損每流鮮血。久亦虛人。以津調冰蠅散。偏搽正面。上用軟油紙包裹。根蒂細處。用線連紙扎緊。十日後其患自落換珍珠散繆之收口。又有根蒂如鼈頭棋子樣難扎。以前藥搽上。用麵糊綿紙封一二重。用心勿動。十日外亦落。換繆珍珠散。

翻花瘡應用方 冰蠍散_見 珍珠散_見

【探究、按語】

翻花一症，因部位不同，名稱亦異，如生於頭面、四肢、下體等處，較為單純，形小如豆，狀若花朶者，統稱翻花。但一般岩症都會有翻花出現，如腎岩，即名、腎岩翻花、舌疳（岩）、失營（頸岩）、乳岩等，病重末期，瘡潰之後，齧肉由瘡口突出如菌時，皆稱翻花。病因雖多，徐風熱化毒外，重在內因，尤以肝、脾、腎三臟關係較為密切。調治之法，口舌部初服「導赤散」，質弱者服「歸脾湯」，熱甚者「清涼甘露飲」，便溏者「歸芍異功散」加減。頸部服「和營散堅丸」，「加味道遙散」，「益氣養營湯」，「歸脾湯」等均可隨症酌用。腰胯下體腎部服「大補陰丸」或「知柏地黃丸」，兼服「八珍湯」「十全大補」之類。岩症至翻花階段，雖有治法，終非藥力所能挽救矣。

腋癰第五十六

【原文】

腋癰俗稱夾癰。此肝脾二經爲患。肝經血滯。脾經氣凝。共結爲腫。初起皮色不變。漫腫無頭。日久方疼。乃生寒熱。此患難消。終必作膿未破者柴胡清肝湯。已破者十全大補湯。去肉桂加香附陳皮。軟腫脹痛者。針之膏貼。此症首尾溫補。忌用寒涼。

腋癰應用方 柴胡清肝湯_見 十全大補湯_見

【探究、按語】

亦稱夾肢癰，生腋下故名，屬肝脾血熱，或怒火而成。初起暴腫堅硬，焮赤疼痛，或兼身熱，不易消散。初服「柴胡清肝湯」，外敷「沖和膏」，消之不去，疼痛日增，服「透膿散」加銀花、桔梗、甘草，膿成脹痛者剖瀉排膿，瀉後虛者補之「八珍湯」加黃耆、香附、陳皮等調之。此症首尾忌用寒涼。

脇癰第五十七

【原文】

脇癰多從鬱怒肝火而發。肥胖內實者鮮此症。初起宜梔子清肝湯。柴胡清肝湯。解鬱瀉火。已成託裏消毒散。加青皮 香附。膿已成即針之。

勿傷內膜。已破後八珍湯。加丹皮山萸澤瀉。兼滋腎水。如虛勞所得。破流臭水。敗腐稀膿。補托不應者死。

脇瘡應用方：托裏消毒散見瘡門 梓子清肝湯 柴胡清肝湯見月見瘡門 八珍湯見演瘡門

【探究、按語】

亦名穿脇瘡，生於季脇，肋下軟肉處。由情志內傷，肝膽怒火，鬱結而成，體虛之人易於生患。初起腫如梅李，繼則逐漸增大，甚則高如碗漫如鼓，色紅作痛，牽引肩背，身熱不退。及至肉腐成膿，如膿水稠黃，瘡口漸合而癒。如久延不潰，肉透至膜，膿如蟹沫敗漿，腥臭者則逆。初起宜清肝解鬱，散堅消腫「柴胡清肝湯」加銀花蒲公英象貝絲瓜絡，消之不去而釀膿改「托裏消毒散」「透膿散」。潰後膿水稀薄「滋陰除濕湯」加味，膿去正虛者「益胃湯」，陰虛者「六味地黃湯」。此症初起宜清補，釀膿之際宜托補，潰後育陰固本，切忌過用驅毒峻利之藥，伐氣耗血，難于收功也。

鼻痔第五十八

【原文】

鼻痔者由肺氣不清。風濕鬱滯而成。鼻內瘻肉。結如榴子。漸大下垂。閉塞孔竅。氣不宣通。內服辛夷清肺飲。外以硇砂散。逐日點之。漸化爲水乃愈。兼節飲食。斷厚味。戒急暴省房慾。庶不再發。

辛夷清肺飲。治肺熱鼻內瘻肉。初如榴子。漸大下垂，閉塞孔竅，氣不宣通者。辛夷分 黃芩分 山梔分 麥門冬分 百合分 石膏分 知母分 甘草五分 枇杷葉錢 升麻分 水二茶鍾。煎八分。食後服。

硇砂散。治鼻生瘻肉初如榴子。漸大下垂名爲鼻痔也。硇砂錢 輕粉三錢 冰片五厘 雄黃分 右共爲末。用草桔咬毛蘸藥。勤點痔上。日用五六次。自然漸化爲水而愈。

取鼻痔秘方 先用回香草散。連吹二次。次用細銅筋二根。筋頭鑽一小孔。用絲線穿孔內。二筋相離五分許。以二筋頭直入鼻痔根上。將筋線絞緊。向下一拔。其痔自然拔落。置水中。觀其大小。用頭胎髮燒灰。同象牙末等分。吹鼻內。其血自止。戒口不發。

回香草散。回香草。高良薑，曬乾等分爲末。用此先吹鼻痔上二吹。片時許。方行取法。其痔自然易脫。

【探究、按語】

亦稱鼻肉，首載此病者為隋「諸病源候論」。唐「外台秘要」所載方藥，皆為外用，「備急千金要方」中已有內服方劑。宋「聖濟總錄」稱“生若贅疣，故名肉”。實功首創用器械操作摘取手法，且首創用中藥鼻粘膜表面麻碎，與現代手術方法，原理一致。

起因大致在宋以前，以肺經傷于風寒之說為主，明以後都主肺熱為病，或以“燥火內燔，風寒外束”論說，或以肺經濕熱，薰蒸而成。以臨床觀之，因於虛寒者有之，因於實熱者有之，不一而定。如 肉蒼白，涕多清稀，鼻塞遇寒則重，遇暖則輕，鼻膜水腫，時覺癢癢，噴嚏時作，間有肺氣虛寒，營衛不固者，屬虛寒証，方用「溫肺湯」加辛夷細辛川芎等。如 肉紅潤，涕多黃濁，或帶腥臭，鼻塞或兼頭脹頭痛，口渴咽乾，口臭便結者，屬肺胃積熱，方用「辛夷清肺飲」去升麻，加山梔銀花石菖蒲赤芍牡蠣等清熱軟堅散結。外用「硇砂散」，或淡鹽水沖洗。

骨槽風第五十九

【原文】

骨槽風。初起生於耳前。連及腮頸。痛隱筋骨。久則漸漸漫腫。寒熱如瘡。牙關緊閉。不能進食。此得於鬱怒傷肝。致筋骨緊急。思慮傷脾。致肌肉腐爛。高梁厚味。致膿多臭穢。初則堅硬難消。久則瘡口難合。初宜灸艾腫頂。及耳垂下五分。各七壯。膏貼以泄內毒。餘腫用真君妙貼敷之。牙關內腫用線針刺去惡血冰硼散搽之。使內外毒氣得解。宜服降火化痰清熱消腫之劑。潰後當托裏藥中加麥冬、五味。外腐者搽玉紅膏。使水升火降。脾健金清。乃愈。又有外腐不合。虛熱不退。堅腫不消。形憔體削者死。

清陽散火湯。治牙根盡處結腫。連及耳項作痛。名骨槽風也。升麻 白芷 黃芩 牛蒡子 連翹 石膏 防風 當歸 荆芥 白蒺藜一
甘草二 水二茶鍾 煎八分。食後服。

中和湯。治前症已經穿潰。流膿臭穢 痛痛不止者。人參 黃耆
白朮 白芷 川芎 當歸 甘草 桔梗 白芍一 肉桂 麥冬 藿香二
水二茶鍾。薑三片。棗二枚。臨服入酒一杯。食後服。

骨槽風應用方 真君妙貼散 玉紅膏俱見頭門 冰硼散頭門

【探究、按語】

又名穿腮發，生耳前或耳根腮頰之間頰車穴。都由風寒襲入關節筋骨，或少陽

明經風火凝結而成，或由牙齦癰頰癰等久延轉爲此症，故起病急慢都有。初覺耳前腮頰牙關隱痛，皮色不變，繼則漫腫堅硬，牙關開合不利，身起寒熱，紅腫日增，久則內外潰膿，甚則味穢，但腫仍不消，難以癒合，或牙齒搖動，內生多骨，甚者齒與牙床骨脫落。

如起病暴急，患處腮頰漫腫，疼痛劇烈，皮膚紅熱光亮，牙關不利，飲食困難，久則自行穿潰，不易收口，或寒熱如瘡，口渴便秘，舌膩脈洪者，屬胃腸積熱及外感風邪所致，初服「清陽散火湯」或「荆防敗毒散」「仙方活命飲」，但不宜過服寒涼，過寒能使牙關更緊，凝結難癒，膿水腐臭，此時又宜「理中湯」加附子回陽，僵蠶搜風，或「二陳湯」「陽和丸」，體壯實者，潰後可加服「犀黃丸」。

如起病緩慢，初覺耳前腮頰隱隱疼痛，繼而漫腫堅硬，皮色不紅或微紅，牙關不能閉合，經久不潰，潰後膿水清稀，腫塊仍不消退，瘡口不歛，日久並有多骨排出，甚者牙齒脫落，身熱不甚或無熱脈遲舌白者，係陽明氣血不足，風寒乘虛襲入筋骨所致，初服「升陽散火湯」或「中和湯」，如日久不消，瘡頂不熱，形寒怕風舌白者，當用「陽和湯」合加味「二陳湯」溫化，若潰後透骨穿腮者，急用「陽和湯」「犀黃丸」輪服。虛者「十全大補湯」等均可使用。

若牙關拘緊難開者，外用隔薑灸頰車，兼針刺牙齒盡頭處出血少許，則牙關自開。久則必生朽骨，須枯骨脫盡，始得收口。

紫白癥風第六十

【原文】

紫白癥風。乃一體二種。紫因血滯。白因氣滯。總由熱體風濕所侵。凝滯毛孔。氣血不行所致。皆從外來。初起毛竅閉。而體強者。宜萬靈丹。以汗散之。次以胡麻丸常服。外用蜜陀僧散搽擦。亦可得愈。

胡麻丸。治初起皮膚作癢。後發癥風。漸至開大者。 大胡麻黑 防風 威靈仙 石菖蒲 苦參根 白附子 獨活根 甘草蜜 右爲細末。新安酒漿泛丸桐子大。每服二錢。形瘦者一錢五分。食後臨臥。白滾湯送下。忌動風發物海腥煎炒雞鵝羊肉火酒等件。愈後戒百日。

雌雄四黃散。治紫白癥風。皮膚作癢。日漸開大。宜用此搽之。 石黃 硫黃 雄黃 雌黃 白附子 川槿皮根 右爲細末。紫癥醋調用堅槿木毛頭醃藥擦之。白癥用薑切開醃藥擦之。擦後三日。忌下湯水。戒食雞鵝 牛羊煎炒海腥火酒等物。不復發。

肥皂方 皂角 甘松 山柰 白芷桂 蜜陀僧 白附子 檀腦冰片 楠
實子 綠豆粉蜜 右爲細末。用去淨皮弦肥皂一斤搗勻。洗擦患處。日久
自效。

又擦藥方 雄黃 珠砂蜜 右用茄蒂蘸擦患處。如白癩加蛇殼同擦
。

紫白癩風應用方 蜜陀僧散蜜

【探究、按語】

乃一體二種，色紫者稱紫癩風，色白者稱白癩風。

紫癩風 皮膚現紫紅色扁平疹，略高出皮膚，表面光澤，漸漸擴大成斑塊，或有水疱，搔癢甚劇，到處可生，甚則下體，口腔部則常致糜爛。都由濕熱內蘊，外受風邪，風濕熱阻於肌膚所致。屬慢性疾病。方用「消風散」、「胡麻丸」，久而虛者「知柏地黃丸」，癢甚照一般皮膚病加止癢之劑。外用密陀僧加冰片搽擦，口糜者照口腔病調治。

白癩風 隋「諸病源候論」稱爲“白癩”、“白駁”。唐「千金要方」稱“白癩風”等。因毫無癢痛感覺，與皮膚平行，斑色純白，觸摸不著，故常偶而發現，到處可生，漸漸擴大，甚者延及全身，白斑部毛髮皆白，外由風邪相搏於皮膚，內由情志內傷失精等，致令氣血失和，或瘀血阻絡而成。初以「浮萍丸」次以「瘡耳膏」，或「胡麻丸」常服。肝腎不足者「一貫煎」加女貞覆盆防風，配「六味地黃丸」。日久而較重者「通竅活血湯」等選用。外以「密陀僧散」或「肥皂方」搽擦。

齒病第六十一

【原文】

齒病有風有火。亦有陽明溼熱俱能致之。風痛者。遇風發作浮腫。隨後生痛。以消風散治之。火痛者。則齒根必牽扯腮頰。陣陣作痛。時發時止。以冰硼散擦之。出涎自愈。陽明經溼熱作痛者。腮頰浮腫。甚者牽引太陽。疼連頸項。口中氣熱。大便結燥。宜涼膈散加石膏治之。腫高而軟者。內必有膿。用針刺破。出膿自愈。齒齦腐爛。出血不止者。內服犀角地黃湯。外搽人中白散。又小兒鑽齒疳牙根 穿出齒根。內外芒刺。嘴唇作痛。用坡針挑破牙齦。以手取去本牙。出血不止。以溼紙換貼二三次。其血自止。必兼戒厚味。其牙復生如舊。

涼膈散 治陽明經溼熱上攻。致牙根腮頰作腫多痛者。連翹 山梔

黃芩 薄荷錢一 甘草五分 大黃一錢 朴硝五分 石膏二錢 淡竹葉三錢 右水二茶鍾。煎八分。入蜜三匙和勻食遠服。

清中散 治胃經積熱。牙齒或牙齦腫痛。或牽引頭腦作痛。或面熱耳紅。並皆治之。當歸 黃連 生地 山梔錢一 丹皮分 升麻分 甘草五分 右水二茶鍾。煎八分。食遠服。

摹撥散 治風濕蟲牙作腫疼痛。如陽明內熱作疼勿用。摹撥 真阿魏錢一 冰片 麝香錢一 右爲細末每用半豆許。擦放牙根痛縫中。吐去熱涎溫湯漱之。再搽即愈。內有阿魏。恐防作吐。

又牙疼方 勿撥錢一 蟾酥三分 川椒五分 飛鹽三分 右共爲末。用草桔咬毛蘸藥。搽點痛牙根上。

犀角地黃湯 治陽明積熱。牙齦腐爛。出血不止。及諸吐血衄血嘔血。犀角錢一 生地 白芍 牡丹皮等分 每五錢。水二茶鍾。煎八分。不拘時服。面色萎黃。大便黑者。更宜服之。又牙縫中無事出血者亦妙。

止血四生湯 生荷葉 生艾 生柏葉 生地黃錢一 水二鍾。煎一鍾。食後溫服。臨時入童便一盃更妙。

齒病應用方 人中白散四分 消風散四分。

【探究、按語】

牙宣 為齒縫中常見出血或流膿，齒根宣腫或削縮，以致齒根宣露故名，即牙周病。由於胃經客熱久積，外受風邪，或腎虛火升所致。初起牙齦宣腫、齦肉日漸腐頹，久則削縮，以致齒牙宣露，遇風則痛，或牙齦腐臭。如牙齦出血，惡熱口臭，宜服「清胃散」或「犀角地黃湯」。如牙齦惡涼，遇風痛甚者，宜服「獨活散」加減。如牙齦腐臭，齒根動搖者，宜「三因安腎丸」或「八珍湯」、「六味地黃丸」。如牙齦腐臭，時津白膿者「犀角升麻湯」。外用「胡桐淚散」擦之，淡鹽湯漱口緩緩收效。

牙疳 牙齦白腐點點或紅腫出血，腐潰惡臭，疼痛劇烈，來勢迅速，甚則惡寒發熱，均由熬夜或過食辛辣煎炒，脾胃積熱上升爲病，如「清胃湯」、「犀角地黃湯」、「黃連解毒湯」等酌而用之，不時復發者「六味丸」加洋參石斛調理，外擦「冰硼散」。

牙癰 生上下牙床、堅腫疼痛，腮頰浮腫，或身形寒熱，來勢迅速，成膿亦快，亦由陽明胃經積熱所致。初服「荆防敗毒散」或「清胃散」、「仙方活命飲」加減，便秘者下之。紅腫甚而軟者，刺出膿血，搽「冰硼散」。若久不收口，或遇食寒涼，多成牙漏，或生多骨。

牙疔 生兩旁牙縫齦肉，初腫一粒，形若粟米，痛連腮頸，或兼麻癢，身起寒熱。起由胃經火毒，復感四時不正之邪而發，方選「竹葉石膏湯」、「黃連解毒湯」或「五味消毒飲」。膿成挑破，以見血為度，搽「拔疔散」或「鎖匙散」，再以「蟾酥丸」噙化，外用「冰硼散」。若失治，毒反攻心，令人煩躁昏憤者逆。

鑽牙疳 都生小兒，乃牙根肉內鑽出骨尖如刺，疼痛異常，用鉗針就患處割開好肉，連牙齊根取出，血出不止者，濕紙換貼或敷止血藥物，內服「蘆薈消疳飲」，外以「冰硼散」。

腦漏第六十二

【原文】

腦漏者。又名鼻淵。總由風寒凝入腦戶。與太陽溼熱交蒸而成。其患鼻流濁涕。或流黃水。點點滴滴。長溼無乾。久則頭眩虛暉不已。治以藿香湯主之。天麻餅子調之。亦可漸愈如日久虛眩不已。須補中益氣湯。六味地黃丸。相間服之。以滋化源始愈。

奇授藿香湯 治鼻淵黃水。濁涕長流。致腦戶虛眩不已。用藿香連枝帶葉者五錢。水一碗。煎七分。加公豬膽汁一枚和勻。食後通口服之。至重者不過三服。如此藥苦甚不堪服。用藿香末一兩。公豬膽汁熬稠膏為丸。每服二錢食後白滾湯送下亦效。

腦漏應用方 补中益氣湯 六味地黃丸俱用蜜酒 天麻餅子俱用蜜酒 。

【探究、按語】

即鼻淵，又稱腦崩，近稱鼻竇炎，此症最早見於（素問）。生鼻竇，內因膽經之熱，積於腦髓，外因風寒火邪凝結而成，或由胃腸積熱，心腎不足。證見鼻流濁涕，或黃或白，或見穢臭，時感鼻塞，嗅覺失常，頭脹頭痛，神困健忘等等。如涕見黃濁，鼻塞不利，嗅覺失靈，頭脹頭痛者「奇授藿香丸。」、「蒼耳散」加黃芩菊花銀花等。如兼有口渴口臭，脘脹不適者，「涼膈散」「蒼耳散」合用。如兼心煩急躁、鬱悶不舒，易怒脅脹，耳聾耳鳴者、「草龍膽散」加辛夷白芷蒲公英等。外用松花粉噙鼻，或用魚腦石辛夷冰片研末噙之。如纏綿不癒，心煩寐少，心慌氣短，心悸怔忡，健忘盜汗者，「平肝鎮心丹」、「辛夷清肺飲」。久則必虛，當以「補中益氣湯」。陰虛者，「六味地黃丸」。如涕清不臭而只味腥者，屬虛寒，「溫肺止流丹」選用。

破傷風第六十三

【原文】

破傷風。因皮肉損破。復被外風襲入經絡。漸傳入裏。其患寒熱交作。口噤咬牙。角弓反張。口吐涎沫。入陰則身涼自汗。傷處反平陷如故。其毒內收矣。當用萬靈丹發汗。令風邪反出。次以玉真散貼之。得膿爲效。如汗後前症不退。傷處不高。漸醒漸昏。時發時止。口噤不開。語聲不出者。終爲死候。

玉真散治破傷風牙關緊急。角弓反張。甚則咬牙縮舌。
 南星 防風 白芷 天麻 羌活 白附子等分 右爲末。每服二錢。熱酒一鍾調服。
 更敷傷處。若牙關緊急。腰背。反張者。每服三錢。用熱童便調敷雖內有瘀血亦愈。至於昏死。心腹尙溫者。連進二服。亦可保全。若治風犬咬傷。更用漱口水洗淨。搽傷處亦效。

萬靈丹見萬靈丹 治破傷風。牙關緊急。角弓反張。時昏時止者。

鎮風散 治破傷風諸藥不效。事在危急者。用之必應。
 鮑膠切碎 杭粉等分 自礬各一兩 珠砂另研 右爲細末。每服二錢。無灰熱酒調服。一切豬羊等風。發時昏倒。不醒人事者。每服三錢。二服即愈不發。外灸傷處七壯。知疼痛者。乃爲吉兆。

【探究、按語】

破傷風一症，隋「諸病源候論」已有較詳細之敘述。其特徵爲神智清楚，有連續性或間歇性之肌肉痙攣，所見爲牙關緊閉，口撮唇緊，身體強直，角弓反張，或口吐涎沫，不省人事，先起身熱等。由外傷後，風邪襲於經絡，漸侵入裏所致。

如見傷口周圍燥起白痂，瘡不甚腫或瘡口平而流汁，牙關微緊，有失常態者，即是破傷風之預兆。如風邪在表，寒熱拘急，口噤咬牙，宜服「玉真散」「萬靈丹」或「千里奔散」「蜈蚣星風散」選用。如邪已入裏，驚恐抽搐，大便秘瀉者，宜「江鱗丸」「存命湯」加減，裏熱不清者，「括石湯」，熱甚汗出口渴者，「白虎熄風湯」。如在半表半裏而無汗，宜「羌麻湯」汗之，若頭汗多而身無汗，則不可再汗，宜「榆丁散」和之。如表後汗出不止，宜「防風當歸散」。如痰盛抽搐身涼者，「黑花蛇散」加減。如病發迅速，角弓反張，時時抽搐，面色青紫，汗出如油，氣息如絕，或高熱昏迷，脈浮大而數，或亂、或沉者，邪已深陷入裏，欲脫之象，選用「參附湯」「生脈散」或「獨參湯」。又「玉真散」一方，爲破傷風通治之

劑，不論初起或已發癰，內服外敷都可應用。

跌撲第六十四

【原文】

跌撲者。有已破未破之分。亡血瘀血之故。且如從高墜墮。而未經損破皮肉者。必有瘀血。流注臟腑。人必昏沈不醒。二便必難。當以大成湯。通利二便。其人自甦。不醒者獨參湯救之。尋常墜墮。輕者以復元活血湯調之。又如損傷骨節。筋斷血流不止者。獨勝散止之。次用花蕊石散搽之。又有跌斷骨節等症。另有專門接骨扎縛。此未及詳。

大成湯 治跌撲傷損。或從高墜下。以致瘀血入臟腑。昏沈不醒。大小便秘。及受杖後瘀血內攻。肚腹膨脹。結胸不食。惡心乾嘔。大便燥結者。
陳皮 當歸 蘇木 木通 紅花 厚朴 甘草錢一 枳殼錢一 大黃錢一 朴硝錢一 右水一碗。煎八分。不拘時服。服後一時不行。渣再煎。臨臥服。加白蜜三匙亦妙。

調中二陳湯 治前症已服行藥之後。當進此藥。二三服調之。
陳皮 半夏 茯苓 甘草 紅花 川芎 當歸 白芍錢八 防風 檳榔 黃耆 桔梗 青皮 烏藥 蘇木 枳實 黃芩 紫蘇錢六 木香三分 水二茶鍾。薑三片。棗二枚。煎八分。不拘時服。

獨參湯 治跌撲損傷。或金瘡出血過多。昏沈不醒者。人參一兩切片。水二碗。煎一半。不拘時通口服之。渣再煎服。其人自甦。再用渣加川米一合。煎湯溫服。

花蕊石散 治跌撲傷損。及金瘡刀瘡箭兵刃所傷。斷筋損骨。疼痛不止。新肉不生者。
乳香 沒藥羌活 紫蘇 細辛 草烏 蛇含石便服一錢次 厚朴 白芷 降香 當歸 蘇木 擦香 龍骨 南星 輕粉錢二 麝香三分 花蕊石便服七錢次五錢 右共研極細。罐收聽用。葱湯洗淨。用此繆之。軟綿紙蓋扎。一日一換神效。此藥一時未備。可用多骨疽門生肌散代之。亦可取效危急也。

玉紅膏 治跌撲損傷。或金瘡斷損筋骨。已經血止。疼痛作膿。宜葱湯洗淨。用此膏日搽傷處。黑膏蓋之。

【探究、按語】

已破 指由外來暴力使皮膚破損、創口流血、有輕重之別，如擦傷、裂傷、

割傷、刺傷等等。傷破應防破傷風。

未破 亦稱挫傷，指皮肉受傷而不破皮者。

亡血 是傷後皮肉未破，而體內血逆妄行、傷血自諸竅溢出體外，稱為亡血，又稱失血。

瘀血 是傷後血離經脈之外，留滯體內，而成為瘀血停滯。

傷筋 是指關節附近之韌帶因關節活動過度，受到外力作用，超過其正常活動範圍而引起之損傷。大致分斷裂與不斷裂二類，所見為運動障礙、局部腫脹及皮膚色青。治療原則都以手術為主。

傷骨 即骨骼受傷，再分輕傷重傷二類，重傷又有骨裂骨碎骨斷之分。傷損應由專科（傷科）醫師處理。

金瘡第六十五

【原文】

金瘡乃刀刃所傷。或有磁鋒割損。淺者皮破血流而已。深者筋斷血飛不住。皮破者。桃花散繆之。其血自止。筋斷者。如聖金刀散繆扎。止而又流者。急用玉紅膏塗傷處。骨盡骨肉方斷。斯人面色必黃。外避風寒。內忌冷物。終保無妨。有失血過多者。獨參湯八珍湯補助為要。此外無法矣。

如聖金刀散 治刀刃所傷。皮破筋斷。飛血不止者。用松香淨末七兩。枯礬生礬各一兩五錢。共為極細末。罐密收。繆傷處。紙蓋絹扎。止後三四日。必掀痛作癟。換繆生肌散。三日三次。其疼即止。以後日用葱湯洗之。換搽玉紅膏。長肉生肌。避風為要。

桃花散 治金瘡出血不止。用石灰半升。大黃一兩五錢。切片同炒。石灰變紅色為度。去大黃。篩細繆之。紙蓋絹扎。止血後。用葱湯洗淨。換搽玉紅膏。長肌收斂。兼戒口味房事為要。

金瘡應用方 獨參湯_{歸脾} 八珍湯_{歸脾}。

【探究、按語】

即跌撲中之已破傷，如割傷、刺傷、穿入傷等。

杖瘡第六十六

【原文】

杖瘡乃良肉受傷。有已破未破之分。已破肌肉者。以清涼拈痛膏敷之。疼腫即消。未破。瘀血內攻者。用針放出內蓄瘀血。再以大成湯下之。便通自愈。如傷處瘀癥已作疼痛者。玉紅膏搽之。自然腐化生新而愈。至於辱刑重刑難受之時。宜預服鐵布衫丸。方得保身全也。

鐵布衫丸 治情不由己。事出下處。受害一身。重刑難免。當預服之。受刑不痛。亦且保命。
 自然銅每七次 當歸酒洗 無名異去上乳香木鼈子 乳香 木鼈子
香油擦敷上灰培用 肉除除此是土木薯 沒藥 地龍酒浸 蘇木 右八味各等分。爲細末。煉蜜丸如雞頭實大。每服三丸。預用白湯送下。縱非刑辱拷。可保無虞。

散瘀拈痛膏 治杖後皮肉損破。紅紫青斑。掀腫疼痛。重墜者。用腫瘍門如意金黃散一兩。加樟冰三錢碾勻。以白石灰一升。用水二碗和勻。候一時許。將灰上面清水。傾入碗內。加麻油對分。以竹節攪百轉。自成稠膏。調前藥稀稠得所聽用。杖後帶血。不用湯洗。將藥通敷。紙蓋絹扎。夏月一日。冬月二日。方用葱湯淋洗乾淨。仍再敷之。痛止腫消。青紫即退。傷重者另搽玉紅膏完口。

大成湯 治杖後瘀血內攻。肚腹膨脹。惡心便秘者。

珍珠散 治杖瘡已經長肉平滿。惟不生皮。用此搽之。

【探究、按語】

受杖刑責打而傷、亦分已破未破、參考跌撲。

竹木刺第六十七**【原文】**

竹木刺乃外入之患。有軟硬之分。淺深之異。軟淺者。以針頭撥見刺形。拔出則愈。硬深難出者。用蠟燭搗爛塗上。過一時許。其刺自然吐出。取去則愈矣。

花蕊石散 治竹木刺傷。腫痛流膿。以葱湯洗淨。用此糁之。

【探究、按語】

終以取出爲妙，亦應注意破傷風。

湯潑火燒第六十八

【原文】

湯潑火燒。此患原無內症。皆從外來也。有湯火熱極。逼毒內攻。又有外傷寒涼。攻毒入裏。外皮損爛者。以清涼膏粟殼膏塗之。毒氣入裏。煩躁口乾。二便秘澀者。四順清涼飲下之。泡破。珍珠散搽之自愈。

四順清涼飲 治湯潑火燒。熱極逼毒入裏。或外被涼水所浸。火毒內攻。致生煩躁。內熱口乾。大便秘實者。連翹 赤芍 羌活 防風 當歸 山梔 甘草 大黃 水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。食遠服。

麝粟膏治湯潑火燒。皮肉損爛。疼痛焮熱。起泡流水者。麻油四兩。麝粟花十五朵。無花以殼代之。浸油內煎枯濃清。將油再入杓內。下白蠟三錢熬花。傾入罐內。待四邊將凝時。下真輕粉細末二錢攪勻。水內頓冷取起。臨用將泡挑破。用抿腳挑膏。手心中搽化。搽患上。軟綿紙蓋扎。日換二次。其疼即止。次日。將軟帛浥淨腐皮。再搽之自愈。

珍珠散 治湯潑火燒。腐皮已盡。疼痛已止。用此糁即愈。前杖瘡門中石灰水調麻油成膏。即清涼膏也。搽湯潑火燒亦效。

【探究、按語】

唐「備急千金要方」首論燙傷不得冷洗“火瘡得冷，熱氣更深轉入骨，壞人筋骨難瘥”。明朝以前多限於外治，明以後始內外合治，實功且首次公開「清涼膏」，用乳劑外治。至清「洞天奧旨」確指“治火燒之症”，必須內外兼治“而內治又必須用托藥，則火毒庶無內攻之虞”，其證治原則始定。

燙傷如未起水泡，祇紅腫熱痛，面積不大稱輕傷，如滾油烈火則立起水泡紅腫，皮開肉爛，面積較大者，每見火毒攻裏，擾亂心神，煩躁不安，二便不通，噁心嘔吐，神志昏迷者，已入險境，危及生命，總之被燙面積達全身三分之一者，燙處雖輕，已屬危險，如滿全身之半或過半以上者，往往不治。

治法：如皮膚烙泡，大者刺破出水留皮，小者不刺，用「清涼膏」塗敷，或生地榆合生大黃研末乾摻或麻油調敷，如疼痛不止「麝粟膏」塗之，如腐爛或有化膿之象者，貼「黃連膏」，如流水不斂者，用「珍珠散」合「玉紅膏」塗之，忌用冷水或冰塊塗敷，內服著重利水，瀉多而清者吉，短少而赤或無者凶，神昏氣喘者不救。若火毒內攻而有全身證候者「四順清涼飲」，如昏昏欲睡，面色蒼白，呼吸短促，口淡紫體溫反低，四肢厥冷，脈細或大而無力者，選「參麥散」合「參附湯」、厥脫重者「參附龍牡救逆湯」，如高熱汗多，氣粗口渴，頭痛煩躁，甚或譖語，驚厥抽搐，脈洪而數者，選「白虎湯」、「黃連解毒湯」、「清營湯」合用。如神昏譖語，或抽搐不止、頸項強直、脈細數者、「清營湯」合「犀角地黃湯」或「安

宮牛黃丸」、「至寶丹」加減選用。

甲疽第六十九

【原文】

甲疽者。或因甲長侵肌。或因修甲損傷良肉。或靴鞋窄小。俱能生之。其患筋肉裏上指甲。腫痛異常。難於步履。初宜三品一條槍貼筋肉上。化盡自愈。日久筋肉堅硬。須冰蠅散化之。後用珍珠散繆上必癒。

甲疽應用方 三品一條槍見專門 珍珠散見專門

【探究、按語】

隋「諸病源候論」首載此症。又稱嵌指。生於足趾周圍，尤多見于大趾。起因都由割嵌指甲或剔甲傷肉，或甲長侵肉，或穿窄鞋小碰壓之傷，且兼內積濕熱而起。初覺甲旁壓痛，繼則掀腫破爛，時津黃水，胬肉高突，痛楚難忍，不能著地穿鞋，甚者久久不癒。宜用鹽湯溫洗。外敷「華陀累效散」久者「珍珠散」，白膏蓋貼。如有舌膩濕重或洩赤便結等證，內服泄濕清裏，利水潤腸等藥，如「五神湯」、「導赤散」等選而用之，配合休息，始得胬消瘡合而癒。

繭脣第七十

【原文】

繭脣乃陽明胃經症也。因過食煎炒炙燉，又兼思慮暴急。痰隨火行。留注於脣。初結似豆。漸大若蠶繭。突腫堅硬。甚則作痛。飲食妨礙。或破而流血。久則變為消渴消中難治之症。初起及已成無內症者。用麻子大艾炷灸三壯。貼蟾酥餅膏蓋。日久漸消。內症作渴者。早服加減八味丸。午服清涼甘露飲。以滋化源。日久流血不止。形體瘦弱。虛熱痰生。面色黧黑。腮頰紅現。口乾渴甚者。俱為不治之症。

清涼甘露飲 治膏梁所釀。暴怒所致。結成繭脣。高突堅硬。或損破流血。或虛熱生痰。或渴症久作。犀角 銀柴胡 茵陳 石斛 枳殼 麥門冬 甘草 生地 黃芩 知母 枇杷葉一 水二茶鍾。淡竹葉燈心各二十件煎八分。食後服。

繭脣應用方 加減八味丸見專門 蟾酥餅膏見專門

【探究、按語】

此症最早見「內經」，經云，脾之榮在唇，但燥則乾，熱則裂，風則潤，寒則揭、若腫起、白皮皺裂如蠶繭，故定名曰蘭脣也，其名沿襲至今，屬唇部慢性疾患，如久久不癒，甚則翻花，時流惡臭血水者，預後不良，後期如見消渴症者，更屬難治。起由脾胃積火而成，久則脾熱及腎。初起結如豆粒，漸漸長大若蠶繭，白皮皺起，堅硬疼痛，妨礙飲食，時或乾裂出血。如無內證者，用「蟾酥餅」貼之，「陀僧膏」蓋之，日久漸消，如兼口渴者「清涼甘露飲」若面赤口唇燥裂便秘者，宜「涼膈散」，若日輕夜重，五心煩熱，兩顴現紅，脈虛數無力者，宜「加減八味丸」，如伴消渴證狀者，參照消渴治法。如潰後成翻花狀，血水穢臭者，參照岩瘤用藥。

唇部皮膚嬌嫩，又屬燥熱之症，艾灸之法，今人已棄而不用，僅用藥物敷貼。

痞癧第七十一

【原文】

痞癧皆緣內傷過度。氣血橫逆。結聚而生。初起腹中覺有小塊。舉動牽引作疼。久則漸大成形。甚者翕翕內動。斯時必氣血衰弱。飲食減少。內服阿魏化痞散。外貼乾坤一氣膏。祛邪養正。自可全安。

阿魏化痞散 川芎 當歸 白朮 赤茯苓 紅花 阿魏 龜甲尖
蘇子研各一錢 大黃酒炒八錢 薏麥麵微炒 右共爲末。每服三錢。空心好酒一茶鍾調稀服。
 三日後腹痛。便出膿血爲驗。忌生冷油膩等件。

乾坤一氣膏 此膏專治痞疾。毋論新久。立效。又治諸風癱瘓。溼痰流注。各樣惡瘡。百般怪症。男子夜夢遺精。婦人赤白帶下。又男女精寒血冷。久無嗣息者。並貼之。 當歸 白附子 赤芍 白芍 生地 熟地 穿山甲 木鱉肉 巴豆仁 麻仁 三稜 蓬遜 五靈脂 繢斷 肉桂 元參各一錢 乳香 没藥各一錢 麝香三錢 真阿魏片乾用二兩切薄右用香油五斤。除乳沒麝魏外。餘皆入油浸。春三夏五。秋七冬十。期畢桑柴火熬至藥枯。細絹濾清。每淨油一斤。配飛丹十二兩。將油入鍋內下丹。槐枝攪令成膏。攢下鍋來。用水盆坐聽漸下阿魏片。泛化已盡。方下乳末麝香。再攪勻乘熱傾入瓷罐內。分三處盛之。臨用湯中頓化。痞癧紅綵攢貼。餘病綾綢俱可攢之。有腫者對患貼之。男子遺精。婦人帶下。患貼丹田。諸風癱瘓。貼腎俞穴並效。

【探究、按語】

結腫而隨喜怒消長者，謂之瘤，氣瘤亦有此特徵。瘤癧者，應指腹腔或腹壁之腫瘍而言，如有紅腫熱痛而消之易散，易潰易歛，病程短者，屬陽易治。如皮色不變，痛不明顯，漸漸長大，難消不潰，病程較長，氣血衰弱，飲食減少者屬陰，難治，可能為惡性腫瘤之屬。

天蛇毒第七十二**【原文】**

天蛇毒一名蛇頭疔。乃心火旺動。攻注而成。其患指大若蛇頭。赤腫掀痛。甚者疼至連心。寒熱交作。或腫痛延上。宜用小艾灸五壯以雄黃散塗之。內服蟾酥丸。發汗解毒。輕者漸消。腫者潰膿。甚則腐爛。破後腫仍不消者。以蟾酥條插入孔內。膏蓋自效。腐爛者玉紅膏搽之。虛而不歛者。兼服補劑。

雄黃散 治天蛇毒初起。紅腫發熱。疼痛徹心者。雄黃明亮者三錢 蟾酥浸者二分
冰片分 輕粉分 共為細末。新汲水調塗紙蓋。日用三次極效。

天蛇毒應用方 蟾酥丸翳 玉紅膏見頭

【探究、按語】

即蛇頭疔，位在手指頭尖端，屬心脾積熱而成，竹木刺傷而患者亦復不少。指端皮堅連骨，氣血本難周榮，患則掀腫劇痛，不散而成膿後，非但不易潰破，每易內損筋骨，甚則指節腐脫。治法參考疔瘡。疔瘡屬純陽之症，火毒之候，艾灸非所宜也。

頭痛第七十三**【原文】**

頭痛者。風火溼痰。四者皆能致之。又楊梅瘡毒上攻。或婦人產後梳洗。當風太早。亦能致之。名曰頭風。宜用後方。毋論病之新久。受之真似。並效。

天麻餅子 治頭痛。因風火溼痰上攻。及楊梅瘡毒所致。兼治頭目昏眩。項背拘急。肢體煩痛肌肉蠕動。耳哨蟬鳴。鼻塞多嚏。皮膚頑麻。瘻

癰癧疹。又治婦人頭風作痛。眉棱骨疼。牙齒腫痛。痰逆恶心。天麻草烏
湯泡去皮 川芎 細辛 蒼朮 甘草 川烏
湯泡去皮 薄荷 甘松 防風 白附子
皮 白芷
去皮 雄黃 全蝎
去頭足 右爲細末。寒食麵打糊搗稠如寒豆大。捏作餅子。每服二三十餅。食後細嚼。葱頭湯送下。屬火熱痰痛者。茶湯下。甚者日進二服。忌諸般發物。

三聖散 治男婦頭痛。不論偏正新久。但夏月欲重綿包裹者並效。
鴟楊花
淨洗 檸樹花
淨洗 大楓子肉
去核 共研。每服六分。葱酒調服。洗浴發汗自愈。

【探究、按語】

頭痛有正偏之分，種類繁多，除風火濕痰，瘡毒上攻，產後當風外，如受傷、瘀血、腫瘤等都能引起頭痛，應審證求因，參考內科之法，分別調治。

合谷毒第七十四

【原文】

合谷疔。俗稱虎口百了。此患多有疙瘩泡起。亦有紅絲走上。故有疔名。乃手陽明胃經溼毒攻注。癢熱掀疼。初起挑破。貼蠟酥餅膏蓋。金黃散敷之。三日後腫聚。必欲作膿。換膏貼之。軟腫脹痛者。膿已成。針之即愈。腫甚寒熱者。必內外消托。

合谷毒應用方 如意金黃散
去皮 蠟酥餅膏

【探究、按語】

又名虎口疔，生於手大指、次指岐骨間，因位於手陽明經合谷穴，故名合谷疔。主因由臟腑積熱，外傷染毒，濕火凝結而成，此處患瘍，多起快而成膿速。初發如粟米小泡，熱癢痛，重者數日後即腫及掌背，漸漸釀膿，身起寒熱，此疔往往在已成未熟之時，引起紅絲游走，上竄臂腋，故又有紅絲疔之名，自宋朝以後都載，由毒氣走散，流注經絡所致，凡見紅絲走「竄」，如箭之速者，皆可稱之。

患處以「離宮錠」外塗，內服解毒消托，如「仙方活命飲」、「黃連解毒湯」、「五味消毒飲」等選用，能消則消，成膿者希能極早穿潰，膿得泄，則腫退痛除而痊。如見有紫絲或紅絲者，以針挑斷絲頭，或用「千搥膏」蓋貼絲頭，並刺商陽穴（食指內側指甲角旁），其絲自退，其他參考疔瘍。

鼻出血第七十五

【原文】

鼻中出血。乃肺經火旺。逼血妄行。而從鼻竅出也。外用紫土散敷顙頂上。內服羚羊清肺湯。亦可自止。

羚羊清肺湯 治鼻中無故出血不止。及尋常吐血咳血並效。**羚羊角**
黃連 **銀柴胡** **元參** **石膏** **川芎** **歸身** **白芍** **生地** **蒲黃** **地骨皮** **山梔**
蘆薈 **甘草**^{各五錢} **藕節**^{一兩} **白茅根**^{四兩} 水煎一盞和絃去渣 用茅根汁一大碗。
 煎七分。入童便一杯。食後服。

紫土散 治鼻中無故出血不止。用傾銀紫土新罐碾細。以火酒調敷顙門上。其血自止。此從治之法也。

【探究、接語】

鼻中出血（鼻衄），乃肺經火旺，逼血妄行也，又如熱病，過食辛辣煎炒亦能致衄。內服「羚羊清肺飲」、「大薊散」或「喻氏清燥救肺湯」加丹皮茅根藕節茜草等。外用「水金散」或「鼻衄特效方」「烏賊骨散」吹入，或冷敷鼻根前額，亦屬一法。其次應注意能引起鼻衄之周身疾患。如外感熱病時，少量鼻血不僅無害，衄則熱隨血散。能使病邪外解。「傷寒論」有“衄乃解”“自衄者愈”之說，但血多則亦能血亡氣脫而涉險。

牙縫出血第七十六

【原文】

牙縫出血。陽明胃經。實火上攻而出也。又有胃虛火動。腐爛牙齦。以致淡血常常滲流不已。實火宜服清胃散。並用棟果裹塞之。虛火宜服蘆薈丸。並用人中白散搽之自愈。

清胃散 治胃經有熱。牙齒或牙齦作腫。出血不止。**黃芩** **黃連**
生地 **丹皮** **升麻** **石膏**^{一錢} **水二茶鍾**。煎八分。食後服。

棟果裹 治陽明胃經實火上攻。血從牙縫流出。用棟樹果二箇。連肉核搗爛。絲綿包裹。先用溫湯漱淨瘀血。塞於牙縫內。其血自止。

牙縫出血應用方 **蘆薈丸** **人中白散**^點

【探究、接語】

牙縫出血（牙衄），由胃經積熱而成。當分虛實、實熱者，血出如湧，口必臭

而牙不動搖，宜「清胃湯」，甚者「調胃承氣湯」。虛火者，牙齦腐爛、淡血滲流不已，宜「二參湯」或「補中益氣湯」加黃連、丹皮、若腎經虛者，血點滴而出，牙亦微痛，口不臭而牙動，或落，治宜滋腎，有火者「六味地黃丸」無火「七味地黃丸」。外用「小薊散」擦牙。其次應注意能引起牙齦之周身疾患。

血箭血痣第七十七

【原文】

血箭出於心經火盛。逼血從毛竅出也。血痣由於肝經怒火鬱結。初起色紅如痣。漸大如豆。揩之血流。治血箭以桃花散。涼水調敷。或金黑塗之自止。血痣須用冰蠍散枯去本痣。以珍珠散搽之。生皮乃愈。血甚者。內服涼血地黃湯。兼戒口味始痊。

涼血地黃湯 治血箭血痣。內熱甚而逼血妄行。出血如飛者。 黃連 當歸 生地 山梔 元參 甘草^{等分} 水二茶鍾。煎八分。量病上下服之。

血箭血痣應用方 桃花散^{翳門} 冰蠍散^{見瘡門} 珍珠散^{指門}

【探究、按語】

出血皆血熱妄行也，如以分經論治而言，心經火盛者，應屬舌齦，參考鼻齦牙齦治則，審証求因，總以清熱涼血為旨，實則兼瀉，虛則兼補。



卷十一

鵝掌風第七十八

【原文】

鵝掌風由足陽明胃經火熱血燥。外受寒涼所凝。致皮枯槁。又或時瘡餘毒未盡。亦能致此。初起紫斑白點。久則皮膚枯厚破裂不已。二礬湯薰洗即愈。

二礬湯 治鵝掌風皮膚枯厚。破裂作痛。宜用此湯薰洗。輕則不宜。越重越效。 白礬 皂礬四 孩兒茶五 柏葉半 用水十碗。同上藥四味煎數滾。先用桐油搽抹患上。再以桐油蘸紙燃點著。以煙燄薰片時。方將前湯乘滾貯淨桶內。用布蓋好。將手伸入。以湯薰之。勿令泄氣。待微熱傾入盆內。薰洗良久。一次可愈。七日忌下湯水。永不再發。

【探究、按語】

生於手掌心，乾裂如鵝掌故名。由於外受風毒，凝聚肌膚、血燥不能榮潤、或因脾胃火熱，或因梅毒餘毒未盡而成。初起掌心燥癢，繼則疊起白皮，堅硬且厚，搔癢難忍，皮膚枯槁，甚則燥裂作痛，屈伸不利，如不醫治，年深日久者難治。如因血燥生風而起者，宜用桐樹子煎汁薰洗，並用「紅油」烘熱外擦、內服「祛風地黃丸」、由梅毒引起者用「二礬湯」煎洗、擦「三油膏」服「搜風解毒湯」。

腎囊風第七十九

【原文】

腎囊風乃肝經風溼所成。其患作癢，喜浴熱湯。甚者疙瘩頑麻。破流脂水。宜蛇床子湯薰洗。二次即愈。

蛇床子湯 治腎囊風溼熱為患。疙瘩作癢。搔之作疼者。 蛇床子 當歸尾 威靈仙 苦參五 水五碗。煎數滾。入盆內先薰。待溫浸洗。二次即愈。

狼毒膏 治症同前。狼毒 檳榔 硫黃 五倍子 川椒 楓子肉 蛇床子半 右為末。用香油一大杯煎滾。入皮硝三錢再煎滾。次下公豬膽汁一個和勻。調前藥搽擦。此藥諸癢瘡用之並效。

【探究、按語】

係腎囊作癢，又名繡球風。由肝經濕熱，風邪外襲，或久坐濕地，久坐曬熱之椅墊等亦能生之。初起乾燥癢極，喜浴熱湯，或起疙瘩，搔破則脂水浸淫，皮熱痛如火燎者屬熱甚，服「龍膽瀉肝湯」。外用蛇床子煎湯薰洗，或以「苦參湯」外洗，洗後擦「狼毒膏」，皮膚乾燥者「潤肌膏」。

疥瘡論第八十

【原文】

夫疥者。微芒之疾也。發之令人搔手不間。但不知其何以生者。疥曰吾不根而生。無母而成。乃稟陰陽氣育。溼熱化形。常列於王侯掌上。何妨士庶之身。可使文人怕筆。繡女停針。毋分貴賤。一例施行。醫問曰。不生於身，獨攻於手者。又何也。疥曰手掌乃太陰溼土所主。手心又少陽相火所司。土能生我。火能化我。此生皆賴溼土陽火所化。故生者必出於手掌。醫曰然哉。但其形知動而不知靜。能進而不能退。自非清氣所化也。又脾主消納。胃主傳化。人之飲食。未有不從厚味者。厚味之中。溼熱並化。致生此瘡。又清氣隨脈循行。濁氣留滯不散。停留肌膚。積日不解。隨後生熱發癢。故癢熱之中。溼火混化爲蟲。形隨溼化。動隨火化。此無情而若有情也。既化之後。潛隱皮膚。展轉攻行。發癢鑽刺。化化生生。傳遍肢體。近則變爲疥癬。久則變成頑風。多致皮膚枯槁。浸淫血脈。搔癢無度。得湯方解。是宜外以繡毬丸。搽擦。止癢殺蟲。內服消風散。散風涼血。兼戒口味。辛熱莫啜。忌洗熱湯。其煩自脫。此爲小恙。不當陳說。間中之言。隨筆而白。

消風散 治風濕浸淫血脈。致生瘡疥。搔癢不絕。及大人小兒風熱癰疹。遍身雲片斑點。乍有乍無並效。 當歸 生地 防風 蟬蛻 知母 苦參 胡麻 荆芥 蒼朮 牛蒡子 石膏一錢 甘草 木通五分 水二茶鍾煎八分。食遠服。

當歸飲子 治血燥皮膚作癢。及風熱瘡疥搔癢。或作疼痛。當歸 川芎 白芍 生地 防風 白蒺藜 荆芥 何首烏一錢 黃耆 甘草五分 水二茶鍾。煎八分。食遠服。

繡毬丸 治一切乾溼疥瘡。及膿窠爛瘡。搔癢無度者。 檀冰 川椒

枯礬 輕粉 水銀 雄黃二錢 楓子肉一錢 以上共爲細末。同大楓子肉再碾和勻加柏油一兩化開。和藥攪勻。丸作圓眼大。於瘡上擦之。

諸瘡一掃光 治瘡瘡不論新久。及身上下。或乾或溼。異類殊形。但多瘡少痛者。用之俱各有效。苦參 黃柏三錢 煙膠半錢 木鱉肉 蛇床子點紅椒 明礬 硫黃 楓子肉 檀冰 水銀 輕粉三錢 白砒一錢 共爲細末。熟豬油二斤四兩。化開入藥攪勻。丸作龍眼大。瓷瓶收貯。用時搽擦二次即愈。

洗瘡瘡方 苦參半斤切片。用河水三四瓢。煎藥數滾。參水二瓢。住火片時。濾去渣。和公豬膽汁四五枚。攪勻淋洗。三日一洗。三次亦可痊愈矣。

【探究、按語】

公元前十四世紀，甲骨文已有“疥”之象形文字。晉「肘後備急方」已有治療藥物。隋「諸病源候論」敘述更詳，已分大疥、濕疥，且指“并皆有蟲、狀如水內瘡蟲”。

生於皮膚，但往往手丫手腕腰褲、皮膚「皺」折之處較甚。皆由蘊毒積久，外受風濕、或傳染所致，此症傳染力特強，故大都由傳染而生。有乾疥、濕疥、蟲疥、砂疥、膿疥之分，乾疥搔癢皮枯而起白屑，濕疥 腫作痛，破津黃水或滲黑汁，蟲疥搔癢徹骨，撓不知痛，砂疥形如細砂，赤癢痛，一則滲水，膿疥形如豆粒，膿清淡白，或含稠膿。初起有餘之體「防風通聖散」加減。虛者「荆防敗毒散」透之，乾疥「消風散」，濕疥「蒼朮膏」，蟲疥「蘆薈丸」，砂疥「犀角飲子」、膿疥「秦艽丸」、血燥者「當歸飲子」等選用。此症外治爲主，內治爲輔，「繡球丸」、「臭靈丹」、「一掃光」、「合掌散」、「洗瘡瘡方」，都具療效。又硫黃爲我國最早應用滅疥之藥物。

臍瘡論第八十一

【原文】

臍瘡者。風熱溼毒相聚而成。有新久之別。內外之殊。新者只用三香膏。乳香法紙。貼之自愈。稍久紫黑者。以解毒紫金膏。搽扎漸可。年久頑臍皮肉烏黑下陷。臭穢不堪者。用蜈蚣錢法。去風毒。化瘀腐。方可得愈。外臍多服四生丸。內臍多服腎氣丸。

三香膏 治臍瘡初起。多疼少癢。未經受風紫黑者。 乳香 松香

輕粉膏 右爲細末。香油調稠。用夾紙一面。以針密刺細孔。將藥夾搽紙內。先以葱湯洗淨。將紙有孔一面對瘡貼之。三日一換自效。忌房事煎炒等件。

乳香法紙 治臙瘡作痛不愈。先碾乳香細末一兩聽用。以呈文每紙四張。每紙一張攤平。用乳香二錢五分。細攤平紙上。雙折捲一寸闊。將捲紙復作三條。外用以綿扎之。用甘草一兩二錢。水三碗。將捲過藥紙。浸入甘草湯內。上用重物壓之。煮數滾。取起紙來。解去扎線。將紙攤開桌上。每張用輕粉三錢。繆乳香上用櫟糊刷排刷令勻。提起藥紙。帶溼以無藥一面。對板壁上貼之。陰乾收用。臨時隨瘡大小。剪紙多少。先用溫湯洗淨。隨將紙有藥一面對瘡貼之。絹扎。三日一換。自然止痛生肌。如貼後內無水出。不必換貼自愈。

蜈蚣餌 治臙瘡多年黑腐。臭爛作疼。諸藥不效者。用桐油二兩。獨活白芷甘草蜈蚣各一錢。入油內煎滾。先將臙瘡洗淨。用白麵水調作圈。圍在瘡之四邊。毋令泄氣走油。將腳放平。以茶匙挑油。漸漸乘熱加滿待油溫取去。已後腐肉風毒。自然脫下。用解毒紫金膏搽上。紙蓋絹扎。三日一換。

解毒紫金膏 治臙瘡母論新久。及頑瘡年久不愈者。

四生丸 治外臙血風頑瘡。骨節疼痛。不能舉動。或行步不前。或渾身癢癉。或麻痺不仁。或生斑疹。地龍去皮尖泡者等分 僵蠶炒去頭足 白附子 五靈脂草烏

右爲細末。米糊丸桐子大。每服三四十丸。食前茶酒送下。

臙瘡應用方 腎氣丸

【探究、按語】

小腿內外廉骨處潰爛難歛之疾稱爲「臙瘡」。都由外傷或外瘍成潰不愈，內積濕熱而成。

初起搔癢或腫，繼則破爛，滋水淋漓，日久不愈，瘡口下陷，邊緣高起，瘡面灰黃或紫紅，滋水穢濁，周圍皮膚紫黑。大致色紅烘熱者都屬熱，腫者都屬濕，癢者屬風，痛者屬實，早輕暮重者屬氣虛。

初起治宜清熱利濕解毒、「五神湯」合「二妙丸」或「四妙丸」化裁。日久宜氣血雙補「補中益氣湯」、「六味丸」選用。外治初宜貼「三香膏」、色紫貼「夾紙膏」、日久瘡色紫黑者貼「解毒紫金膏」，如年久瘡頑、瘡皮烏黑下陷、臭穢不堪者，用「蜈蚣餌」，去風毒、化瘀腐、貼「黃蠟膏」。更應避免勞力久站，忌吃辛辣發物，徐徐收效。

血風瘡第八十二

【原文】

血風瘡乃風熱溼熱血熱。三者交感而生。發則搔癢無度。破流脂水。日漸沿開。甚者內服消風散。加牛膝黃柏。外搽解毒雄黃散。或如意金黃散如年久紫黑堅硬。氣血不行者。用針砭去黑血。以神燈照法薰之。以解鬱毒。次以前藥敷之方效。

解毒雄黃散 治風溼風注腳腿致生血風頑瘡。紫黑搔癢者。 雄黃
四兩 硫黃八分 右二味，共碾細末，柏油調搽。紙蓋之。三日一換。

如意金黃散 雖治症同前。用公豬膽汁調稠敷患處。油紙蓋扎勿動。待其自脫。脫後色紅。再敷之以色白為度。

神燈照法 雖治年久紫黑血風頑瘡。流水作癢不絕。先用葱湯洗淨。以燈焰薰之。每薰二燃為度。

血風瘡應用方 涼血消風散

【探究、按語】

遍身皆生，以腿脛為多。由肝（或心）脾濕熱外受，風邪襲於皮膚，鬱於肺經而成。

初起形如粟米，搔癢無度，抓破時津水溢血，浸淫成片，常令人煩躁口渴，初服「消風散」外敷「雄黃解毒散」，日久則耗血生火，搔癢倍增，日輕夜重，破則津血，心煩便燥，咽乾不渴，此屬火燥血熱，宜服「地黃飲」，外以「黃連膏」、「潤肌膏」合用，如年久紫黑堅硬，皮膚乾燥者，屬氣血不行，可用針砭去黑血，內以「當歸飲子」加減，外用「雄黃解毒散」。兼忌辛辣刺激物品。

頑癬第八十三

【原文】

頑癬乃風熱溼蟲四者為患。其形大小圓斜不一有乾溼新久之殊。風癬如雲朵。皮膚嬌嫩。抓之則起白屑。溼癬如蟲形。搔之則有汁出。頑癬抓之。則全然不痛。牛皮癬如牛項之皮。頑硬且堅。抓之如朽木。馬皮癬微癢。白點相連。狗皮癬白斑相簇。此等總由血燥風毒客於脾肺二經。初起

用消風散。加浮萍一兩。葱豉作引。取汗發散。久者服首烏丸。蠟礬丸。外擦土大黃膏。或槿皮散。選而用之。俱可漸效。

土大黃膏 治乾溼頑癬。不論新久。但皮膚頑厚。串走不定。惟癢不痛者。硫黃白 生礬黑 點紅川椒白 右各爲末。用土大黃根搗汁。和前藥調成膏。碗貯。新癬抓損擦之。多年頑癬。加醋和擦。如日久藥乾。以醋調搽。牛皮癬用穿山甲。抓損擦之妙。

頑癬必效方 治多年頑癬。諸藥薰擦搽洗不效者。川槿皮四兩 輕粉五分 雄黃四錢 百藥煎四錢 斑蝥半錢 巴豆去油一分 大黃三兩 海桐皮二兩 右爲極細末。用陰陽水調。抓損敷藥。必待自落。

又頑癬方 川槿皮三兩 輕粉五分 斑蝥半錢 大楓子去皮 河井水共一碗。煎一半。露一宿。筆蘸塗之。

頑癬浮萍丸 紫背浮萍 蒼朮 蒼耳草等分 苦參兩 黃芩 僵蠶一錢 鈎藤一錢 稀莶草二錢 共爲末。酒糊丸。白滾湯每服二錢。隨病上下服。

【探究、按語】

隨處可生患，由風熱濕邪，侵襲皮膚，鬱久風盛，化生爲蟲或傳染而生。初起皮膚內現隱疹之狀，日漸增長，其形不一，邊緣界限清晰，癢多痛少。其名有六，一曰乾癬，搔癢則起白屑，索然彫枯。二曰濕癬，癢如蟲行，搔則黏汁浸淫。三曰風癬，即年久不愈之頑癬，搔之痺痛，不知癢痛。四曰牛皮癬，狀如牛項之皮，厚而且堅。五曰松皮癬，狀如蒼松之皮，紅白斑點相連，時時作癢。六曰刀癬，輪廓全無，縱橫不定。治法著重外治，總以殺蟲滲濕，消毒之藥物外擦，輕者「羊蹄根散」，久頑者「必效散」搽之。亦有脾肺風濕過盛而腫痛者。宜兼服「散風若參丸」解其風濕。

膿瘡第八十四

【原文】

膿瘡乃肺經有熱。脾經有溼。二氣交感。先起水泡作癢。後變膿泡作疼。以清熱散風涼血除溼爲治。涼血消風散是也。外以蛇床子散。或諸瘡一掃光搽之亦效。兼戒口味自愈。

蛇床子散 治膿瘡生於手足偏身。根硬作脹。癢痛非常。蛇床子 大楓子肉 松香 枯礬黑 黃丹 大黃各五錢 輕粉三錢 右爲細末。麻油調搽。溼爛者乾繆之。

膿瘍又方 黃柏兩以公孫膽汁
擦之火上炭三錢 石膏兩 輕粉錢 黃丹 枯礬各三錢 右爲末。
麻油調搽溼者乾摻。

膿瘍瘡應用方 涼血消風散 諸瘡一掃光俱見瘡門

【探究、按語】

隨處可生。由脾肺二經濕熱交感而成。先起水泡作癢，後變膿瘍疼痛。治以涼血除濕，清熱散風爲主，內服「消風散」，去當歸加銀花連翹丹皮薏米等、或「四妙湯」加防風荆芥。外以「蛇床子散」油調或乾摻。

火丹第八十五

【原文】

火丹者。心火妄動。三焦風熱乘之。故發於肌膚之表。有乾溼紅白之異。乾者色紅。形如雲片。上起風粟。作癢熱。此屬心肝二經之火。治以涼心瀉肝。化斑解毒湯是也。溼者色多黃白。大小不等。流水作爛。又且多疼。此屬脾肺二經溼熱。宜清肺瀉脾。除溼胃苓湯是也。腰脇生之。肝火妄動。名曰纏腰丹。宜柴胡清肺湯。外以柏葉散。如意金黃散敷之。

化斑解毒湯 治三焦風熱上攻。致生火丹。延及遍身癢痛者。 元參 知母 石膏 人中黃皆味淡無氣 黃連 升麻 連翹 牛蒡子各等分 甘草三分
水 二茶鍾。淡竹葉二十片。煎八分。不拘時服。

除溼胃苓湯 治脾肺二經溼熱壅遏致生火丹。作爛疼痛者。防風 蒼朮 白朮 赤茯苓 陳皮 厚朴 豬苓 山梔 濤瀉 木通 滑石各一錢 甘草 薄桂各三分 水二茶鍾。燈心二十根煎八分。食前服。

柏葉散 治三焦火甚致生火丹作癢。或作痛延及遍身。 側柏葉炒黃爲末五錢 蚊蠅糞並桑葉內者 黃柏 大黃各五錢 赤豆 輕粉各三錢 右爲細末。新汲水調搽。

纏腰火丹方 用寶鈔一張。燒化存性。研爲細末。用米醋調稀。雞翎蘸塗。一日三次即愈。忌食發食。

如意金黃散調 治火丹不論新久癢痛。用新汲水調敷。釀汁亦好。

【探究、按語】

本病最早記載見“素問、至真要大論”稱丹熛瘡瘍。隋「諸病源候論」稱丹。唐「千金要方」稱丹毒，又名天火。習稱丹毒或流火，因突然變赤，色如塗丹故名。生頭面者名抱頭火丹，重者即大頭瘟。生腰部者名纏腰火丹，如起水泡成簇，蔓延甚速，痛如刀割針刺者，又名蛇串或蛇纏。生小兒者又名赤遊丹。

起因都以火毒爲主，可由風濕熱諸邪化火，或由外傷，毒邪乘隙而入所致，小兒則因胎毒。

此症來勢迅速，且必兼身熱等全身證候，重則引起危險。輕則每易復發，是以必須早治杜治爲上。如初起膚色紅如塗丹，形如雲片，發熱作癢者，屬血分有火而受風，毒甚者服「藍葉散」、輕者「導赤散」加銀花丹皮蒲公英獨活薄荷等。如初起白斑，漸透黃色，光亮脹墜，破流黃水，濕爛多痛者，屬脾胃濕熱，宜「防己散」。如初起白斑，無熱不痛，遊走不定者，屬外受寒邪，火毒未發，宜「烏藥順氣散」。抱頭火丹，見身熱口渴，舌乾脈洪數者，服「犀角地黃湯」，舌膩苔白者，宜「黃連解毒湯」，重者「普濟消毒飲」。纏腰火丹，如乾者宜「龍膽瀉肝湯」，濕者「除濕胃苓湯」，腿部用「雙解通聖散」或「當歸拈痛湯」、水泡簇聚，痛如刀割者「獨活湯」加蒲公英、銀花、大青、丹皮等。小兒宜「大連翹飲」。若煩擾不安，唇焦面青者，宜「五福化毒丹」，如胃不運化、口臭舌黃者「保和丸」兼消其滯。

內治外，兼治局部，初起可外貼牛羊之瘦肉片、甚則酌量泛出紫血，或外敷「如意金黃散」，或薑臺葉、馬齒莧打汁調青黛敷之。

天泡瘡第八十六

【原文】

天泡者。乃心火妄動。脾溼隨之。有身體上下不同。寒熱天時微異。
上體者。風熱多於溼熱。宜涼血散風。下體者。溼熱多於風熱。宜滻溼爲先。外用胡粉散石珍散搽之即愈。此不早治。變爲頑風紫癥。則難痊。

解毒瀉心湯 治心經火旺。酷暑時臨。致生天泡。發及遍身者。 黃連 防風 荆芥 山梔 黃芩 牛蒡子 滑石 元參 知母 石膏^一 甘草 木通^二 水二茶鍾。燈心二十根。食後服。

清脾甘露飲 治脾經溼熱鬱遏。乃生天泡。下體多而疼痛者。白朮 赤茯苓 山梔 茵陳 麥門冬 生地 黃芩 枳殼 蒼朮 濤瀉 連翹 甘草 元明粉^三 水二鍾竹葉燈心各二十件。煎八分食前服。

胡粉散 治天泡紅腫發熱。急脹疼痛。用針挑破。繆此藥。 杭粉 輕粉 石膏 蛤粉^四 共研極細將泡挑破。揩乾繆之。或用絲瓜葉搗汁調搽亦好。如冬月無此。用染布青缸汁調搽。

石珍散 治天泡日久作爛疼痛不已。膿水淋漓者。
石膏
輕粉各一兩
青黛 黃柏等分 右共研細。甘草湯洗淨。以此藥繆之。其疼即止。

【探究、按語】

頭面周身皆可發生。由於感受暑風濕熱而成。故夏季為多，尤以小兒易患，能互相傳染。狀如燎漿水泡，大小不一，初生數粒，漸至遍體皆是，赤癢痛，皮薄而澤，推之可移，破後津爛，味帶腥穢而無惡臭，不易愈合。上身多者屬風熱，宜服「解毒瀉心湯」，下體多者屬濕熱，宜「清脾除濕飲」。外治：在水泡未破時敷「如意金黃散」，已破時用「石珍散」搽之。移居涼室，可收事半功倍之效。

肺風粉刺酒皰鼻第八十七

【原文】

肺風粉刺酒皰鼻。三名同種。粉刺屬肺。皰鼻屬脾。總皆血熱鬱滯不散所致。宜真君妙貼散。加白附子敷之。內服枇杷葉丸。黃芩清肺飲。

枇杷葉丸 治肺風粉刺鼻皰。初起紅色。久則肉胞發腫者。 枇杷葉
去毛刺六兩 黃芩酒炒四兩 甘草一兩 天花粉四兩 共為末。新安酒泛丸桐子大。每服一錢五分。食後併臨睡時。白滾湯茶湯。俱可送下。忌火酒煎炒。

黃芩清肺飲 治症同前。川芎 當歸 赤芍 防風 生地 乾葛 天花粉 連翹 紅花等分 黃芩等分 薄荷等分 水二茶鍾。煎八分。食後服。用酒一杯過口。

真君妙貼散麝香 治肺風粉刺皰鼻。紅赤紫腫。早晚用涼水調敷。

【探究、按語】

肺風粉刺

唐宋以前一般稱為粉刺、面皰、面粉渣，明代以後又稱酒刺、粉花瘡、肺風粉刺等。故肺風粉刺乃係一種病名、今習稱面皰。生兩額鼻旁及額角等處，亦有整面甚至頸項胸背皆有。都因上焦熱甚所致。起如芒刺，微癢或一無痛癢，擠壓之能見白脂少許，生生不息，積久亦能成瘤或釀膿。治宜清熱降火為主，「梔子丸」、「承氣湯」、「枇杷葉丸」、「枇杷清肺飲」酌量加減服用，並忌煎炒脂肪刺激等物，日久由輕而愈。

酒皰鼻

生於鼻準，鼻翼兩側。由胃火薰肺，更因風寒外束，血瘀凝結，嗜酒者尤易生患。先紅後紫，並有血絲顯露，或起膿疤或生肥厚，久變褐黑，最為纏綿。治宜宣

肺化滯，如「麻黃宣肺酒」、「涼血四物湯」、「枇杷清肺飲」俱可選服、日久者「梔子丸」。再以「顛倒散」外敷，緩緩收效。

雀斑第八十八

【原文】

雀斑乃腎水不能榮華於上。火滯結而爲斑。宜六味地黃丸。以滋化源。外以玉容丸。早晚搽洗漸愈。

玉容丸 治男婦雀斑酒刺。及身體粗糙。並用此洗。 甘松 山柰
細辛 白芷 白蘚 白芨 防風 荆芥 僵蠶 山梔 薤本 天麻 羌活
獨活 蜜陀僧 枯礬 檀香 川椒 菊花 紅棗肉 以上共爲細末。
用去淨弦膜肥皂一斤。同搘作丸。如秋冬加生蜜五錢。如皮膚粗槁。
加牛骨髓三錢。早晚洗之。肌膚自然瑩潔如玉。溫潤細膩。

玉肌散 一切風濕雀斑酒刺白屑風。皮膚作癢者並效。 萊豆粉 滑石
白芷 白附子 乾姜 共爲細末。每用三匙。早晚洗面時。湯調洗患上。

雀斑應用方 六味地黃丸

【探究、按語】

唐「千金要方」、「外台祕要」都稱“面”、正宗首稱雀斑。常見於面部、鼻部，其色淡黃，碎點無數、互不融合、無自覺症狀。由火鬱於孫絡血分，風邪外搏，或由腎水不能榮於上，或因遺傳。宜常服「犀角升麻丸」、如屬水虧火滯者服「六味地黃丸」、虛火旺服「知柏八味」。外用「時珍正容散」早晚洗之，以澤其肌，久久生效。

汗斑第八十九

【原文】

蜜陀僧散 石黃 細辛 輕粉 硫黃 雄黃 蛇床子 乾姜 蜜陀僧 乾薑 共爲
末。醋調搽之。

【探究、按語】

都生胸、背、頸間、兩臂等處，色呈灰白，無自覺症狀。夏季發作，汗多易延，秋冬即隱而不見，故亦稱“夏日斑”。治法以外治爲主，用黃瓜蒂或茄蒂蘸「蜜陀僧散」搽擦。

油風第九十

【原文】

油風乃血虛不能隨氣榮養肌膚。故毛髮根空。脫落成片。皮膚光亮。癢如蟲行。此皆風濕乘虛攻注而然。當服神應養真丹。外以海艾湯薰洗並效。

海艾湯 治油風血虛風熱所致。皮膚光亮。眉髮脫落者。海艾 菊花 薄荷 防風 藁本 薑香 甘松 蔓荆子 荆芥穗等 用水五六碗。同藥煎數滾。連渣共入廠口鉢內。先將熱氣薰面。候湯溫薰洗之。留藥照前再洗。

神應養真丹見鵝膝 治風寒暑溼。襲於三陽部分以致血脈不能榮運肌膚，致生虛癢。眉髮脫落。皮膚光亮者。

【探究、按語】

生於頭髮內，偶亦生面部及眉毛間，由邪風乘虛襲入，以致風盛血燥，不能榮養毛髮。證見皮紅光亮，癢如蟲行，毛髮乾焦，成片脫落，宜服「神應養真丹」、外用「海艾湯」洗之，若耽延日久，改以養血涼血熄風，佐以養陰，「四物湯」、「六味丸」合用，兼鍼砭其光亮處，出血少許，毛髮庶可復生。

白屑風第九十一

【原文】

白屑風多生於頭面耳項髮中。初起微癢。久則漸生白屑。疊疊飛起脫而又生。此皆起於熱體當風。風熱所化。治當用消風散。面以玉肌散擦洗。次以當歸膏潤之。髮中作癢有脂水者。宜翠雲散搽之自愈。

祛風換肌丸 治白屑風。及紫白癩風。頑癬溼熱瘡疥一切諸瘡搔癢無度。日久不絕。愈而又發。威靈仙 石菖蒲 何首烏 苦參 牛膝 蒼朮 大胡麻 天花粉等 甘草 川芎 當歸等 右爲末。新安酒泛丸菉豆大。每服三錢。白湯送下。忌牛肉火酒雞鵝羊等發物。

白屑風應用方 消風散見鵝膝 翠雲散見鵝膝 玉肌散見鵝膝 潤肌散見鵝膝

【探究、按語】

初生髮內，漸延面目等處。由肌熱當風，風邪侵襲毛孔，鬱久燥血，肌膚失養

，化成燥症也。初起燥癢，日久白屑層層，脫去又生。宜常服「祛風換肌丸」、若肌膚燥裂者、「潤肌膏」擦之，作癢流水者「翠雲散」。

耳病第九十二

【原文】

耳病乃三焦肝風妄動而成。大人有虛火實火之分。小兒有胎熱胎風之別。虛火者。耳內蟬鳴。或兼重聽。出水作癢。外無掀腫。宜四物湯加牡丹皮石菖蒲。及腎氣丸主之。實火者。耳根耳竅俱腫。甚則寒熱交作。疼痛無時。宜柴胡清肝湯治之。又有耳挺結於竅內。氣脈不通。疼痛不止。以梔子清肝湯為治。外用黃線藥插入挺肉縫傍。化盡乃愈。小兒胎熱。或浴洗水灌竅中亦致耳竅作痛生膿。初起月間。不必搽藥。候毒盡自愈。如月外不瘥。以紅棉散治之。則安矣。

紅棉散 治耳內流膿。腫痛已消膿尚不正方用此繆之。
枯礬上真 乾
胭脂二錢 麝香一分 共研極細末。姿罐收貯。先用棉裹。絞盡耳內膿溼。棉裹滾藥。送入耳底自愈。

聽耳蘆薈丸 治肝膽有火。耳內蟬鳴。漸至重聽不聞聲息者。
蘆薈
大黃一錢 青黛 柴胡五錢 龍膽草 當歸 山梔 青皮 黃芩一錢 木香一錢
南星三錢 麝香五分 右為末。神麴糊為丸棗豆大。每服二十一丸。食後薑湯送下。日服三次漸效。

耳病應用方 柴胡清肝湯 梔子清肝湯俱見前門 四物湯見前門 腎氣丸見前門

【探究、按語】

耳疔

為外耳道化膿性病證、疔乃純陽之證，屬腎竅，總不離熱毒之邪而生。初起形如椒目，疼如錐刺，繼即釀膿，急服「蟾酥丸」，亦可水調滴於腫處，毒甚者「黃連消毒飲」、「黃連解毒湯」，順者消散，成則亦能自潰，潰後以冰片、枯礬、血竭研為細末吹之。

耳癰

屬腎竅外，又為三焦、膽經循行之地、生耳外者、又名耳根癰或耳門癰、皆風邪為病或肝膽遺熱所生，「銀翹散」、「桑菊飲」、「真人活命飲」加減選用。

耳痔

耳竅內之贅生物，皆肝腎濕熱凝結而生。初起微腫、狀如櫻桃，稍感脹痛，瘡

頭呈紅色無皮狀，甚則阻塞耳道，又細長似棗核而伸達耳外者名耳挺。內服「梔子清肝湯」，外用「硇砂散」點之。

聾耳

耳內流膿者稱爲聾耳，又名耳疳。「柴胡清肝湯」主之，氣實火盛者「龍膽瀉肝湯」，偏於肝經血熱者，服「四物湯」加丹皮、石菖蒲等，屬虛火者耳鳴重聽「六味丸」、「腎氣丸」選用。

漆瘡第九十三

【原文】

漆瘡由來自異有感有弗感也。俗稱木生人感之非也。漆乃辛熱有毒之物。人之皮毛腠理不密。故感其毒。先發爲癢。抓之漸似隱疹。出現皮膚傳遍肢體皮破爛斑。流水作痛。甚者寒熱交作宜韭菜汁調三白散塗之。服化斑解毒湯。忌浴熱水。兼戒口味不然變爲頑風癬癩愈而又發者多矣。

三白散 杭粉禹 石膏禹 輕粉禹 各爲末。韭菜汁調敷紙蓋。如無菜汁。涼水調敷。

漆瘡應用方 化斑解毒湯

【探究、按語】

漆瘡之名首見隋「諸病源候論」。此症遍身可發，由於人之腠理不密，對漆之秉性不耐，感漆辛熱之毒而生。初起色紅癢痛，抓之漸似癰疹，隨手而起，先自顏面，手背，繼則傳遍全身，皮破爛斑，水泡成簇，甚者寒熱交作，延久能結毒成瘍，或失治而成頑風癬癩。內服「化斑解毒湯」、「消風散」加減。總以清熱解毒，利濕祛風爲主。外以韭菜打汁調「三白散」塗之，或生雞蛋黃塗之，另以杉木屑，或貫仲煎湯淋洗。

瘻瘍第九十四

【原文】

瘻瘍者。密如撒粟。尖如芒刺。癢痛非常。渾身草刺。此因熱體見風。毛竅所閉。宜服消風散。洗用苦參湯。甚者皮損匝匝成瘍。以鵝黃散軟綢帛蘸藥撲之。

苦參湯 治瘡癰瘍作癢。抓之又疼。坐如芒刺。難以安睡。用苦參四兩大。菖蒲二兩。河水五瓢。同煎數滾。添水二瓢。蓋片時。和入公豬膽汁四五枚。淋洗瘍上。不二三次全愈。愈後避風。忌食發物。

鵝黃散 治瘡癰瘍作癢，抓之皮損。隨後又疼。用此撲之。
葵豆粉

滑石粉 黃柏粉 輕粉 等量 右爲細末。以軟絹帛蘸藥撲之。止痛收乾。

瘡瘍應用方 消風散

【探究、按語】

一又名座瘡，小兒患者因色紅，又名猴瘡（即習稱尿布疹）。生於臀腿之間。都由暑令坐日曬几凳，或久坐陰濕之地，以致暑濕熱毒、凝滯肌肉而成，小兒則因尿布泡漬、悶熱而起。形如黍豆，色紅作癢，甚者 痛延及肛門，勢如火燎，初宜用芫花、川椒、黃柏煎湯，或「苦參湯」洗之，以「鵝黃散」撲之，小兒以松花粉。內服「消風散」加減，總以清熱利濕爲主。

痄腮第九十五

【原文】

痄腮乃風熱溼痰所生。有冬溫後天時不正。感發傳染者。多兩腮腫痛。初發寒熱。以柴胡葛根湯散之。外敷如意金黃散。內熱口乾。二便不利者。四順清涼飲利之。表裏俱解。腫仍不消。必欲作膿。用托裏消毒散。膿成者即針之。體虛人兼服補托藥自愈。

痄腮應用方 柴胡葛根湯 見傷寒發額門 **四順清涼飲** 見溫發額門

【探究、按語】

生於兩腮耳根。俗稱鷺鷥瘡、或蛤蟆瘡。由於陽明胃熱、或風溫傳襲，少陽脈絡失和所致，以春冬兩季較多，甚易傳染，小兒易患，發過則不再生發。有單生或雙生。初起腫如雞卵、或大如饅頭，皮色不變，或微帶淺紅，接之烘熱軟綿無塊，痠痛交作，咀嚼更甚，並兼身熱者多，輕者不藥可愈，六七天自能消失，延久則亦會釀膿生變，總宜早治爲上。初起如身熱頭痛、口渴溲赤、脈數者服「牛蒡解肌湯」去石斛元參、加鈎藤僵蠶赤芍等辛涼輕解。外用「如意金黃散」調敷。如腮腫將退而睾丸忽腫大作痛，身發高熱者，改服「龍膽瀉肝湯」、「金鈴子散」亦以「金黃散」調敷腫處。

痰包第九十六

【原文】

痰包乃痰飲乘火流行。凝舌下結而胞腫。綿軟不硬。有妨言語。作痛不安。用利剪刀當包剪破。流出黃痰。若蛋清稠粘難斷。搽盡以冰硼散搽之。內服二陳湯。加黃芩黃連薄荷數服。忌煎炒火酒等件。

加味二陳湯 治痰飲流注舌下發腫作痛。針刺已破者。陳皮 半夏 茯苓 甘草 黃芩_{各八分} 黃連 薄荷_{各五分} 水二茶鍾。薑三片。煎八分。食前服。

痰包應用方 冰硼散

【探究、按語】

痰包一症自明朝迄今，治法未變，且俱實效，仍以利剪剪破，或以刀刺，令出痰液如蛋清，搽盡粘痰，搽以「冰硼散」、流血者摻止血藥如血餘炭等。兼忌煎炒刺激物品。

癩風第九十七

【原文】

癩風乃陽明溼熱沸騰於肌表。或外受風寒。侵襲而成。其患初起水泡。作癢成瘡。破流脂水。瘡至徹骨。久則成片。傳及徧身。好浴熱湯。形如風癩。初起上體多者。防風通聖散去硝黃。加葱頭三莖。發汗以散外毒。下體多者。去麻黃以攻內毒。通治則初服消風清燥湯。久服祛風換肌丸。外搽諸瘡一掃光。成片流水者。真君妙貼散。皮膚頑厚有蟲者。麥餳散搽之。

消風清燥湯 川芎 當歸 白芍 生地 防風 黃芩 黃連 天花粉 蟬蛻 苦參 威靈仙_{各一錢} 甘草_{五分} 水二茶鍾煎八分。食後服。

癩風應用方 防風通聖散_{去硝黃} 祛風換肌散_{去白附} 真君妙貼散_{去蟲屑} 諸瘡一掃光_{去蟲屑} 麥餳散_{去蟲屑}

【探究、按語】

凡起泡生癢、破流脂水之濕瘡（如血風瘡、腎風瘡、座瘡、濕癩等），久久不愈，傳遍全身者，都稱癩風。治理之法、除「消風清燥湯」、「祛風換肌丸」外，如濕熱俱盛者、「龍膽瀉肝湯」加減，瘡甚加地膚子苦參片白蘚皮，下肢甚者加萆薢。

薢黃柏。脾虛濕盛者、「除濕胃苓湯」。傷陰耗血者、「滋陰除濕湯」。血熱風盛者、金鑑「消風散」，風濕相兼者，局方「消風散」等參酌加減選用。

溼腫第九十八

【原文】

溼腫者。皆脾氣受傷之病。或飲食後驟受風寒。或飢渴時誤食生冷。寒積于中。食不剋化。其患胸膈不寬。小水不利。面目浮腫。漸至偏身此土傷不能生化之故。也宜用二蛟散疏通稼土。溫養脾元。其小水自利。浮腫自消。百發百中。

二蛟散 治生冷腦怒傷脾。致胸膈不寬。小水不利。面目四肢浮腫。諸藥不效。用三年老黃米。炒焦黃色爲末。提淨芒硝三兩。鍋內溶化。炒乾爲末。每用一平杯和勻。再碾極細。大人壯實者。每服三錢。小兒十歲上下者。一錢二分。俱用赤砂糖三茶匙。和白滾湯半茶鍾。空心調服。至午大便一次至晚再便一次。其疾先從眼胞消起。日久元氣虛者。加味胃苓湯間服。至重者不過五服愈。

加味胃苓湯 治脾胃受傷。胸膈不寬。兩脇臟脹。小水不利。面目四肢浮腫。陳皮 茯苓 白朮 白芍蜜炙 藿香、人參 厚樸 山楂 澤瀉 半夏姜制 甘草 豬苓 香附玄曲加 薑三片。燈心二十根。水二茶鍾煎八分。食前服。

【探究、按語】

濕腫乃係飲食不當，消化不良，復受風寒、水飲停於中焦之胃腸病（積飲症），可酌用瀉利之法。

女人面生黧黑斑第九十九

【原文】

黧黑斑者。水虧不能制火。血弱不能運肉。以致火燥。結成黑斑。色枯不澤。宜朝服腎氣丸。以滋化源。早晚以玉容丸洗之。兼戒憂思動火勞傷。日久漸退，此症不得于夫。及疑事不決者常有之。

面斑應用方 腎氣丸見肺 玉容丸見胃

【探究、按語】

晉葛洪「肘後備急方」稱肝黯。隋「諸病源候論」稱面黑肝。唐「千金要方」稱面肝。今稱黧黑肝黯、此症係生於顏面之黃褐或淡黑色斑片、大小不定，表面平滑，不痛無癢之慢性疾患、以婦女較多，由憂思抑鬱、情緒不穩、肝腎不足，血虛不華而成。調治之法，首應養情怡性，胃腸失常，肝脾不和者。調理之、腎水不足者、滋養之、「柴胡疏肝湯」、「逍遙散」、「苓桂朮甘湯」、「四君子湯」、「六味丸」、「知柏八味丸」加減選用。

鈕釦風第一百

【原文】

鈕釦風。皆由風溼凝聚生瘡。久則搔癢如癬。不治則沿漫項背。當以冰硫散擦之。甚者服消風散亦妙。

冰硫散 硫黃一兩 樟水 川椒 生礬一錢 共爲末。先用白蘿蔔一個搗空。將藥填滿。復將原皮蓋之。溼紙色三四層。灰火內煨半時許。待冷取開。將藥同熟豬油調稠。搽之自愈。

鈕釦風應用方 消風散歸附

【探究、按語】

生於頸項，甚者延及肩背。皆因汗出之後，風邪襲於皮裏或衣領壓擦而成。初起如粟、搔癢無度，抓破則津水浸淫。輕者外敷「獨勝散」、「冰硫散」、甚者加服「消風散」。參考白屑風。

枯筋箭第一百一

【原文】

枯筋箭。乃憂鬱傷肝。肝無榮養。以致筋氣外發。初起如赤豆大。枯點微高。日久破裂。露出筋頭。蓬鬆枯槁。多生胸乳間。宜用絲藥線齊根繫緊。七日後自落，以珍珠散撒之其疤自收。兼戒口味不發。

枯筋箭應用方 絲藥線歸附 珍珠散歸附

【探究、按語】

隋「諸病源候論」稱疣或鼠乳。俗稱「子」或「千日瘡」。皆謂由於風邪濕熱或肝虛

血燥而成、大小不一，枯點微高，蓬鬆毛糙、到處可生、甚則成串。以外治爲主、用鴉膽子去壳壓碎塗之，漸漸腐脫、注意飲食，可免復生。

婦人腳丫作癢第一百二

【原文】

婦人腳丫作癢。乃三陽風溼下流。凝結不散。故先作癢。而後溼爛。
又或足底彎曲之處。癢溼皆然。

枯礬散 枯礬音譜 石膏音譜 輕粉 黃丹音譜 右爲末。溫湯洗淨搽之。
即愈。

【探究、按語】

腳趾間或足底部生水泡作癢或潮濕糜爛者，習稱腳濕瘡，不獨婦人，男子老幼皆患。都發於濕熱交蒸之季節，或久居濕地，或鞋襪悶氣，或脾胃濕熱下注而成。治療以外治爲主、輕者「陀僧散」、「陀僧膏」、重者「枯礬散」。但症重者、亦應加內治、「三妙丸」、「五神湯」、「萆薢滲濕湯」、加減選用。

手足破裂第一百三

【原文】

手足破裂者。乾枯枝之象。氣血不能榮養故也。因熱肌驟被風寒所逼。
凝滯血脉。以致皮膚漸枯漸槁。乃生破裂。日襲於風。風熱相乘。故多
作痛。以玉肌散洗擦。潤肌膏潤之。甚者兼服當歸飲子爲妙。

手足破裂應用方 玉肌散見前 潤肌膏見前 當歸飲子見前

【探究、按語】

隋「諸病源候論」稱皺裂。唐「外台秘要」稱尸腳，由於風寒所逼，凝滯血脉，以致皮膚漸至枯槁，或因氣血不能榮養所致。手腳破者今都稱皺裂或乾裂，手指皺裂者俗稱富貴手、意謂與工作接觸刺激物有關，秋燥嚴冬時則轉重，甚者動則破裂出血疼痛。外以「潤肌膏」日擦。氣血不能榮養者，內服「當歸飲子」。

眼丹第一百四

【原文】

眼丹脾經有風。胃經多熱。其結爲腫。風多者浮腫易消。熱甚者堅腫難散。初起宜用金黃散敷之。有表症者。荆防敗毒散。裏症者清胃散。加大黃利之。如不散必欲作膿。宜換膏貼之。膿成者即針之。遲則眼頭自破。乃陽明穴內空。難歛成漏者多。

眼丹應用方 荆防敗毒散 見時病門 清胃散 見牙齒門 金黃散 見瘡門

【探究、按語】

眼丹生於眼胞。由脾胃或心經蘊熱，外受風邪、風熱上升眼胞所致。初起紅腫疼痛，重者腫延顏面。若腫軟下垂、偏於風盛者、易消。若掀紅色紫堅硬者，偏於熱盛也、難消。初起俱服「荆防敗毒散」、口渴便燥者、「內疏黃連湯」、日久不消者、「透膿散」、膿熟則鍼之。初腫時外用「如意金黃散」調敷，潰用「琥珀膏」或『白膏藥』貼之。此症宜速治、速潰、速歛、遲延則潰穿眼胞，成漏則不易收歛。

眼胞菌毒第一百五

【原文】

菌毒者。乃脾經蘊熱凝結而成。其患眼胞內生出如菌。頭大蒂小。漸長垂出。甚者眼翻流淚。亦致昏瞇。治宜用軟棉紙蘸水麻之眼胞上。少頃用左手大指甲墊於患根切人。右手以披針尖頭齊根切下。血出不妨。隨用翠雲錠磨濃塗之。其血自止。內服涼膈清脾飲二服。仍忌海腥煎炒椒薑火。等件不發。

涼膈清脾飲 防風 荆芥 黃芩 石膏 山梔 薄荷 赤芍 連翹 生地 各一錢 甘草 半錢 水二茶鍾燈心二十根煎八分。食後服。

翠雲錠 治眼胞菌毒。用針割後塗之。抗粉五兩。銅錄末一兩。輕粉一錢。共研極細。用黃連一兩。同川米百粒。水一碗。煎一半再熬折去二分。和藥作錠陰乾。臨時用清水少許。淨硯上磨濃雞翎蘸搽。又治爛弦風眼。或暴赤腫痛者。罨搽更效。

【探究、按語】

此症之記載始於明「外科正宗」。由於脾經素有濕熱、或有情志變化而成。宜早期手術治療為佳。內服以「涼膈清脾飲」加夏枯草貝母青皮等。

黑子第一百六

【原文】

黑子瘡名也。此腎中濁氣混滯於陽。陽氣收束。結成黑子。堅而不散。凡人生此。終爲不吉。面部不善者去之。宜細銅管將瘡套入孔內。撲六七轉。令瘡入管一拔便去。有瘡浮淺不能拔者。用針挑損。搽冰蠅散少許。糊紙蓋之。三日自脫。或灰米膏點之亦可。落後珍珠散乾繆。生皮而愈。忌醬醋無斑。

灰米膏 用成塊石灰蘸水調稠。將白糯米插入灰內。留半米在外片時許候米熟。用米點上可落矣。

黑子應用方 冰蠅散見瘡門 珍珠散見下

【探究、按語】

又名黑瘡。隋「諸病源候論」稱黑瘡。爲黑褐色圓形小斑點、略高於皮膚，不感痛癢，到處可生。夫人生血氣充盛，則皮膚潤澤，故云亦由於內因而成，有云腎中濁氣、或孫絡血滯，或風邪搏於氣血等。今命相術士枯瘡之法即灰米膏之意、用生石灰、石碱、米泔水、糯米泡浸一二天，挑取少許點於瘡面、小者片刻即枯，數天脫落。

狐氣第一百七

【原文】

狐氣一名狐腋。此因父母有所傳染。又有因狐胎受生者。故不脫本來氣質。腋下多有櫻紋數孔。出此氣味。常以五香散擦之。內用蒜肚時常作饌食之。可以漸退。

五香散 沈香 檀香 木香 零陵香各三分 麝香一分 共爲細末。每用五釐。津調搽擦兩腋下。三日一次。或用香末二錢。絹袋盛貯。挂於腋下。

蒜肚方 用公豬肚一具。大蒜囊四十枚。去殼入肚。內以線扎口。水煮極爛。用鹽醋蘸肚。隨便食之。氣味甚者。用癩蝦蟆一個。入內同煮。肚爛去蝦蟆大蒜。用熱酒食之。洗浴發汗避風三日。其氣頓改。

【探究、按語】

隋「諸病源候論」稱狐臭、漏腋。唐「千金要方」稱腋漏，「外台秘要」稱腋

臭。宋「三因極一病證方論」稱胡臭。今習稱孤臭、體臭、孤騷臭、見於腋下者、稱腋臭，以腋下為多，每當患者靠近，即聞得刺鼻特殊臭味，天熱汗出時更甚。此症多稟於先天，受諸父母，女多於男，輕重不一，至年老時逐漸減輕或消失。治療之法以外治為主、內治佐之、外用「五香散」、或「腋香散」外塗或擦擦。內服選「五香丸」、「甘露消毒丹」加減。

白禿瘡第一百八

【原文】

白禿瘡因剃髮腠理洞開。外風襲入。結聚不散。致氣血不潮。皮肉乾枯。發為白禿。久則髮落。根無榮養。如禿斑光潤不癢。內血已潮。以薑蘸潤肌膏常擦。其髮漸生。禿斑乾枯作癢者。內必有蟲。宜用麥餳散搽之。蟲死風散髮生。愈後忌動風發物等件。

麥餳散 治禿瘡頭毛脫落。白斑如癬瘡痂疊起。癢甚有如蟲行。葱湯洗淨瘡痂用麻油調搽。以氈帽戴之。隨後作疼發腫忍之。三日後，其痂漸漸而脫。其髮自生。戒諸發物。

諸瘡一掃光 治禿瘡髮脫作癢。本藥一錢。加倒挂塵二分。燈窩宿油調搽自愈。

潤肌膏 治禿瘡乾枯。白斑作癢髮脫。用麻油四兩。當歸五錢。紫草一錢。同熬藥枝濾清。將油再熬。加黃蠟五錢化盡。傾入碗內頻冷。搽擦自愈。

【探究、按語】

隋「諸病源候論」稱白禿。今習稱癩頭瘡或鬍鬚頭。都生小兒頭上，因染襲而生。初起時皮膚乾枯，頭皮見細小白色脫屑、頭髮從中穿過，漸漸增多蔓延、瘡痂高堆、搔癢不堪、日久則毛髮乾燥，變脆易折，繼即焦脫，即成禿瘡。治療都以外治為主，如「掃雪散」、「一掃光」、「肥油膏」、或「麥餳散」搽擦。脫髮以薑蘸「潤肌膏」擦、薑改毛薑更效。重者酌加內服，總以消風除濕、殺蟲止癢、養血為法。

奶癬第一百九

【原文】

奶癬因兒在胎中。母食五辛。父冷炙燙。遺熱與兒。頭面徧身發爲奶癬。流脂成片。睡臥不安。搔癢不絕。以文蛤散治之。或解毒雄黃散。甚則翠雲散。用青缸汁調搽。

文蛤散 文蛤角 點紅川椒仁 輕粉錢 先將文蛤打成細塊。鍋內炒黃色。次下川椒同炒黑色。烟起爲度。入罐內封口存性。次日入輕粉研爲細末。瓷罐收貯。香油調搽。奶母戒口爲妙。

奶癬應用方 解毒雄黃散見血風
瘡門 翠雲散見補樹
瘡門

【探究、按語】

奶癬亦稱胎癩瘡、即嬰兒濕疹，多生頭面耳項等處、（生臀部者又稱濕尻瘡，即尿布疹）。由於懷始時孕婦過食辛辣煎炒、或情志內傷，肝火內動，遺熱於胎兒、或因出生後喂乳失當，飲食不節、或過於肥胖。有乾濕兩種，初起成片潮紅，癢起白屑者屬乾癩，如皮膚起粟，搔癢無度，黃水浸淫，甚則延及遍身者屬濕癩。內服「消風導赤湯」、便乾加天花粉或大黃、便溏者「參苓白朮散」。外治、乾者抹「潤肌膏」、濕者以黃柏末與滑石等分乾摻，或「文蛤散」油調、結痂厚者，再以「潤肌膏」潤之。

蟠拱頭第一百十**【原文】**

蟠拱頭。俗名腦豬是也。患小而稟受悠遠。皆父精母血蓄毒而成。只發一次。其患腫高。破之又腫。皆稟受時。原有衣膜相裹。毒雖出而膜未除。故愈而又發。腫甚膿熟者。用針刺破。以三品一條槍插入孔內。化盡內膜自愈。又有不腫而不收口者。此必風襲患口。宜敗銅散搽之。兼戒口味自愈。

敗銅散 治蟠拱頭已破後膿水不乾。愈而又發。久不收口。用化銅舊罐爲末。洗淨患上。香油調搽患口。

蟠拱頭應用方 三品一條槍見醫門

【探究、按語】

又名蠟瘡，生小兒頭部，尤以後腦居多，未破時如蟠拱頭，潰後以蠟蟲串穴故名。大多由暑熱成毒，患生暑瘡，失之於治，或胎毒而成。初起爲大小不一之小瘡，根腳堅硬，漸成膿腫，破潰後雖出膿水，但堅腫不退，瘡口雖合，越時復發，

甚則竄生，連綿不斷，日久年深者可滿佈頭部。初起按一般腫瘍治療，潰後生肌拔毒，瘡口久不收斂，或復腫者，貼「千搥膏」、摻「九一丹」、或用捻子蘸藥插入瘡口，重者挿「三品一條槍」、化淨內膜、換「生肌散」、貼「玉紅膏」收口，如日久不斂，頭皮串空，果似蠟蛆串穴之狀，宜貼「紺珠膏」、拔盡膿毒，將所串之空皮剪通，使無藏膿之處，清洗瘡口，乾摻「生肌散」、貼「萬應膏」收口而愈。

小兒遺毒爛斑第一百十一

【原文】

遺毒乃未生前胞胎稟受。因父母楊梅瘡後。餘毒未盡。精血孕成。故既生之後。熱湯洗浴。烘薰衣物。外熱觸動內毒。發于肌膚之表。先出紅點。次成爛斑。甚者口角穀道眼眶鼻面皮肉俱壞。多妨乳哺。啼叫不安。初治宜早。內與土茯苓湯調人中黃末。每日數次。共飲四五分。外用解毒紫金丹磨塗。十中可保三四。遲延毒甚。爛斑偏身不乳者。百中難治一二。此由根蒂受毒深故也。

人中黃 治小兒諸胎毒，痘疹黑陷內收。脣焦口乾。風熱班疹。赤遊丹毒。兼治大人傷寒陽症發狂。或諸惡瘡毒氣入裏。口燥咽乾。煩渴悶亂。中諸砒草河豚等毒。諸般急病。無有不效。用毛竹一段。兩頭留節。一頭鑽一小孔。用粉草磨爲細末。從孔灌滿。以木條塞緊孔眼。用磚扎之。沈入大糞池內。半年取起。長流水浸一日。帶竹風乾。姿罐收貯。大人每服二錢小兒每服三四分。涼水調服。小兒胎毒爛斑。土茯苓湯調服。尋常熱病。入應病藥中調服。

真君妙貼散膏 治小兒胎毒。皮肉腐爛。疼痛不安。用此敷即效。

小兒爛斑應用方 解毒紫金丹膏

【探究、按語】

亦名猶癧疳，由胎傳而得，父母曾患梅瘡，後生嬰兒，出生後不數日，發於皮膚之表，九竅之旁出現紅點，臀腿甚至全身 紅，或口糜咽腫，乳不能進，聲音嘶啞、二便不利，身熱如烙。過於幼小者，服藥困難，較難著手，如能飲食，土茯苓煎劑，至今仍作為治療梅毒之主要藥物，其他參考楊梅瘡。

蠟蛆串第一百十二

【原文】

蠟蛇串。由於思慮傷脾。脾氣鬱結所生。是疾氣血澆薄者多。脾主四肢。其患多生於兩手。初起骨中作疼。漸漸漫腫堅硬。不熱不紅。手背及內關前後連腫數塊。不能轉側。日久出如豆腐漿汁。串通諸竅。日夜留連。腫痛仍在。患者面黃肌瘦。飲食減少。久則寒熱交作。內症並出。首尾俱宜益氣養榮湯。加味道遙散。調和氣血。扶助脾胃。可生者十之二三。補而不應。氣血滯盡而亡者多。

蠟蛇串應用方 益氣養榮湯 加味道遙散見瘡門

【探究、按語】

蠟蛇串與多骨疽，同屬流痰範圍，調治等法，參考第二十六多骨疽。

小兒痘風瘡第一百十三**【原文】**

痘風瘡。因痧痘後毒發未盡。留熱肌膚復被外風侵入。其患先從細瘡作癢次漸沿開成片。脂水生癰搔之無度。宜用麥餳散搽之。兼戒口味避風自愈。

麥餳散 治小兒痘風作癢。疊疊成片。甚則頑麻不知痛。用小麥一升。炒枯黃色。乘熱入臼內。和硫黃四兩。白砒一兩。細末攪勻。待冷取起。加烟膠半斤。川椒三兩。生枯礬各二兩。共研細末。臨用葱湯洗淨。以麻油調搽。油紙蓋扎。三日一換。三次愈。

【探究、按語】

小兒痧與痘二症，如處理不當，毒發未盡，更加外風時，都易留後遺症，痧則除咳嗽外，常見起粟作癢、或流滋水，痘後亦易留皮膚疾患，習稱痘風瘡。先起細瘡作癢、日漸蔓延成片、或滋水浸淫，初宜「湯瘡湯」溫洗，摻「滲濕救苦散」、癢甚者加冰片少許，兼虛者內服「十全大補湯」、合「散風苦參丸」加減，以清熱解毒。

小兒赤遊丹第一百十四**【原文】**

赤遊丹。受毒於未生前。發病於有生後。蓋身在胞胎。皆賴父精母血生養。父母不能節慾。淫火猖熾。又不能戒諸厚味。以及炭火烘薰。重衾疊褥。種種熱毒。胎皆受之。及至生後。熱湯洗浴。烘薰衣物。觸動內毒。先發身熱。啼叫驚搐。次乃生丹。紅腫光亮。瞬息遊走。發無定處。先從頭額起者。名天奪丹。以升麻葛根湯。母子同服。餘或起於腹背。流入四肢者輕。起於四肢。流入胸腹者重。有此總皆先砭惡血爲要。砭血之後。先用精豬肉縫(切)片貼之。一時許。換如意金黃散。用水芭蕉根搗汁調敷。甚者日換二次。內服大連翹飲。消毒犀角飲。五福化毒丹。毒氣入裏。腹脹堅硬不乳者。紫雪散下之。三日後身漸微涼。砭血之處。肉便軟活。聲清腹乾。乳哺如常者順反此爲逆。

升麻葛根湯 治丹毒身體發熱。面紅氣急。啼叫驚搐。 升麻 乾葛 白芍 柴胡 黃芩 山梔_錢 木通 甘草_錢 水二茶鍾。煎八分。不拘時母子同服。

大連翹飲 治小兒丹毒發熱。痰涎壅盛。一切諸瘡癩症。頸項生核。或傷風傷寒。時行發熱等症。並宜服之。 連翹 瞿麥 滑石 車前子 牛蒡子 赤芍 山梔 木通 當歸 防風 黃芩 柴胡 甘草 荆芥 蟬蛻 石膏_錢 水二茶鍾燈心二十根。煎八分。母子同服。

消毒犀角飲 治小兒丹毒身熱氣粗。啼叫驚搐不甯。 犀角 防風 甘草_錢 黃連_錢 右水二茶鍾。燈心二十根。煎四分。徐徐服之。

紫雪散 治小兒赤遊丹毒。甚者毒氣入裏。肚腹膨脹。氣急不乳。即宜此藥救之。又治傷寒熱躁發狂及外科一切蓄毒在內。煩躁口乾。恍惚不甯等症。 升麻 寒水石 石膏 犀角 羚羊角_錢 元參_錢 沈香 木香_錢 甘草_錢 水五碗。同藥煎至一碗。濾清再煎滾。投提淨朴硝三兩六錢。微火慢煎。水氣將盡。欲凝結之時。傾入碗內。下硃砂水片各二錢。金箔一百張。各預研細和勻。碗頓水內。候冷凝成雪也。大人每用一錢。小兒二分。十歲者五分。徐徐嚥之即效。病重者加一錢亦可。或用淡竹葉燈心湯化服。

針砭法 治小兒赤遊丹毒。紅赤掀腫遊走不定。用披針鋒尖向丹上。以烏木重筋在針上擊之。密砭去血多者爲妙。血紅者輕紫者重。黑者死。砭畢溫湯洗淨。用乾精豬肉縫大片貼砭處。一時許。方換如意金黃散。水芭蕉根搗汁敷。

如意金黃散_錢 治小兒赤遊丹毒，紅如硃，熱如火，走如雲。散及

徧身不定者。用水芭蕉根搗汁調敷。加蜜亦可。

赤遊丹應用方 五福化毒丹

【探究、按語】

小兒患丹毒，因遊走甚速，故名赤遊、又名遊火。治宜涼血清熱解毒，如「犀角地黃湯」、「黃連解毒湯」、食滯者「保和丸」、毒邪內攻者「紫雪丹」都可選用。參考第六十七火丹。

走馬牙疳第一百十五

【原文】

走馬牙疳。言其患迅速。不可遲治也。乃痧痘餘毒所中。又有雜病熱甚而成者。初起牙齦作爛。隨即黑腐作臭。甚者牙齦脫落。齦旁黑朽。不數日間。穿腮破唇。誠爲難治。初起宜用蘆薈消疳散。外用人中白散。或冰硼散搽之。取去黑腐。內見紅肉血流者吉。如取時頑肉不脫。腐爛漸開。掀腫外散。臭味不止。更兼身熱不退者。俱爲不治。牙疳有五不治。口臭涎穢一不治。黑腐不脫二不治。牙落無血三不治。穿腮破唇四不治。用藥不效五不治。

蘆薈消疳飲 治小兒走馬牙疳。身熱氣粗。牙齦腐爛。氣味作臭。內及穿腮破唇者。蘆薈 銀柴胡 胡黃連 川黃連 牛蒡子 元參 桔梗 山梔 石膏 薄荷 羚羊角鱗 甘草 升麻鱗 水二茶鍾淡竹葉十片。煎六分。食後服。

人中白散 治小兒口疳走馬疳。又牙齦腐爛黑臭者。人中白麝紅二味 兒茶 黃柏薄荷 青黛鱗 水片鱗 共再研極細。先用溫湯漱淨。吹藥疳上。日用六七次。吹藥涎從外流爲吉內。收涎毒入裏爲凶。

牙疳應用方 水硼散

【探究、按語】

生牙齦，因腐爛迅速，勢如奔馬故名。多因素嗜甘肥，日久蘊熱上蒸，小兒因胎毒，或痧痘後餘毒上攻，或久病之後體虛，虛火上炎而成。初無身熱，先從牙齦邊緣生癢，隨即延及四周，其色灰白，繼則變成黑腐，滲流紫血臭液，毒火甚者，牙齦黑腐，腐肉脫落，齒落骨露，延及唇腮鼻部，以致腐爛洞穿、惡寒發熱、飲食不進，泄瀉氣喘，每因邪盛正虛而至不救。

初服「蘆薈消疳飲」，脾胃虛者、兼服「人參茯苓粥」，若在痧痘之後餘毒所

中者，宜「清肝解毒湯」，如苔黃脈數有力或便秘者「涼膈散」，如面無血色，精神萎靡，脈沉乏力者，虛火上炎，宜「當歸補血湯」合「五味消毒飲」加減。外治、初用「人中白散」、或「瀉白散」摻擦或、「冰硼散」、若堅硬青紫，漸腐穿腮齒搖者、宜「蘆薈散」或「赤霜散」，如牙縫黑腐不盡，腐爛坑深，藥不能到者宜「勒馬聽微絲」塞之，再用手法，去其黑腐惡肉，見肉紅血鮮者吉，若取時頑肉難脫而堅硬者貼「青蓮膏」。大抵此症先見身熱不退、飲食不進、腐蝕咽喉、齒落無血、穿腮透唇、外蝕鼻樑色呈暗黑者，俱為不治。

重舌第一百十六

【原文】

大人小兒重舌。乃心火妄動而發。當以線針點刺。令出惡血。內服解毒瀉火湯。外以水硼散搽之。又有紫舌木舌。亦由心火而發。用飛鹽加冰片少許。勤搽出涎自愈。又有痰氣結於舌上。成核作痛硬強者。用線針點破出血。用冰硼散搽之。服後藥。

黃連瀉心湯 治大人小兒心火妄動。結成重舌木舌紫舌。脹腫堅硬。語言不利。黃連 山梔 荆芥 黃芩 連翹 木通 薄荷牛蒡子甘草水二茶鍾。燈心二十根。煎八分。食後服。

針刺法 治重舌木舌紫舌等症。脹腫疼痛。硬強不語。又兼舌根併兩齒合縫處作腫。瘻肉塗塞。口噤難開。俱用此法刺之。用粗線針扎在筋頭上。在患處點刺出血。紅紫毒輕紫黑毒重。患甚者數十點皆可血盡。溫湯漱之。重者金鎖匙。輕者冰硼散搽之。流去熱涎。內服涼膈散。或清涼飲可選用。

重舌應用方 金鎖匙 水硼散 四順清涼飲俱見喉

【探究、按語】

生於舌下，如小舌狀故名。由心脾蘊熱，上沖舌本而成。舌下腫脹，色白或鮮紅，大都無痛，或大或小、大者偶有腫疊三數瓣者，亦稱蓮花舌，日漸擴大，甚則舌本轉動不利，妨礙言語飲食，兼有粘涎難唾，按之軟堅。先洗淨口腔，用「烏辛散」合「磨風膏」噙化、唾出痰涎、再擦「冰硼散」。內服「黃連解毒湯」、「黃連瀉心湯」、或「犀角地黃湯、不必針刺、都能收效」。

木舌係舌體腫脹如木，並無痛楚、堅硬似甲，甚則塞滿口中，不能轉動，言語

飲食不利，常伴身熱頭重等證，屬熱病危重之候。內服重用散風清熱解毒之劑，方選「九味敗毒湯」、或「大承氣湯」、「黃連解毒湯」、舌脹滿口，難以納藥者，以針刺舌尖或兩旁紫黑處、出血至腫減為度，外吹「冰硼散」；

紫舌脹則舌本堅硬疼痛，宜刺令出血，搽「冰硼散」或「四黃散」、內服選「涼膈散」去大黃朴硝、加山梔牛蒡荆芥等、或「黃連瀉心湯」。

胎瘤第一百十七

【原文】

胎瘤者。初生小兒。頭上胸乳間腫起大者如饅。小梅李。此皆始中瘀凝滯而成。須候兒滿月外。方可用針刺破。出如赤豆汁則安。內服五福化毒丹。

五福化毒丹 治小兒蘊結胎毒。以及諸瘡癰瘍。傷風斑症。口舌生瘡。痰涎壅盛。讐言煩燥。夜睡不甯者。 元參 桔梗 赤芍一錢 人參三錢 黃連 龍膽草 青黛 牙硝一錢 甘草三錢 水片三分 珠砂二錢 金箔二十張 玉衣一錢 右爲末。煉蜜丸芡實大。每服一丸。薄荷燈心湯化服。兼治瘡症後餘毒上攻。口齒涎血臭穢。以生地黃汁化下。如無地黃。竹葉燈心湯亦可。

【探究、按語】

初生兒雖在滿月之後，服藥仍非所宜，如以刀針亦須慎之，尤以血瘤，更在禁刺之列。參考第十一瘻瘤。

鵝口瘡第一百十八

【原文】

鵝口瘡皆心脾二經胎熱上攻。致滿口皆生白斑雪片。甚則咽間疊疊腫起。致難乳哺。多生啼叫。以青紗一條裹筋頭上。蘸新汲水揩去白胎。以淨爲度。重手出血不妨。隨以冰硼散搽之。內服涼膈之藥。

鵝口瘡應用方 冰硼散翳膏 涼膈散翳膏

【探究、按語】

又名雪口，口內一片白膜，狀如鵝口故名，以小兒居多。屬心脾二經之熱，初生兒則屬胎熱上攻所致。滿口白色斑點作痛，甚則波及咽喉，斑如雪片，難於哺乳，流涎煩躁啼哭不安，或身見微熱等証。內服選用「黃連解毒湯」、「涼膈散」、

「地骨露」等，外治法古代都用青紗（古時染紗都用青黛為染料，今已不易得），今用消毒紗布亦可，揩去白色斑膜，以淨為度，出血無妨，隨用「冰硼散」搽之，或蜂蜜調用。兼用輔助治法，以「清香餅」貼敷足底心湧泉穴，一日一換，連續二三天，收效更速。參考第九咽喉。

痘癰第一百十九

【原文】

痘癰乃出痘滯漿不足。毒流於脾肺二經。致手腳胸背。結成漫腫。大如桃李。多發在收疪之後。身涼不渴者為吉。有些不必內消。宜貼太乙膏。候膿熱針之。元氣虛弱者。兼服保元湯。助脾健胃為要。

保元湯。治痘癰出膿之後。脾胃虛弱膿清不斂者。人參 黃耆 白朮 茯苓 甘草 薑一片。棗二枚。水一鍾半。煎六分。食遠服。

【探究、按語】

隨處可生，生於四肢者輕，身軀者重，單生者毒在肌肉順，連發數處者深而險，若結於骨節之間者其毒深盛。其因由漿滯不足，毒未盡透，留結肌肉經絡之間而成。大小不一，初起漫腫不紅。凡癰初起皆以消為主，唯痧痘病後結毒所成者，不易消散，釀膿亦最快，大都必刀剖去膿而安。其他參考第一癰疽原委論。

痘疔第一百二十

【原文】

痘疔乃痘毒升發不盡。留於心肝二經。初生紫點。次日變黑。毒淺者浮高而潤。毒甚者深陷而焦。其發多出於七朝上下將疪之際。又生於臂腿手足。身溫疮潤音清者吉。發在肚腹腰腎。身熱色枯聲啞者凶。凡見此者。急用針刺疔根。插入蠟酥條。候四邊縫裂疔搖動者。用刀割去。搽玉紅膏。生肌完口。如針無血。插藥乾枯不變膿者。終為不治。但此症屬有餘。首尾俱宜加減鼠黏子湯為要。

加減鼠黏子湯 鼠黏子 天花粉 知母 荆芥 山梔子 甘草 水二茶鐘。淡竹葉燈心各二十件煎服。身熱加柴胡黃芩。有痰加麥冬貝母。咽啞加元參桔梗。咬牙加薄荷石膏。便秘加蜂蜜元明粉。昏憤加黃連硃砂。

。痴枯加當歸生地。戀疤加蟬蛻川芎。

八珍湯
八珍湯 醫治痘疔落後。氣血虛弱膿水出多。不能生肌收斂。

痘疔應用方 蟬酥條
見行 玉紅膏
見行

【探究、按語】

疔瘡種類繁多，歷代醫家按辨症論治，作出汗、清、下三法，但在用汗法時，忌用辛溫散風藥，因古有“疔毒宜聚不宜散”之訓，在用下時，亦忌峻下，以免虛其表而致邪陷也，即針刺用刀亦有一定規章。參考第五疔瘡。

黃水瘡第一百二十一

【原文】

黃水瘡者。頭面耳項忽生黃色。破流脂水頃刻沿開多生痛癰。此因日曬風吹。暴感濕熱。或因內餐濕熱之物。風動火生所致。治宜蛤粉散搽之必愈。真君妙貼散亦效。

蛤粉散 蛤粉 石膏禹 輕粉 黃柏苦研各共爲細末。涼水調搽。冬月麻油調亦好。

黃水瘡應用方 真君妙貼散
見行

【探究、按語】

頭面耳項甚則全身皆生，以小兒爲多。皆因日曬風吹，暴感濕熱或脾胃積熱而生。初如粟米，癰且兼痛，破流黃水浸淫成片，膿水相染，隨處可生。內服「升麻消毒飲」、癰痛相兼，或伴身熱者，可選「龍膽瀉肝湯」、「消風散」。熱甚者外用「青蛤散」，濕盛者敷「碧玉散」。

卷十二

大人口破第一百二十二

【原文】

口破有虛火。實火之分。色淡色紅之別。虛火者。色淡而有白斑細點。甚者陷露龜紋。脈虛不渴。此因思慮傷脾。多醒少睡。虛火妄動而發。宜四物湯。加黃柏知母丹皮肉桂。以爲引導。從治法也。外以柳花散搽之。實火者。色紅而滿口爛斑。甚者腮舌俱腫。脈實口乾。此因膏粱厚味。醇酒炙博。心火妄動而發。宜涼膈散外搽赴筵散。吐涎則愈。如口舌生瘡。舌乾黃硬作渴者。加減八味丸。以滋化源。俱禁水漱。

柳花散 黃柏一兩 青黛一錢 肉桂一錢 冰片三分 各爲細末。共再研。瓷罐收貯每用少許吹之。

赴筵散 黃連 黃柏 黃芩 梔子 乾薑 細辛各等分 右爲末。吹患處。

口破應用方 四物湯加減 涼膈散加減 加減八味丸加減

【探究、按語】

亦稱口瘡，甚於口瘡者稱口糜或口疳。起因由思慮太過，睡眼不足，心腎不交，虛火上炎所致，或由膏粱厚味，醇酒炙博，心脾實火妄動而成。虛火之証，見滿口淡紅白斑點點，甚則龜裂，脈虛不渴，宜服「四物湯」加黃柏知母丹皮，稍加玉桂爲引，或「六味地黃湯」，外搽「柳花散」。實火之証，則色艷紅，滿口班爛，甚則腮舌俱腫，脈實有力，口乾渴，宜「涼膈散」，「甘露飲」或「柴胡地骨皮湯」，勢輕者「加味甘桔湯」，外搽「赴筵散」或噙化「二冬散」。虛寒証則食慾不振，大便溏泄，脈遲緩，苔薄質淡者，可用「理中湯」加黃連，或「八味丸」。

脣風第一百二十三

【原文】

脣風乃陽明。胃火上攻。其患下脣發癢作腫。破裂流水。不疼難愈。宜銅粉丸泡洗。內服六味地黃丸自愈。

銅粉丸 銅青五分 官粉三分 明礬二錢 麝香一分 冰片三分 黃連二兩切片 輕

粉五錢

右共爲細末。黃連膏丸如芡實大。每用一丸放碗內。湯泡紙蓋。候煥頓熱。用上面清水勤洗之自愈。

【探究、按語】

又名唇癰，多生下唇。由陽明胃經風火凝結而成。初起發癰，色紅作腫，時輕時重，但不消退，唇色日漸變深，久則破裂糜爛，流膿滲血，疼痛如無皮之狀，或有脫屑結痂，交替發作，口唇不時觸動，纏綿不愈。俱以「雙解通聖散」，「四物消風飲」加減，或「六味丸」。外以「黃連膏」或「紫歸油」頻抹，出血者「銅粉丸」泡洗。

臭田螺第一百二十四

【原文】

臭田螺乃足陽明胃經濕火攻注而成。多生足指腳丫。白斑作爛。先癰後痛破流臭水。好似螺鰐。甚者腳面俱腫。惡寒發熱。先宜甘草湯洗淨貼蟾酥餅。三日三枚。後用珍珠散豬脊髓調搽膏蓋。掀腫處用真君妙貼散敷之。其腫漸消。勿即步履。

臭田螺應用方 蟾酥餅膏門 珍珠散膏門 真君妙貼散膏門

【探究、按語】

治法參考第八十四，婦人腳丫作癰。

牛程蹠第一百二十五

【原文】

牛程蹠乃程途奔急。熱腳下水見風。以致氣滯血枯。結成頑硬皮肉。榮衛不滋。漸生疼痛。腫高突起。腳難行走。久則破裂膿水。每日溫湯洗淨。搽牛角散。又有內膿攻注。皮頑難破者。以大線針鋒頭挑破。出膿乃寬。硬皮敲破者。剪而去之。肉不生者。玉紅膏長之。肉滿不生皮者。珍珠散搽上。生皮乃愈。

牛角散 牛角尖膏 水龍骨 松香 輕粉膏 共研爲末。牛骨髓調搽。虛弱者兼服十全大補湯。

牛程蹤應用方 玉紅膏^{翳門} 珍珠散^{翳門}

【探究、按語】

爲足底潰爛，經久難愈之痼疾，亦稱漏蹄風。由於肝腎虛損，氣血不足，或熱腳冷洗，風寒鬱於皮毛，氣滯血枯而成。初起結腫不能任步，久則堅腫痛甚，繼則潰破，膿汁清稀，經久不愈。肝腎不足者服「左歸丸」合「虎潛丸」，氣血不足者服「十全大補湯」，外用「牛角散」，「生肌散」或「珍珠散」，蓋以「玉紅膏」。

蟻蟇蛀第一百二十六

【原文】

蟻蟇蛀多生手指節中。不紅不熱。腫如蟬腹。乃手少陰痰氣凝滯而生。初起不疼。日久方痛。痛久方癧。腫仍不消。蟾酥餅膏貼漸作稀膿。近者一載。遠者三年。此症體弱者有之。內兼補劑。免變癆瘍之病。

蟻蟇蛀應用方 蟾酥餅^{翳門}

【探究、按語】

流痰之患手部者，稱蠟蛆串，患指者稱蟻蟇蛀，實與第二十六多骨疽爲同一症候，治法等參考多骨疽。

田螺泡第一百二十七

【原文】

田螺泡多生手足。忽如火燃。隨生紫白黃泡。此脾經風濕攻注。不久漸大。脹痛不安。宜線針挑破。泄去毒水。太乙膏蓋。挑破又生者。內服解毒瀉脾湯可愈。

解毒瀉脾湯 防風 牛蒡子 山梔 石膏 黃芩 蒼朮 甘草 木通
錢一 水二鍾燈心二十根。煎八分。量病上下。食前後服之。

田螺泡應用方 太乙膏^{翳門} 蟾酥餅^{翳門} 玉紅膏^{翳門}

【探究、按語】

生手腳皮膚病之一種，因脾經濕熱，外受風邪所致。治以利濕清熱，散風解毒，方用「解毒瀉脾湯」或「龍膽瀉肝湯」，久久不愈者「甘麥大棗湯」。參考八十四婦人脚丫作癢及一〇六臭田螺。

皺痛第一百二十八

【原文】

皺痛多起於手足。乃風寒鬱於皮毛。致血不榮於肌表。皮槁多痛。似無皮之狀。宜葱湯浸洗良久。隨以潤肌膏擦之。勿見風冷。就暖自愈。又每年逢冬即者。須三伏時曬搗爛大蒜間擦三次。不再發。

【探究、按語】

皺痛與裂瘡相似，亦稱裂口瘡或乾裂瘡症，屬一種發生於手足之枯燥乾裂症，手腳皮膚枯裂乾痛，似無皮之狀；多在秋冬發病，素有皮膚病者亦患。治法同手足破裂，重外治，「玉肌散」洗，「潤肌膏」潤之。參考第八十五手足破裂。

凍風第一百二十九

【原文】

凍風者。肌肉寒極。氣血不行。初起紫斑久則變黑。腐爛作膿者以碧玉膏主之生肌斂口。

碧玉膏 治凍風皮肉損爛。膿血淋漓疼痛不止者。

獨勝膏 治凍風凍跟凍耳。每遇冬寒則發。六月初六十六二十六日。

用獨蒜搗膏 日中曬熱。在於遇冬所發之處擦之。忌下湯水。一日共擦三次。可以不發。又每常凍風。用茄根同葱煎湯浸洗。亦不重發。

【探究、按語】

習稱凍瘡。都生手足耳邊。由受嚴寒之氣著凍，傷及皮肉而成。初起成塊狀，結腫軟綿，遇熱則癢，搔壓又痛，初紅後紫，久則變黑，腐爛作膿，久不收斂，常常須待春暖始痊。初起時即在著凍結腫處墊衣揉搓，令氣血活動，次用涼水頻洗，甚者用冰一塊，絹包溻之，以僵塊化盡為度，或間貼「陽和解凝膏」，如潰爛，按一般潰瘍處理，以生肌長肉為主。

陰蟲第一百三十

【原文】

陰蟲又名八腳蟲。乃肝腎二經濁氣所成。生此不為清吉（潔）。銀杏散津調擦之。內服六味地黃丸。每斤加蜜炒黃柏一兩。蘆薈五錢。以清化源。愈後不發。

銀杏無憂散 水銀黃 杏仁皮_去膏 輕粉 雄黃 狼毒 蘆薈黃 蘇香
除水銀。杏仁膏。餘藥共碾篩細入。上二味。再研勻。先用土菖蒲煎湯洗之。用針挑去蟲孔。隨用津唾調擦。使藥氣入內。則不復生。切忌牛犬髓肉。

陰蝨應用方 六味地黃丸歸

【探究、按語】

陰風爲風病之一種，寄生於陰部及肛門邊之陰毛，時而貼伏皮膚吸血，常搔破成痂，並見斑塊。與不潔有關，能互相傳染。外用「銀杏無憂散」或「翠雲散」擦擦，菖蒲百部煎水日洗。此症以外治爲主，內服者「蘆柏地黃丸」，「六味丸」選用。

葡萄疫第一百三十一

【原文】

葡萄疫其患多生於小兒。感受四時不正之氣。鬱於皮膚不散。結成大小青紫斑點。色若葡萄。發在偏體頭面。乃爲腑症。邪毒傳胃。牙根出血。久則虛人。初起宜服羚羊散。清熱涼血。久則胃脾湯。滋益其內。又有牙齦腐爛者。用人中白散。

羚羊角散 羚羊角 防風 麥冬 元參 知母 黃芩 牛蒡子桑 甘草甘 水二茶鍾。淡竹葉十片煎六分。食遠服。

胃脾湯 白朮 茯神 陳皮 遠志 麥冬 沙參桑 五味子 甘草甘 水二茶鍾。煎八分。食遠服。虛弱自汗者。去沙參。加入參黃耆各五分。

葡萄疫應用方 中人白散歸

【探究、按語】

屬斑之一種，斑多以色澤定名，葡萄疫者因色如紫葡萄而名，即紫斑症。除內科病傳變而發斑外，大致均屬中毒引起，與胃腸有關，亦稱過敏。可分癢與不癢兩種，又有稍高於皮膚，或與皮膚平行之別。其治法總以解毒或清內爲主，如「犀角地黃湯」，「化斑解毒湯」或「羚羊角散」，病久而虛者，量病情選「胃脾湯」，「四妙永安湯」等方，牙根出血者「清胃散」加減。

咬傷第一百三十二

【原文】

人咬爲患。良肉受傷。陽明胃經之脈。循頰車入齒縫。多火多熱。凡食經此無不燙爛下咽。又飲食炙燙之毒。無不侵襲。故傷人發腫。其痛異常。臭膿腐爛。痛徹連心。初咬時一日內。衆撒熱小便浸傷處。洗淨牙黃瘀血。咬孔上蟾酥餅貼之膏蓋。後出微膿漸愈。如咬時未經此法。致腫痛發脹。疼甚者。亦與童便浸洗浥乾。用粗紙燃蘸麻油點火。用烟燄薰咬處。良久方住。以解牙毒仍以蟾酥條插入孔內。膏蓋。候腫消時。換玉紅膏搽之。長肉完口。如有雜症相兼者。亦隨症而治。

葱白甘草湯 治咬傷掀腫疼痛。膿血淋漓臭穢腐爛者。用葱白二兩甘草五錢。水三碗。煎至二碗。每日洗淨傷處。瘀腐膿血。方用玉紅膏搽黑膏蓋漸愈。

咬傷應用方 蟾酥餅條翳 玉紅膏翳

【探究、按語】

人咬而傷者，今都注意口腔衛生，已無牙黃之慮，除應預防破傷風外，照一般創傷，先清理傷口，止血生肌，出血者「如聖金刀散」，「桃花散」，血止改「生肌散」，「玉紅膏」，即可生肌而愈。

風犬傷第一百三十三

【原文】

風犬朝夕露臥。感非時不正之氣。故心受之。其舌外出。肝受之。其目昏瞶。脾受之。其涎自流。肺受之。其音不出。腎受之。其尾下拖。五臟受毒。乃成風犬。全稟陰陽肅殺之氣。故常無故傷人。初咬即服救生散。令小便中行出血片。宜居靜室。忌諸口味發物。並忌見諸麻赤豆等物。及聞鑼聲。百日乃安。治之遲者。毒大而小便難出。必攻臟腑。久而成形。腹脹攻急。人聲若犬。眼神露白。則不可治。有愈後犯前禁復發者。仍死。

救生散 治風犬咬傷。用生斑蝥七個。去頭翅足。杭粉一錢同研。空心溫黃酒調服。一時許。小便行出血片白脂。乃惡物也。如便痛。煎甘草湯飲之自利。如毒未盡。次早再一服。至小便清白。方爲毒盡。

又方 治風犬咬。其人頂中必有紅髮一根。急須拔去。以追風如聖散敷傷處。抽毒氣。內服救生散。

追風如聖散 治風犬咬傷。隨用敷之。其毒即可拔出。細辛 防風 川烏 薄荷 草烏 川芎 白芷 蒼朮一 雄黃四錢 共爲末。溫酒調敷傷處。以紙蓋扎。早晚換二次。

【探究、按語】

由瘋犬瘋貓咬傷人體，其毒自傷口侵入，先著經脈，旋即攻於臟腑，引起恐水，發狂之一種急性危險疾患。自咬傷至發作，有爲期數天，一二個月或逾年之潛伏期，但以三個月許發病者較多數。初起有微熱頭痛，困頓恐懼，食少畏風戰慄，對聲、光，尤以風敏感，喉部緊，所咬處傷口雖愈，會有痛、癢、麻木感覺，四肢有如螞蟻爬行，中期約持續數小時或一二天。毒發時則發狂，急躁騷動，恐懼不安，發熱口渴，但見水即怕，聞聲驚恐，稍有刺激即引起抽搐，吞嚥呼吸困難，或作犬吠聲或失音。雖渴而不敢飲，飲亦不能下嚥，即見水，聞水聲時，咽喉即痙攣，涎流滋口。二三天後即現癱瘓，肌肉鬆弛，下頷下墜，唾液直流，眼神露白，瞳孔散大，呼吸息微，兩便俱閉或失禁，已屬病危，繼則神志昏迷而亡。

此病治法雖多，全效者少，初傷盡量吸出傷口惡血，內服破血逐瘀，使火毒得解，一旦病發仍以解毒逐瘀，鎮靜通利爲法，先進「人參敗毒散」加地榆紫竹根，合「玉真散」，狂亂者加雄黃、麝香，抽搐加蜈蚣二條研沖，小便澀痛者加琥珀、滑石，腹脹攻急加黑白丑，地榆，重則選「參附龍牡救逆湯」，「生脈散」與前方交替服用。又如「救生散」，「扶危散」，「解毒活命丹」等方，都用斑蝥逐瘀破血，其量似嫌過重，用散易影響口腔食道，須慎用。

另加注射免疫血清及犬病疫苗，以作預防，以策萬全。

惡蟲叮咬第一百三十四

【原文】

惡蟲乃各稟陰陽毒種而生。如蜈蚣用鉗。蝎蜂用尾。蛇以舌（齒）。見之者勿觸其惡。自不被螫。苟有所傷。各尋類而推治。

治蜈蚣咬方 用蟾酥餅磨濃塗傷處。粗紙燃醋麻油點火。用烟燄薰之。疼腫自消。或用雄雞糞。擂水以塗之。或用頭垢搽傷處。以燃燄薰之俱效。

人馬平安散 西牛黃_{四分} 冰片_{一分} 麝香_{一分} 蟾酥_{三分} 石膏_{三分} 太赤金箔
銀 火硝_{三分} 滑石_{四錢} 共研極細末。瓷瓶收藏。切勿洩氣。此方本治夏月受暑。頭目昏暈。或不省人事。或患痧腹痛吹入鼻中。立時起死回生。如驟馬受熱暈倒亦將此吹鼻即愈。

治蝎螫方 蝎有雌雄二種。雄者蟄人。痛在一處。雌者痛牽偏體。用井底泥敷痛處。乾則易之。一時無泥。取新汲水。以青布隨痛處搭之。溫則再易。又方五月五日。用黃蠍二兩溶化。將凝時。投雄黃硃砂細末各三錢。和勻捏成餅窩。仍用貓兒眼草白汁。端午時滴入窩內陰乾。愈久愈佳。復捏成塊密收。臨用取一米許。刺針尖上。以燈燄花開。滴正蟄之處。其痛即止矣。

治蛇螫方 用雄黃末。蘭葉搗汁。調敷腫上。內用半枝蓮搗爛。取汁一兩。熟酒四兩。和汁服之。蓋汗為效。仍用渣敷傷處亦妙。又方速用端午收採蒼耳草末五錢。水煎一錘。熱服蓋汗即安。如無端午收採者。便用常日採取陰乾者。煎服一兩。發汗亦效。

又治七寸蛇螫方 七寸蛇青色扁形。尖尾短足。紅口者毒輕。青口者毒重。以舌蟄人。其毒最惡。初蟄時用雄黃末一錢。生礬二錢均內溶化。將筋頭點藥傷處。日冷則易之。連點七次即愈。毒氣入裏者。解毒紫金丹。酒磨服一錢。蓋汗即愈。遲延毒走腫痛者。麻油燄薰之亦瘥。

治河豚毒方 河豚血毒中人。舌麻心悶。白茅根搗汁冷飲。子毒中人。昏悶腹脹。口噤難言。言非金汁不能解也。

【探究、按語】

原文所記都有實效，補充如後。

蜈蚣咬傷 五靈脂研末水調，莧菜，南瓜葉搗爛外敷。甘草雄黃等分研末油調敷。

蠍螫 先用拔火罐吸出毒汁，再以雄黃，枯礬等分研末茶水調塗。大蠍牛一只搗爛外敷。鮮馬齒，鮮大青葉，鮮薄荷葉，搗爛外敷。

蛇噉 酌服「蛇藥片」，「解毒消炎丸」。

蜂螫 米醋擦洗傷口，馬齒莧，野菊葉，鮮夏枯草任選一種搗爛外敷。鮮蒲公英折斷後將白色乳汁外擦。

水蛭（又名螞蝗） 醋、酒、鹽水，任選一種外擦。如進入鼻孔或陰道時，塗蜂蜜，香油，虫出時除去。

百蟲入耳第一百三十五

【原文】

百蟲入耳。乃偶然誤入。如蠅蚊細蟲。以麻油數點滴入竅中。蟲即自死。取出。如蜈蚣蜜蜂等大蟲。以肉炙香安耳邊。其蟲聞香自出。有蟲夜間暗入者。切勿驚慌響叫。逼蟲內攻。宜正坐點燈。光向耳竅。其蟲見光自出。對面有人見。其蟲不出。

【探究、按語】

唐「外台秘要」利用虫類趨光性特點，以火光在耳道口照之，誘虫自出，宋「聖濟總錄」首次記述死於耳道內之小虫“徐徐以物鉤出之”。如滴入少許麻油，則虫更易死易取，此等方法至今仍被採用。

誤吞針鐵骨哽咽喉第一百三十六

【原文】

誤吞針刺。哽咽疼痛者。用亂麻筋一團。搓龍眼大。以線穿繫。以線頭在外湯濕。急吞下咽。頃刻扯出。其針頭必刺入麻中同出。如不中節再吞再扯。以出為度。誤吞銅物。多食荸薺。化堅為軟。若吞鐵骨之類者。腸中不能轉動。覺墜者。多食青菜豬脂。自然送入大腸。與糞同出。諸骨哽喉。用玉簪花根八錢。各隨所犯之肉為引。煎湯服之。轉出乃愈。又諸骨硬於咽下。不能外出者。烏龍針推之。骨下則安。其法以細鐵線燒軟。對折雙頭。用黃蠟作丸如龍眼。裏鐵線頭上。外用絲綿裹之。推入咽內。其骨自然順下。不再推。又方用玉簪花根切片。煎湯漱之。徐徐吐出。其骨自軟。再用乾飯嚥之自下。

【探究、按語】

如明顯可見之物或鰓骨，以鉗輕輕取出即可。如深不可見之骨鰓，以魚刺鰓最為普見，小刺即刻飲醋少許即去，不去時威靈仙二一三錢煎湯慢慢吞嚥即化，或以燈心炙灰吹之，兼服「雙砂湯」即化，即其他骨鰓亦效。如有稜角之骨鰓，已過食道，吞吐不去時、用韭菜少許，切成二三寸許炒熟勿爛，少嚼即嚥，以便骨塊帶下入胃，由便排出，如較大之骨塊，或已久不去時應及時由專科處理為宜。其他如誤吞鎳幣等，用韭菜不切，炒熟少嚼即嚥，兼食飴糖，自能順下排出。

人面瘡第一百三十七

【原文】

人面瘡古有生者。近世罕聞。其瘡全似人面。眼鼻俱全。多生膝上。亦有臂患者。方書皆云。積冤所致。先須清心懺悔。改過自新。然後服十六味流氣飲。外用貝母爲末敷之。乃聚眉閉口。次用生肌斂口藥。亦可得愈矣。

人面瘡應用方 十六味流氣飲

【探究、按語】

凡先天不足，後天失調，脾腎兩虛，骨虧絡空，或寒濕外邪侵襲，或傷損而形成鶴膝風，鶴膝痰（流痰）破潰後，潰孔排列如人面五官狀者，古稱“人面瘡”治法參考多骨疽（流痰）。

陰毒第一百三十八

【原文】

陰毒乃純陰無陽。被天時寒冷肅殺之氣。侵入肌膚。沈於骨髓。致氣不能升。血不能行。凝滯經絡。疼痛切骨。初起不腫不熱。朝輕暮重。久則作腫漸紅。爛斑黑靨。臭水淋漓。穢氣薰蒸。腐爛漸開。終久必死。一人年三十歲。冬月隔港與鄰婦私交。房事方畢。忽婦夫回。慌忙隔江赴水而走。熱身受寒。五日後小腹大脣陰痛不腫。日夜響叫。至一月後。穀道傍生一爛斑。黑靨倒陷。諸藥不效。至半月大脣連黑。腐爛作臭。乾靨無膿。又十日大臟俱壞黑敗而死。又一人年四十歲。夏月好飲火酒。至夜赤身露臥。手膊連背。陰痛難忍。一月後肩發爛斑一塊。周圍微硬。色如紅棗。日漸延開。半月後。手膊半背。共成黑靨。臭穢不堪。一月不食而死。一人中年肥胖。冬夏好飲火酒。飲後隨吃涼水方臥。一日頸項作疼。微腫堅硬如石。三月外項大如頭。石硬不熱。真陰毒也。余辭不治。請別醫治之。項同身大。不食而死。又一人夜夢城隍拘見。責打二十喊叫。其妻喚醒。隨後受刑處。掀腫作痛。青紫急脹。視之真棒毒也。用針破流瘀血碗許。外肉腐爛作疼。調理兩月而安。此亦陰毒。故附記之。

【探究、按語】

陰毒大抵是指附骨脫疽及惡性腫瘍而言，特提出發病之因“寒暖失常，好飲火

酒”等，勸人應檢點生活，注意起居飲食，寓警世之意也。

失榮症第一百三十九

【原文】

失榮者。先得後失。始富終貧。亦有雖居富貴。其心或因六欲不遂。損傷中氣。鬱火所凝。隧痰失道。停結而成。其患多生肩以上。初起微腫。皮色不變。日久漸大。堅硬如石。推之不移。按之不動。半載一年。方生陰痛。氣血漸衰。形容瘦削。破爛紫斑滲流血水。或腫泛如蓮。穢氣薰蒸。晝夜不歇。半生疮瘡。愈久愈大。越潰越堅。犯此俱爲不治。予立二方。曾治數人。雖不獲全愈而不夭札速死。誠緩命藥也。

和榮散堅丸 治失榮症。堅硬如石。不熱不紅。漸漸腫大者。歸身熟地 茯神 香附 人參 白朮 橘紅膏 貝母 南星 酸棗仁、遠志 柏子仁 丹皮膏 蘆薈 角沈膏 龍齒一兩煅無 龍齒燒用 二兩乾煅亦可 珠砂一錢 右爲細末。煉蜜丸桐子大。每服八十九丸。食後用合歡樹根皮。煎湯送下。患者若猛省自覺。澹薄甘命。亦有十中一二得愈者。否則難脫然也。

飛龍阿魏化堅膏 治失榮症。及癰瘤乳岩瘰疬結毒。初起堅硬如石。皮色不紅。日久漸大。或疼或不疼。但未破者。俱用此貼。用蟾酥丸藥末一料。加金頭蜈蚣五條炙黃。去頭足研末。同入熬就乾坤一氣膏二十四兩。化開攪和重湯內頓化。紅綵攤貼。半月一換。輕者漸消。重者亦可不大。常貼保無後虞。

【探究、按語】

失營（營榮同義）一症，由本書首先提及，古稱四絕症之一。生頸部耳之前後。主要原因爲情緒不暢，憂思恚怒，氣鬱血逆，與火凝結而成，其他如頭部癌腫，鼻癌，喉癌等晚期，亦可蔓延及頸部而總稱失營。初起結核，小者如粟，大則如桃如李，頂突根收，按之石硬無情，推之不動，既不發熱，又無疼痛，皮色不變，日漸長大，過大者能腫及肩胸，或頭額等處，久則隱隱作痛，痛著肌膚，氣血漸衰，形容日瘦，如患處見有紫色斑點，是將潰之兆也。潰後但流血水而無膿漿，其味臭穢，愈潰愈硬，胬肉高突，凹進凸出，狀若假山湖石，至此其痛日增，痛徹心肺，漸至精神不守，氣不攝納，常見胸悶煩躁，納食減少，睡眠失常等等，體弱者往往出血而亡。

調治之法，首宜保持心情舒暢，減少煩惱，首服「和營散堅丸」，「加味逍遙

散」，次選「香貝養營湯」，「益氣養營湯」，「歸脾湯」，其他如「小金丹」，「醒消丸」，「犀黃丸」等皆可隨証酌用。未潰前，貼「飛龍阿魏化堅膏」，潰後「生肌玉紅膏」。患部禁忌艾灸，針刺，外塗腐蝕藥及切剖。總之治法雖多，也只聊盡人事而已。

中砒毒第一百四十

【原文】

砒乃陽精大毒之物。服之令人臟腑乾涸。皮膚紫黑。氣血乖逆而死。知覺早者。大蘭根葉搗汁灌之。輕則可解。無蘭處以生棗豆同水研爛。以水灌之。多則見效。如不解者。以金汁灌之必甦。甦後如顛不語者。每日以綠豆水飲之。毒盡則愈。

取金汁法 用大毛竹一連二節。用刀刮去外青。一半用磚孔節中。沈入大糞池內。一年後取起。以長流水浸一日。取起鑽開節孔。內蓄糞清。姿罐收貯。凡遇有中砒毒河豚毒。傷寒陽毒。發狂疔瘡瘍症。毒氣入裏。煩躁口乾。渴欲飲水。脈大有力者。並宜此藥。

【探究、按語】

砒中毒時，常見全身皮膚潮紅，或糠粃脫屑，重則皮膚大片剝脫，或見壯熱，嘔噦等証，或見大庖，皮膚剝落如燙火傷，病情危篤時脈見細數，舌絳苔剝。

治法以清營敗毒為法，內治為主，「清營湯」，「清瘟敗毒散」加減，如膚破滲水，陰液內傷，舌絳脈細數時，選「增液解毒湯」加減，以滋陰生津清熱解毒。

落下頸擊法第一百四十一

【原文】

落下頸者。氣虛不能收束關竅也。宜令平身正坐。醫者以兩手托住下頸。左右大指入口內。納槽牙上。端緊下頸用力往肩下捺開關竅。向腦後送。即投關竅。隨用絹條兜頸於頂上。半時許。去之即愈。

【探究、按語】

即下頸關節脫位，分單脫或雙脫。都由過度張口，呵欠，大笑或受擊受傷以及習慣性脫位。脫位後，有口張合不能自如，言語困難，嚼咀不便，流涎等狀。單脫

者，下頷向另側歪斜下垂，可在患側顎弓下摸到凸出及凹陷。雙脫者，下頷向前移位，雙側顎弓下可摸到下頷關節突出。手法復位：患者靠背坐定，助手側面將頭部固定，免在手法時動搖，先揉擦或熱敷頰車，醫者先以布或膠布裹護拇指，囑患者不必緊張盡量放鬆，將口張大。雙手拇指伸入患者口腔，按于兩側最後一只大臼齒上，餘指放頰面同時挾住下頷骨體，先用兩拇指往下按，俟骨體移動時再往裏推，餘指同時協助將下頷骨向上端送，聽到滑入關節聲響，即已正復，拇指速向二旁滑開。單側手法相似，只是患邊用力，另邊控制即可。復位後齒已對齊，頰車已無凹陷即妥。患處周圍稍加揉摩，頭帶繩住下頷一二日即可。如習慣性脫位者，酌量調補。

救自刎斷喉法第一百四十二

【原文】

自刎者。乃迅速之變。須救在早。遲則額冷氣絕矣。初刎時氣未絕。身未冷。急用絲線縫合刀口。繆上桃花散。多繆爲要。即以棉紙四五層蓋刀口藥上。以女人舊布裹腳。將頭抬起。周圍纏繞五六轉扎之。聽者仰臥。以高枕枕在腦後。使項鬢而不直。刀口不開。冬夏避風。衣被覆暖。待其氣從口鼻通出。以薑五片。人參二錢。用米一合。煎湯或稀粥。每日隨便食之。接補元氣。三日後急手解去前藥。用桃花散 刀口上。仍急纏札。扎二日急用濃葱湯。軟絹蘸洗傷處。浥乾。用抵腳挑玉紅膏。放手心上擦化。搽於傷口。再用舊棉花薄片蓋之。外用長黑膏貼裹。周圍交扎不脫。膏之兩橫頭。再用黑膏長四寸。闊二寸。豎貼膏上。上下黏連好肉。庶不脫落。外再用絹條圍裹三轉。針線縫頭。冬月三日。夏月二日。每用葱湯洗浥換藥。自然再不疼痛。其肉漸從兩頭長合。內服八珍湯。調理月餘。如大便結燥。用豬膽套法。不可用利藥。隻嗓俱斷者百日。單斷者四十日。必收功完口。此法曾治強盜郭忠。早隸沙萬。家人顧興。俱雙嗓齊斷將危者。又單嗓傷斷者十餘人。治之俱全活。

自刎應用方 玉紅膏 雙桃花散 如聖金刀散 雙八珍湯

【探究、按語】

輕者按外傷處理，重則應送專科急救。

試知百病死生法第一百四十三

【原文】

疾病非明醫不能決其凶吉。死生非神聖不能洞其機關。予得呂祖一枝梅方。真仙傳也。不敢私秘刊以傳世。

呂祖一枝梅治大人男婦小兒新久諸病。生死難定之間。用藥芡實大餅。貼印堂之中。點官香一枝。香盡去殊已後一時許。貼藥處有紅斑暈色。腫氣飛散。謂之紅霞捧日。病雖危篤。其人不死。如貼藥處。一時後無腫無紅。皮肉照舊不變。謂白雪漫野。病雖輕淺。終歸冥路。小兒急慢驚風。一切老幼痢疾。如貼之。紅腫即愈。此方可預知生死也。 碎砂

銀珠五錢 五靈脂三錢 麝香三分 草麻仁二錢 雄黃 巴豆仁各五錢 不去油 右各研細。於端午日淨室中午時共研。加油臘脂爲膏。姿合收藏。勿經婦女人手。臨時用豆大一圓捏餅貼印堂中。其效立見。用過餅送入河中。

【探究、按語】

此乃古法，今則診斷日趨完善，已可概斷一切順逆吉兇。

仙方活命飲今古不同論第一百四十四

【原文】

古人朴實。其七情干涉者少。而從風寒暑濕外感凝滯者多。故設仙方活命飲。攻散所滯之腫。服此得效者。十常八九。由病者五臟不虛耳。今人穿鑿大過。七情煩擾過甚。內臟無有不傷。每見曾服過此藥。其瘡必不起發。脾胃再無不傷。夫瘡不起發。脾胃傷敗。病者豈可得生。故今之治法。不論首尾標本。先必固脾胃。次行托藥。病無不活。愚見如此。幸同道者察焉。

【探究、按語】

方無新舊之分，病有古今之別，當今社會進步，生活日趨複雜，人體抗力不斷改變，即風俗習慣。嗜好等等，在診斷用藥時都得納入考量，綜合分析之後，始能作出合時適當之決定，才不致有誤也。

方劑

一 劍

〔一掃光〕 苦參 黃柏 烟膠 木鼈肉 蛇床子 紅椒 明礬 硫黃 楊子肉
樟冰 水銀 輕粉 白砒

〔一貫煎〕 沙參 麥冬 當歸 生地 柏子仁 川棟子

二 劍

〔二妙丸〕 黃柏 蒼朮等 薑汁和丸每服三錢。

〔二參湯〕 人參 元參等 水煎溫服。

〔二子消毒散〕 土茯苓 土 豬脂 研 杏仁 去皮尖 殭蠶 炒 蟬蛻 炒 牛膝 荆芥 防風 羌活
自角子 僵蠶 金銀花 等分 肥皂子 僵蠶 豬牙自角 僵蠶 水八碗，煎三碗，作三次服，如
結毒服三七日自癒。袖口疳，加黃柏一錢，肥皂子倍之，楊梅疳，加薏苡仁、皂刺
各一錢，側柏葉綠豆糯米各三錢。楊梅內疳，加海金沙五克皮白丑各一錢五分。

〔二冬散〕 天冬 麥冬 去心 元參 等分 研末爲丸，含口中或破碎處，丸化則癒。

〔二陳湯〕 陳皮 半夏 茯苓 火甘草 水煎服

〔人參敗毒散〕 人參 茯苓 枳殼 桔梗 柴胡 前胡 羌活 獨活 川芎 各一錢
甘草 五錢 每服二兩，加薄荷生薑同煎。

〔人參茯苓粥〕 人參 一錢 白茯苓 等分 共研末，同粳米一茶鍾，熬成粥，先以鹽湯將
口漱淨，後再食粥。

〔九味敗毒湯〕 黃連 荆芥 黃芩 連翹 牛蒡子 薄荷 木通 桔子 甘草
燈芯

〔七味地黃丸〕 地黃 山茱萸 山藥 茯苓 丹皮 澤瀉 肉桂

〔八寶珍珠散〕 兒茶 川連末 川貝母 各一錢 青黛 各一分 官粉 黃柏末 魚腦石
蜜 琥珀末 各一錢 人中白 二錢 硼砂 分 冰片 分 京牛黃 各五分 珍珠 各五分 豆蔻內煮半
時取出研末 納香 各二分 各研極細末，共兌一處，再研勻，以細筆管吹入喉內爛肉處。

〔八將丹〕 腰黃 五錢 冰片 分 蟬衣 二錢 蜈蚣 全蟬 五倍子 八錢 山甲 三錢 納香
三分 (加生半夏、生南星各八錢名十將丹)。

〔八味丸〕 五味子 肉桂 茯苓 山藥 丹皮 澤瀉 山萸肉 熟地黃 同正宗
加減八味丸

〔八寶生肌丹〕 石膏 輕粉 東丹 龍骨 血竭 赤石脂 乳香 没藥 治潰瘍
久不癒。

三 劍

- 〔小柴胡湯〕 柴胡 人參 黃芩 生薑 半夏 甘草 大棗
- 〔小薊散〕 小薊 百草霜 蒲黃炒 香附子姜炒 以上研細末，用搽牙上，半刻時，溫茶漱之。
- 〔千金葦莖湯〕 葦莖升 蕙苡仁炒 瓜瓣冬瓜仁炒 桃仁五十粒去皮尖炒研 水煎服。
- 〔千搥膏〕 草麻子升 天南星僵 乳香南 沒藥南 急性子南 銀硃南 血竭南 麝香三錢
- 〔千里奔散〕 用行遠路驟蹄心，用瓦煅存性，研細，每服三錢，熱黃酒沖服。
- 〔山甲內消散〕 穿山甲燄 當歸尾 大黃 甘草節僵 土木鼈僵 黑牽牛 殭蠶各一錢炒 酒水各一鍾，煎八分，空心服，渣再煎服，大便行三四次，方食稀粥淡味調理。
- 〔川歸止血丸〕 川芎五錢 全當歸五錢 黃耆五錢 神曲五錢 槐花五錢 地榆五錢 阿膠珠五錢 血餘炭五錢 荆芥炭五錢 木賊草五錢 共爲末，蜜丸，每服四一五錢。
- 〔三神丸〕 炒枳殼 煅皂角 炒五倍子等分 蜜爲丸每服四五錢。
- 〔三油膏〕 牛油 柏油 香油 銀朱等分 定粉 麝香各半錢 將三油，共合火化，入黃蠟一兩，溶化盡離火，再入朱麝官粉等末，攪勻成膏，搽患處，火烘之，以油乾滋潤爲度。
- 〔三妙散〕 檳榔 蒼朮生 黃柏炭等分 共研細末，乾撒肚臍，出水津溼成片，止癢滲濕，又治濕癬，以蘇合油調擦。
- 〔三因安腎丸〕 補骨脂炒 胡蘆巴炒 茴香炒 川楝子炒 繢斷箭等分 山藥 杏仁炒 白茯苓 桃仁炒 共研細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服二錢，空心淡鹽湯送下。
- 〔大補陰丸〕 黃柏鹽水炒 知母鹽水炒各四兩 熟地 龜板炙等分 猪脊髓鹽水炒 蜜丸，每服四、五錢。
- 〔大承氣湯〕 生大黃 枳實 厚朴 芒硝(沖服) 水煎服。
- 〔大薊散〕 大薊根 犀角 升麻 桑白皮 蒲黃 桔梗 甘草 杏仁。
- 〔大黃丹皮湯〕 大黃 丹皮 桃仁 冬瓜子 芒硝(沖服) 水煎服。

四 劍

- 〔六味地黃丸〕 熟地八兩 山萸肉 懷山藥各四錢 白茯苓 丹皮 澤瀉等分三錢 共爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服二錢，空心淡鹽湯送下。
- 〔六君子湯〕 人參錢 白朮二錢 茯苓錢 甘草錢 陳皮錢 半夏分量五錢 以上六味，薑三片，棗二。
- 〔化毒除濕湯〕 當歸尾 澤蘭 蘆苡仁 丹皮 赤芍 銀花 通草
- 〔化疔丹〕 蒼耳 | 草蟲 辰砂

〔化癬丹〕 元參 麥冬各一錢 白蘇子 白薇 甘草 紫苑 牛蒡 白芥子各一錢 百部三錢 煎服。

〔內補十宣散〕 人參 黃耆 當歸各一錢 桔梗 厚朴各一錢 川芎 白芷 肉桂 防風 甘草各一錢 共研末，每服三錢，熱黃酒調服，不飲酒者，木香煎湯調下。

〔內疏黃連湯〕 梔子 連翹 薄荷 甘草 黃芩 黃連 桔梗 大黃 當歸 白芍 檳榔 木香 此方治癰疽陽毒在裏，火熱發狂，發熱，二便秘澀，煩躁嘔噦，舌乾口渴飲冷等證，六脈沉數有力者，急服之，以除裏熱。

〔升麻消毒飲〕 當歸尾 赤芍 金銀花 連翹各一錢 牛蒡子生羌活 白芷 紅花 防風 甘草生升麻 桔梗 每味用二錢爲大劑，一錢五分爲中劑，一錢爲小劑，水二鍾，煎八分，食遠熱服。如瘡生頭面，減去歸尾紅花。

〔升陽散火湯〕 川芎各一錢 蔓荆子 白芍 防風 姜活 獨活 甘草 人參各一錢 柴胡 香附各半錢 葛根 升麻各一錢 殭蠶各一錢 生薑半錢 粝衣

〔五香連翹湯〕 乳香 木香 沉香 丁香 香附 黃耆 射干 連翹 升麻 木通 獨活 桑寄生 甘草各一錢

〔五味消毒飲〕 金銀花各一錢 野菊花 蒲公英 紫花地丁 紫背天葵子各一錢 水二鍾，煎八分溫服，渣如法再煎服，出汗爲度。

〔五虎丹〕 黃升各一錢 輕粉各一錢 黃連各一錢 煅石膏各一錢 梅片各一錢 研末外用。

〔五香丸〕 豆蔻 丁香 藿香 零陵香 木香 白芷 桂心 香附 甘松 檳榔 當歸

〔五神湯〕 茯苓 銀花 牛膝 車前子 紫地丁。

〔五寶丹〕 眞珠各一錢 琥珀各一錢 珠砂各一錢 乳石 木香 甘草 水煮各一錢 共研，每日用鮮土茯苓一斤上藥五分水煎服。

〔牛蒡解肌湯〕 牛蒡子 薄荷 荆芥 連翹 梔子 丹皮 石斛 元參 夏枯草

〔牛黃清心丸〕 九轉膽星各一錢 雄黃 黃連末各一錢 茯神 元參 天竺黃 五倍子各一錢 荆芥 防風 桔梗 犀角末 當歸各一錢 冰片 霽香 珍珠各五錢 京牛黃 輕粉各一錢 各研極細末，共和一處，再研勻，甘草熬膏和丸，如龍眼大，珠砂爲衣，日中曬乾，收入磁瓶內，將瓶口堵嚴，勿令出氣，臨服時一丸薄荷湯磨服。

〔牛黃散〕 牛黃 防己 犀角 羚羊角 人參 桂心 牛蒡子 生地 炙甘草

〔水金散〕 茅根 車前 血餘 龍骨 等分 為末吹之，其血即止。

〔丹皮湯〕 丹皮 桔梗仁各一錢 桃仁去皮 朴硝各一錢 大黃五錢 水二鍾，煎一鍾，去渣入硝再煎數滾，不拘時服。

五 劑

〔四君子湯〕 人參 茯苓 白朮 甘草 薑三片 粝二枚 水煎服。

- [四黃散] 荆芥 山梔子 大力子 黃連 黃芩 連翹 薄荷 木通 蒲黃
燈心草 甘草 共研細末擦患處。
- [四妙勇安湯] 玄參 當歸 銀花 甘草 日服一劑，水煎取汁，分三~四次服。
- [四物湯] 川芎 白芍 地黃 以上四味，水煎服。
- [四妙丸] 黃柏 蒼朮 當歸 生地
- [四物消風飲] 生地 當歸 荆芥 防風 赤芍 白鮮皮 蟬蛻 薄荷
獨活 柴胡 紅棗肉二枚，水二鍾，煎八分，去渣服。
- [必效散] 川槿皮 海桐皮 大黃 百藥煎 巴豆 分去油 蟹螯 全用 雄黃 輕粉
共研極細末，用水調藥，將癬抓損，薄敷，藥乾必待自落。
- [生肌白玉膏] 尿浸石膏 製爐甘石 石膏必須尿浸年（或用熟石膏），洗淨，再漂淨一月，然後煅熟研粉，加入製爐甘石粉和勻，以麻油少許調成藥膏，再加入黃凡士林（配製此膏時用藥粉十分之三，油類約十分之七）
- [生脈散] 人參 麥冬 五味子 日服一劑，水煎取汁頓服。
- [左歸丸] 熟地 山藥 山茱萸 菟絲子 枸杞子 淮牛膝 鹿角膠 龜板膠
蜜丸 日一~二次，淡鹽湯送服。
- [甘露飲] 天冬 麥冬 黃芩 生地 熟地 枇杷葉 石斛 枳殼 茵陳蒿
(一味藥) 甘草 水二鍾，煎八分，食後服。
- [甘麥大棗湯] 甘草 浮小麥 大棗
- [甘露消毒丹] 滑石 茵陳 石菖蒲 木通 川貝母 藿香 薄荷 白蔻仁 連翹
射干
- [平肝鎮心丹] 酸棗仁 五味子 熟地 肉桂 車前子 茯苓 茯神 龍齒 天冬
山藥 遠志 人參 硃砂
- [白膏藥] 此膏專貼諸瘡腫毒，潰破流膿。
淨巴豆肉 廪麻子 香油 蝦蟆 活鯽魚 先將巴豆肉、蓖麻子入油內浸三日，再將蝦蟆浸一宿，臨熬時入活鯽魚共燂焦，去渣淨，慢火熬油滴水成珠，離火傾於淨鍋內，再加官粉二斤半，乳香末五錢，不時攪之，冷定為度，用時重湯炖化，薄紙攤貼。
- [白虎熄風湯] 蟬蛻 生石膏 全蠍 白附子 蜈蚣 南星 鈎藤 黃芩 桑白皮 知母 水煎服
- [白虎湯] 生石膏 知母 梗米 甘草
- [田螺水] 大田螺一枚，用尖刀挑起螺蓋，入冰片末五釐，平放磁盤內，待片時

，螺竈內滲出漿水，蘸點患處，勤勤點之，其腫自然消散。

〔本事利膈湯〕 蘇葉 薄荷 荆芥 防風 桔梗 人參 牛蒡 甘草
（咽痛、口瘡疾多者，加殭蠶一兩，壯熱脈實者，去人參加犀角、元參、山豆根）。

〔加味甘桔湯〕 生地 元參 枳殼 桔梗 牛蒡子 防風 銀花 連翹
丹皮 五分 山甲片 蒲公英 瓣 甘草 分 水煎服。

〔仙遺糧湯〕 當歸 生地 防風 銀花 木通 蕺苡仁 連翹 白癩皮 黃連
白朮 甘草 皂角刺 土茯苓四兩，燈心二十根煎服。

六 劑

〔回春脫疳散〕 黑鉛五錢火化開，投水銀二錢五分，研不見星爲度，再加寒水石三錢五分，輕粉二錢五分，硼砂一錢，共研細末，先以葱艾花椒，煎湯洗患處，再撒此藥。

〔冰硼散〕 冰片 硼砂 元明粉 珠砂 共研極細末，用少許搽於瘡處，如咽喉痛，以蘆管吹之。

〔至寶丹〕 生烏 犀屑 生玳眉屑 琥珀 珠砂 龍腦 罂香 牛黃。

〔羊蹄根散〕 羊蹄根 級 枯白礬 級 共研勻，米醋調擦癬處。

〔江螵丸〕 天麻 雄黃 瓣 蜈蚣 瓣 江螵 殭蠶 瓢 野鴿糞 瓢 共研細末，作兩分，一分飯丸如梧桐子，硃砂爲衣，一分加巴豆霜二分五厘，飯丸如梧桐子大，每用硃砂藥二十丸，加巴豆藥一丸，二服加二丸。白滾水送下，至便利爲度，再服硃砂藥，病癒即止。

〔合掌散〕 硫黃 鐵銹 紅砒。

〔地黃飲〕 生地 熟地 何首烏 瓣 當歸 瓣 丹皮 黑參 白蒺藜 剥去
紅花 甘草 瓣 水煎，早晚服。

〔安宮牛黃丸〕 牛黃 鬱金 犀角 黃芩 黃連 梔子 雄黃 珠砂 冰片 罂
香 珠粉 研極細末，煉蜜和丸，金箔爲衣，以蠟護之。

〔竹葉石膏湯〕 竹葉 石膏 麥冬 人參（黨參） 半夏 穀米 甘草 一般日
服一劑，水煎，分二次服。

〔存命湯〕羌活 川芎 大黃 防風 半夏 草烏 全蠍 殭蠶 南星 白芷
蜈蚣 蟬蛻 天麻 附子 甘草 琥珀粉 珠砂 水煎服。

〔托裏散〕 黃耆 當歸 川斷 茯苓 白芍 香附 銀花 枸杞子 穿山甲 甘
草

〔托裏透膿湯〕 人參 白朮 穿山甲 級 白芷 級 升麻 甘草節 瓢 當歸 瓣 生
黃耆 級 皂角刺 瓢 青皮 瓢 水三鍾，煎一鍾，病在上部，先飲煮酒一鍾，後熱服

此藥。

七 劍

〔如意金黃散〕 此散治癰疽發背，諸般疔腫，跌撲損傷，濕痰流毒，大頭時腫，漆瘡火丹，風熱天泡，肌膚赤腫，乾濕腳氣，婦女乳癰，小兒丹毒，凡一切諸般頑惡熱瘡，無不可用，誠瘡科之佳藥也。

南星 陳皮 蒼朮
黃柏
黃芩
甘草
白芷
上白天花粉
厚朴
大黃
以上十味，共爲咀片，曬乾磨三次，用細絹羅篩，貯磁罐，勿泄氣。凡遇紅赤腫痛，發熱未成膿者，及夏月時，俱用茶清同蜜調敷。如欲作膿者，用葱湯同蜜調敷。如漫腫無頭，皮色不變，濕痰流毒，附骨癰疽，鶴膝風等證，俱用葱酒煎調敷。如風熱所及，皮膚亢熱，遊走不定，俱用蜜水調敷。如天泡火丹、赤遊丹、黃水漆瘡、惡血攻注等證，俱用大藍根葉搗汁調敷，加蜜亦可。湯潑火燒，皮膚破爛，麻油調敷，以上諸引調法，乃別寒熱溫涼之治法也。

〔如聖金刀散〕 松香
生白礬
枯白礬各一錢
共研極細末，磁罐收貯，臨用時撒於患處。

〔扶危散〕 蟹螯接日數用之如大虧已痊七日用七個
十日用十個去鉗足加糯米同炒去米
滑石
雄黃
麝香各二分
共研細末，每服一錢，溫酒調下，不飲酒者，米湯調下。

〔旱螺散〕 白田螺殼三錢
輕粉一錢
冰片
麝香各三分
共研細末，香油調敷。

〔何首烏酒〕 何首烏四兩
當歸身
當歸尾
穿山甲生地黃
熟地黃
蝦蟆膏
側柏葉
松鍼五加皮
川烏去皮
草烏各四錢
將藥入夏布袋內，紮口，用黃酒二十觔，同藥袋入蟬內封固，重湯煮三炷香，埋窖七日，開蟬取酒，時飲之令醺醺然，作汗避風。

〔防風當歸散〕 防風
當歸
川芎
生地黃各二錢
水煎服。

〔防己散〕 防己
朴硝
犀角
川芎
黃芩
黃耆
川升麻
共搗粗末，每用五錢，加竹葉三十片，水二鍾，煎八分服。

〔夾紙膏〕 黃丹
輕粉
兒茶沒藥
雄黃
血竭
五倍子
銀朱
枯礬等
共爲末，量瘡大小，剪油紙二張，夾藥於內，紙周圍用麵糊黏住，紙上用鍼刺孔，先將瘡口用葱椒煎湯洗淨，拭乾，然後貼上，以帛縛之，三日一洗，再換新藥貼之。

〔赤霜散〕 紅棗乙枚去核，入黃豆大小之紅砒一粒，絲線紮好，瓦上炙至煙盡爲度，悶熄冷透，再加冰片乙分研極細，吹或搽用。

〔沖和膏〕 此膏治癰疽發背，能行氣疏風，活血定痛，散瘀消腫，祛冷軟堅，誠良藥也。

紫荆皮
獨活
白芷
赤芍
石菖蒲
以上五味，共爲細末，葱湯

熱，酒俱可調敷。

[角刺粥] 角刺^{一錢} 糯米^{二合} 布袋同盛煮粥，如有鮮角煮（五月初旬可取）取鮮角數斤，打爛入鍋煮湯煎濃，濾出易水再煮，二三次後去渣，以汁歸一鍋，漫火煎熬或膏，每以膏二錢，同糯米煮粥日食，至癒方停。

[沙參清肺飲] 沙參 黃耆 合歡皮 白芨 太子參 桔梗 甘草 薏苡仁 多瓜仁

[辛夷清肺飲] 辛夷 甘草 煅石膏 知母 梔子（生研）黃芩 枇杷葉（三片去毛蜜炙） 升麻 百合 麥冬（去心） 食遠服，或加羌活、防風、連翹、薄荷。

八 劑

[承氣湯] 大黃 芒硝 甘草

[季芝卿魚膏] 活鯽魚肉 鮮山藥^{各等分} 以上共搗如泥，加麝香少許，塗核上。覺癢極勿搔動，隔衣輕輕揉之，七日一換，旋塗即消。

[青蛤散] 蛤粉^{一兩} 青黛^{三錢} 石膏^{一兩} 輕粉 黃柏^{五錢} 共研細末，先用香油調成塊，次加涼水調稀，薄塗瘡處。

[青蓮膏] 青黛^{一錢} 乳香 輕粉^{一錢} 麝香^{三分} 白砒^{一分} 共為細末，用香油調稠，薄攤紙上，用鎚鎚實，陰乾收之。每於臥時以泔水漱淨口拭乾，隨疳證大小，剪膏藥貼之，至曉揭去，再以泔水將口漱淨吐之，至晚再貼。

[拔疔毒丸] 雄黃 大黃 巴豆

[拔疔散] 鮮菊花汁 鮮紫花地丁汁。

[拔疔散] 砭砂 白礬 硃砂 食鹽^{用鐵鑄刀搗紅結白鹽} 各等分，擇丁日午時，研為細末收之。（外用）

[虎潛丸] 敗龜板^{四錢} 知母 黃柏^{二味炒} 熟地^{三錢} 牛膝^{一錢} 白芍^{一錢} 陳皮^{各二錢} 琉陽^{一錢} 當歸

[陀僧膏] 此膏專貼諸般惡瘡，流注瘰疬，跌撲損破，金刃誤傷等證。

南陀僧^{二十兩} 赤芍^{二兩} 全當歸^{三錢} 乳香^{五錢去油研} 没藥^{五錢去油研} 赤石脂^{二兩} 苦參^{四錢} 百草霜^{二兩} 銀駒^{一錢研} 桐油^{一錢} 香油^{一錢} 血竭^{五錢} 孩兒茶^{五錢} 川大黃^{半錢} 以上藥先將赤芍、當歸、苦參、大黃入油內燂枯，熬至滴水不散，再下陀僧末，用槐柳枝攪至滴水將欲成珠，將百草霜細細篩入，攪勻，再將群藥篩入，攪極勻，傾入水盆內，扯千餘下，再收入磁盆內，常以水浸之。

[陀僧散] 雄黃 硫黃 蛇床子^{各一錢} 密陀僧 石黃^{各一錢} 輕粉^{五錢}

[肥油膏] 番木鼈^{一錢} 當歸 黎蘆^{各五錢} 黃柏 苦參 杏仁 狼毒 白附子^{各一錢} 鯉

魚膽 用香油十兩，將前藥入油內，熬至黑黃色，去渣加黃蠟一兩二錢溶化盡，用布濾過，罐收。每用少許。

〔枇杷清肺飲〕 人參 分 枇杷葉 去蒂取葉 甘草 三分生 黃連 二錢 桑白皮 三錢 黃柏 一錢 水一鍾半，煎七分，食遠服。

〔枇杷葉丸〕 枇杷葉 黃芩 甘草 天花粉。

〔知柏地黃湯〕 熟地 山萸肉 山藥 潤瀉 茯苓 丹皮 知母 黃柏 分二次服用。

〔金黃散〕 大黃 黃柏 薤黃 白芷 南星 陳皮 蒼朮 厚朴 甘草 天花粉 共研細末 可用葱汁、酒、醋、麻油、蜜，菊花露、銀花露、絲瓜葉搗汁等調敷。(即如意金黃散)。

〔金鈴子散〕 元胡 川棟子

〔羌麻湯〕 羌活 麻黃 川芎 防風 枳殼 炒 白茯苓 石膏 煅 黃芩 細辛 甘菊花 蔓荆子 前胡 甘草 生 白芷 薄荷 各五分 生薑三片，水二鍾，煎八分服。

〔羌活勝濕湯〕 羌活 獨活 甘草 蔓荆子 防風 川芎 薏苡仁。

九 劍

〔枯痔散〕 砒霜 二兩 白礬 二兩 輕粉 四錢 蟾酥 一錢 共爲極細末，入小新鐵鍋內，上用粗磁碗密蓋，鹽泥封固，炭火煅至二炷香，待冷揭開碗，將藥研末，搽痔上，每日三次，換藥時用溫水洗淨患處，上至七八日，其痔枯黑堅硬，住藥裂縫，待其自落。

〔枸橘湯〕 枸橘 川棟子 秦艽 陳皮 防風 潤瀉 赤芍 甘草。

〔胡桐淚散〕 胡桐淚 細辛 川芎 白芷 各一錢 寒水石 二錢 生地 二兩 青鹽 三分 共研細末，乾搽牙齦患處，待頓飯時，以溫水漱去，少時再上。

〔祛風換肌丸〕 大胡麻 蒼朮 炒 牛膝 酒浸 石菖蒲 苦參 何首烏 生 花粉 威靈仙 各二錢 當歸身川芎 甘草 各一錢 炸爲細末，水丸綠豆大，每服二錢，白滾水送下，忌魚腥發物火酒。

〔祛濕消邪湯〕 薏苡仁 甘草 銀花 蒲公英 當歸

〔祛風地黃丸〕 生地 熟地 各四兩 白蒺藜 川牛膝 酒浸 知母 黃柏 枸杞子 各二錢 菖絲子 一錢 獨活 各一錢 共研末，煉蜜和丸，如梧桐子大，每服三錢，黃酒送下，夏月淡鹽湯送下。

〔追風散〕 錦紋大黃 六兩 川鬱金 六兩 蜈蚣刺 五錢 共研細末，每用五錢，加大風子油一錢五分，朴硝一錢，空心溫酒調服，或加熟蜜少許服之，以蜜解口，切不可臥，良久痛瀉數次不妨，以稀粥補之，如第一日服消風散，第二日即服此藥，第三

日服磨風丸，周而復始。瘦弱者十日內追風散，只用一服，老弱者勿服。

〔保和丸〕 白茯苓 半夏製 山楂肉 神曲炒 陳皮 蘿蔔子炒 連翹各五錢 右研細末，粥丸如梧桐子大，每服三十丸，白滾水化下。

〔紅花散瘀湯〕 紅花 當歸尾 僵刺去心 生軍去心 連翹去心 蘇木 穿山甲炒 石決明 殭蠶炒 乳香 貝母去心 黑牽牛去心 酒水各一鍾，煎八分空心服，行五六次，方食稀粥補之。

〔紅油〕 紅砒（打碎成細粒）麻油 入砂鍋同煎，至砒枯烟絕為度，去砒留油 擦擦瘡上，每日二、三次。若加熱烘療法，效果更佳。

〔紅靈丹〕 雄黃 乳香 煅月石 青礞石 没藥 冰片 火焰 珠砂 麝香 除冰片，麝香外，共研細末，最後加冰片及麝香，瓶裝封固，不出氣，備用。摻膏藥或油膏上，敷貼患處。

〔柳花散〕 玄胡索 黃柏 黃連 密陀僧 青黛 共為末，搽口內患處，有口津即吐。

〔芩桂朮甘湯〕 茯苓 桂枝 白朮 甘草 日服一劑，水煎，分二次服。

〔香貝養榮湯〕 白朮去皮 人參 茯苓 陳皮 熟地黃 川芎 當歸 貝母去心 香附各一錢 白芍酒炒

〔活血補中湯〕 柴胡八分 升麻分 當歸三錢 桃仁二錢 紅花四分 炙草一錢 蘇木五錢 黛參一錢 五分

炙黃耆二錢 陳皮六分 白朮五錢 。

〔草龍膽散〕 龍膽草 木賊草 草決明 香附 菊花 川芎 甘草

十 劑

〔桑菊飲〕 桑葉 菊花 杏仁 連翹 桔梗 甘草 蘆根。

〔荆防敗毒散〕 荆芥 防風 羌活 獨活 前胡 柴胡 桔梗 川芎 枳殼炒 茯苓去皮 人參 甘草五分 薑三片，水二鍾，煎八分，食遠服。寒甚加葱三枝。

〔栝石湯〕 栝蒌仁九錢 滑石五錢 蒼朮炒* 南星 赤芍 陳皮一錢 白芷 黃柏 黃芩 黃連各五分 甘草生二分 生薑三片，水三鍾，煎一鍾服之。

〔栝蒌牛蒡湯〕 栝蒌仁 牛蒡子炒 花粉 黃芩 生梔子炒 連翹去心 僵刺 金銀花 甘草生 陳皮一錢 青皮 柴胡五錢 水二鍾，煎八分，入煮酒一杯和勻，食遠服。

〔臭靈丹〕 硫黃末 油核桃 生豬脂油一錢 水銀一錢 捣膏用擦患處。

〔時珍正容散〕 猪牙皂角 紫背浮萍 白梅肉 甜櫻桃枝去核 焙乾，兌鷄糞白三錢，共研為末，每早晚用少許，在手心內，水調濃搓面上，良久以溫水洗面，用至七八日後，其斑皆沒。

〔浮萍丸〕 紫背浮萍大蜜丸 研細末，煉蜜為丸，如彈子大，每服一丸，豆淋酒送

下。

[射干麻黃湯] 射干_{三錢} 麻黃 生薑_{四錢} 細辛 紫菀 款冬花_{三錢} 大棗_{五枚} 五味子 半夏_錢 水煎溫服。

[真武湯] 茯苓 芍藥 生薑 白朮 附子 水煎服。

[秦艽丸] 秦艽 苦參 大黃_{一錢} 黃耆_{二錢} 防風 漏蘆 黃連_{一錢} 烏蛇肉_{五錢} 酒浸焙乾
以上爲細末，煉蜜爲丸，如梧桐子大，每服三十丸，食後溫酒送下。

[秦艽鱗甲散] 秦艽 鱗甲 地骨皮 柴胡 知母 當歸

[益胃湯] 沙參 麥冬 生地 玉竹 冰糖

[柴胡疏肝飲] 柴胡 枳殼 芍藥 香藥 香附 川芎 甘草。

[柴胡清肝湯] 生地 當歸 白芍 川芎 柴胡 黃芩 山梔 天花粉 防風
牛蒡子 連翹 甘草 水煎服。

[柴胡地骨皮湯] 柴胡 地骨皮。

[海桐皮湯] 海桐皮 透骨草 沒藥 乳香 當歸 川芎 自芷 川椒 紅花
甘草 威靈仙 丹皮 煎湯後外洗，每日薰洗一～二次，每次三十分鐘，每付用六
～十次。

[桂附八味丸] 熟地 山藥 山萸肉 丹皮 茯苓 澤瀉 附子 肉桂。

[桂枝加當歸湯] 桂枝 芍藥 甘草 生薑 大棗 當歸。

[烏藥順氣散] 烏藥 橘紅_{二錢} 枳殼_{一錢} 白芷 桔梗 防風 殭蠶_炒 獨活 川芎
{一錢} 甘草{五分}。水二鍾，生薑三片，煎八分服。

[烏辛散] 赤芍_兩 草烏_兩 桔梗_{五錢} 荆芥穗_{五錢} 甘草_{五錢} 柴胡_{三錢} 赤小豆_{六錢} 連翹_{五錢}
細辛_{四錢} 紫荆皮_兩 自角_{五錢} 細生地_錢 共研細末，磁瓶收藏，臨用以冷開水調噙口
內（亦可外敷），如牙床浮腫者，加南星末少許。

[烏賊骨散] 烏賊骨適量，去甲，研細末。吹撒鼻竇出血處，或撒于棉片、紗條
上，貼壓于出血處。

[消毒神聖湯] 銀花 天花粉 當歸 生甘草 蒲公英。

[消癰丸] 玄參_{五錢} 牡蠣_{一錢} 貝母_{去心蒸} 共末爲丸，每服三錢，開水送，每日二服
。

[消痔止痛方] 防風_{二錢} 秦艽_{三錢} 蒼朮_{一錢} 熟大黃_{五錢} 炒黃柏_分 當歸尾_{二錢} 澤瀉
_分 炒黃連_分 大生地_{二錢} 枳殼_分 桃仁_{五錢} 皂角子_{一錢} 檳榔_{五錢} 煎服。

[消腫膏] 川連粉 橄欖核_錢 等分除火性，以田螺水調成膏。（痔瘡用）

[消風導赤湯] 生地 茯苓 銀花 牛蒡子 白鮮皮 薄荷 黃連 木通 甘
草 燈芯。

[神效瓜萎散] 大瓜萎、當歸、甘草、沒藥、乳香。用黃酒二碗加入煎至大半碗，溫服。

[神應消風散] 白芷、全蠍、人參。共研細末，勿食晚飯，次日空心溫酒送下。

[通竅活血湯] 赤芍、川芎、桃仁、紅花、麝香、大棗、生薑、葱。

[通聖消毒散] 荆芥、防風、芍藥、連翹、甘草、川芎、當歸、薄荷、黃芩、梔子、滑石、桔梗、石膏、芒硝、大黃、麻黃、牛蒡子。

[逍遙散] 柴胡、白芍、當歸、白朮、茯苓、炙甘草、生薑、薄荷。水煎服。

十一 劍

[參附龍牡救逆湯] 人參、附子、龍骨、牡蠣。

[參附湯] 人參、附子。或加麥冬。

[參麥散] 人參、麥冬、五味子。

[參苓白朮散] 人參、茯苓、白朮、白扁豆、陳皮、薏苡仁、山藥、甘草、蓮子、砂仁、桔梗。

[脫痔膏] 淨熟豬油八錢、紫草錢。布包入油煎約十分鐘，去紫草，再加麻油一錢、黃脂八錢、白蠟八錢。入煎油熔化候冷。再加麝香末三分、牛黃末三分、珍珠粉三分、輕粉末三分、冰片三分、熊膽三分。攪勻。

[理中湯] 人參二錢、白朮三錢、乾薑一錢、甘草五分。以上四味，水煎服。

[勒馬聽微絲] 白砒末一分、麝香三分、青綿蠟、青黛末一兩。用香油拌勻，用時先以清米泔水漱口，次將絲桃少許，塞於牙根縫內，日三易之。

[梔子丸] 梔子、川芎、大黃、豉、木蘭皮、甘草。

[麻黃一劑飲] 麻黃、防風、銀花五錢、白癩皮三錢、當歸、胡麻三錢、甘草、羌活、秦艽各一錢。用肥羊肉半斤、河水一大碗。煎至一碗，取汁去浮油，將上藥煎至碗許溫服，以羊肉淡食過口，食後避風，取汗為度。

[麻黃宣肺酒] 麻黃、麻黃根各二錢。頭生酒五壺，將藥入酒內，重湯煮三炷香，露一宿，早晚各飲三五杯，至三五日出膿成瘡，十餘日則膿盡，膿盡則紅色退，先黃後白而癒。

[紺珠膏] 此膏治一切癰疽腫毒，流注頑癰，風寒濕痹，瘰疬乳癰，痰核血風等瘡，及頭痛牙疼，腰腿痛等證。

製麻油四錢。製松香一錢。將麻油煎滾，入松香文火溶，化柳枝攪候化盡，離火下細柏末二兩三錢，攪勻即傾於水內，拔扯數十次，易水浸之聽用。瘻血腫毒瘰疬等瘡但未破者，再加魏香散，隨膏之大小患之輕重每加半分至三分為率。毒深膿不盡，及頑瘡對口等證，雖潰亦用此膏。未破者貼之勿揭，揭則作癰，痛亦勿揭，能

速於成瘻。患在平處者，用紙攤貼。患有彎曲轉動處者，用絹帛攤貼。臘瘻及臀腿寒濕等瘻，先用茶清入白礬少許，洗淨貼之。頭痛貼太陽穴，牙痛塞牙縫內。內瘻等證，作丸用蛤粉爲衣服下。便毒痰核，多加魏香散。如瘻瘻再加銅青，如蠟拱頭癬毒貼之亦效。

〔清胃湯〕 元參 牛蒡子 黃芩 知母 石膏 桔子 貝母 壘蠶。

〔清骨散〕 銀柴胡 龜甲 炙甘草 秦艾 青蒿 地骨皮 胡黃連 知母 水煎服。

〔清瘻敗毒飲〕 石膏 生地 犀角 黃連 山梔 桔梗 黃芩 知母 赤芍 玄參 連翹 甘草 丹皮 竹葉 水煎服。

〔清營湯〕 犀角(磨粉沖服) 生地 玄參 竹葉心 銀花 連翹 黃連 丹參 麥冬 水煎服。

〔清燥救肺湯〕 桑葉 石膏 人參 甘草 麻仁 阿膠 麥冬 杏仁 枇杷葉

〔清涼露〕 真熊膽_{三分} 梅片_{一分} 水調用。

〔清涼飲〕 當歸_{五錢} 赤芍_{二錢} 酒軍_{一錢} 炙草_{一錢} 防風_錢 桔子_{五錢} 連翹_{五錢}

〔清涼散〕 硼砂_{三錢} 人中白_{二錢} 黃連末_{一錢} 南薄荷_分 冰片_分 清黛_分 共研極細末，吹入喉癬腐處。

〔清脾除濕飲〕 赤茯苓 白朮_{半錢} 蒼朮_{半錢} 黃芩 生地黃 麥冬_{半錢} 桔子_{半錢} 澤瀉 連翹_{半錢} 茵陳蒿 枳殼_{半錢} 元明粉_{半錢} 水二鍾，竹葉二十片，燈心二十根，煎八分，食前服。

〔清涼膏〕 水潑開石灰末一升，加水四碗，攪渾澄清汁一碗，加香油一碗，以筋順攪數百轉，其稠黏如糊，蘸掃傷處。

〔涼血四物湯〕 生地 當歸 赤芍 川芎 紅花 茯苓 黃芩。

〔掃風丸〕 蒼朮 附子 桂枝 秦艾 追地風 千年健 白芷 草烏 威靈仙 川芎 鈎藤 木瓜 菟絲子 肉桂 天麻 牛膝 何首烏 青礞石 知母 桔子 白花蛇 苦參 白蒺藜 蒼耳子 苡仁 荆芥。

〔蛇藥片〕 大薑 苦參 木香 茜草 婆婆針 防己 萬年青各等量，製成片劑 日服三次。

〔蛇床子散〕 蛇床子 大楓子肉 松香 枯礬 黃丹 大黃 輕粉 共爲末，麻油調擦，爛者乾滲之。

〔陽和湯〕 熟地_兩 肉桂_皮 麻黃_分 鹿角膠_錢 白芥子_錢 姜炭_{五分} 生甘草_錢 煎服。

〔陽和解凝膏〕 鮮大力子梗葉根_{半斤} 活白鳳仙梗_{半斤} 大麻油_{半斤} 先煎至枯去渣，次

日用川附 桂枝 大黃 當歸 肉桂 官桂 草烏 川烏 地龍 殭蠶 赤芍 白芷 白蘚 白芨 川芎 繢斷 防風 荆芥 五靈脂 木香 香櫟 陳皮 再煎藥枯，濾渣隔宿油冷，見過斤兩，每油一斤，用炒透桃丹七兩攪和，明日文火再熬，至滴水成珠，不黏指為度，以濕草紙罨火，移鍋放冷處，將乳香 沒藥末 蘇合油 犀角粉 研細入膏，攪和極勻，出火氣，半月後攤貼。

〔掃雪散〕 獨核肥皂（分開去核填入砂糖） 巴豆仁（每片加二粒半）將皂仍舊合好，紮緊泥裏入火煅之，去泥研細，加入輕粉，檳榔各八方再研細，香油調敷，剃頭後，以湯洗，以藥敷，止癩乃止。

〔華佗累效散〕 乳香 磨砂 輕粉 橄欖核（燒成性）三枚 黃丹 共研細末，香油調敷。

十二 劍

〔黃耆內託散〕 黃耆 紫草 當歸 川芎 金銀花 白刺 天花粉 濤瀉 甘草 炙水二鐘，煎八分，食前服。

〔黃蠟膏〕 血竭 赤石脂 龍骨 共為細末，香油一兩，入血餘栗子大一團，燂枯去滓，再入黃蠟一兩，白膠香三錢，溶化盡，離火下血竭等末，攪勻候冷，磁罐盛之，用時搥作薄片，貼瘡上，絹帛縛定，三日後翻過貼之。

〔黃連膏〕 黃連 當歸尾 生地 黃柏 墓黃 香油十二兩，將藥燂枯，撈去渣，下黃蠟四兩溶化盡，用夏布將油濾淨，傾入磁碗內，以柳枝不時攪之，候凝為度。

〔黃連消毒飲〕 蘇木 甘草 陳皮 桔梗 黃芩 黃柏 黨參 藥本 防己 防風 知母 羌活 獨活 連翹 黃連 生地 黃耆 濤瀉 當歸

〔黃連解毒湯〕 黃連 黃芩 黃柏 生梔子各一分 水煎熱服。

〔散風苦參丸〕 苦參 大黃 防風 枳殼 元參 獨活 黃連 黃芩 梔子 菊花 共研細末，棟蜜為丸，如梧桐子大，每服三十丸，食後白滾水送下，日用三服。

〔貴金丸〕 即雙解貴金丸。

〔黑花蛇散〕 麻黃 黑花蛇六錢 蟲白附子 乾薑 川芎 附子 草烏 各三分 蟲梢 三錢 共研細末，每服一錢，熱黃酒調下，日二服。

〔換肌散〕 烏梢蛇 白花蛇 蚯蚓 各一兩 細辛 木鱉子 白芷 天麻 赤芍 蔓荆子 當歸 威靈仙 荆芥穗 甘菊花 不灰木 紫參 苦參 沙參 何首烏 石菖蒲 木賊 天門冬 川芎 白蒺藜 甘草 胡麻仁 蒼朮 各三錢 草烏 各三錢 蜜去皮 共研細末，每服五錢，溫酒調下，酒多更炒。

[搜風解毒湯] 防風 分 土茯苓 兩 米仁 錢 草薢 錢 木通 錢 銀花 錢 木瓜 錢 皂莢子 分 山豬肉 兩 炊服。

[犀角升麻湯] 犀角 七錢 升麻 五錢 防風 黃芩 白芷 白附子 各三錢 羌活 五錢 生甘草 一錢 分。

[犀角升麻丸] 犀角 五錢 升麻 兩 羌活 兩 防風 兩 白附子 五錢 白芷 五錢 生地黃 兩 川芎 五錢 紅花 五錢 黃芩 五錢 甘草 分生 各研細末，合均蒸餅爲小丸，每服二錢，食遠臨臥，用茶清送下。

[犀角飲子] 犀角 分 赤芍 甘菊花 元參 木通 赤小豆 炒 石菖蒲 各一分 甘草 一錢 生薑三片，水二鍾，煎八分服。

[草薢化毒湯] 草薢 歸尾 丹皮 牛膝 防己 木瓜 蕺苡仁 秦艽 水煎服。

[草薢滲濕湯] 草薢 蕺苡仁 黃柏 赤苓 丹皮 澤瀉 滑石 通草 水煎服。

[腋香散] 密陀僧 生龍骨 紅粉 冰片 木香 白芷 分別研細和勻，紗布包，撲患處，每日一次。

[補腎湯] 破故紙 苜香 元胡 牛膝 當歸 杜仲 知母 黃柏。

[補氣瀉榮湯] 連翹 升麻各六錢 桔梗 五錢 黃芩 生地 各四錢 黃連 蚊虻 去土 當歸 黃耆 蘇木 全蠍 各三分 人參 白豆蔻 各二錢 甘草 生 水二鍾，酒一鍾，煎至一鍾，去渣，又用胡桐激一分。

[補中槐莢湯] 柴胡 分 升麻 分 當歸 錢 黃耆 二錢 炙草 錢 白朮 五錢 陳皮 一錢 黨參 五錢 槐花 錢 白蒺子 錢 煙末。

[復元通氣散] 青皮 陳皮 連翹 穿山甲 栀子仁 銀花 甘草。

[溫肺止流丹] 人參 荆芥 細辛 各 詞子 甘草 桔梗 石首魚腦骨（煅研末）

[溫肺湯] 黃耆 丁香 升麻 葛根 甘草 羌活 防風 麻黃。

[雄黃解毒散] 雄黃 寒水石 各二兩 白礬 四兩 共研細末，滾水調敷。

[雄麝散] 雄黃 麝香。

[紫歸油] 紫草 當歸 等分，用麻油熬去渣，候出火氣，以棉蘸潤之。

[紫金錠] 一名紫金丹 二名紫金丹 雄黃 三錢鮮紅大塊者研末 硃砂 三錢研末 麝香 二錢擦淨皮毛研末 川五倍子 二兩一名文始提研末 紅芽大戟 杭州紫大戟爲上江南土大戟次之北方稱大戟色白者性烈利膈人腹之反攻吐血宜之勿用取上品者去蘋根洗淨搗乾爲末一兩五錢 山慈姑 二兩洗去毛皮研末 千金子 一兩一名續隨子仁白者去油 以上諸藥，各擇精品於淨室中製畢，秤準入於大乳鉢內，再研數百轉，方入細石臼中，漸加糯米濃汁，調和軟硬得中，方用杵搗千餘下，極至光潤爲度，每錠一錢，每服一錠，病勢重者連服二錠，以取通利，後用溫粥補之。

治一切飲食藥毒蠱毒，瘴氣惡菌，河豚中毒，自死牛馬豬羊六畜等類之肉，人誤食之，必昏亂卒倒，或生異形之證，並用水磨灌服，或吐或瀉，其人必甦。南方山嵐瘴氣，烟霧癟疫，最能傷人，感之才覺意思不快，惡寒惡熱，欲嘔不嘔，即磨一錠服之，得吐利便癒。癰疽發背，對口疔瘡，天蛇無名腫毒，蛀節紅絲等疔，及楊梅瘡諸風癰瘍，新久痔瘡，並用無灰淡酒磨服，外用水磨塗搽瘡上，日夜數次，覺癢而消。陰陽二毒，傷寒，心悶狂言亂語，胸膈塞滯，邪毒未出，瘡疫煩亂發狂，喉閉喉風，俱用薄荷湯待冷磨服。赤白痢疾，肚腹泄瀉，急痛霍亂絞腸痧及諸痰喘，並用薑湯磨服。男子婦人，急中顛邪，喝叫奔走，鬼交鬼胎，失心狂亂，羊兒豬顛等風，俱用石菖蒲煎湯磨服。中風中氣，口眼歪邪，牙關緊急，言語蹇澀，筋脈攣縮，骨節風腫，遍身疼痛，行步艱辛，諸風諸癇，並用酒磨炖熱服之。自縊溺死，驚死壓死，鬼魅迷死，但心頭微溫未冷者，俱用生薑續斷酒煎磨服。一切惡蛇風犬毒蠍，溪澗諸惡等，蠱傷人隨即發腫，攻注偏身，甚者毒氣入裏，昏悶響叫，命在須臾，俱用酒磨灌下，再喫葱湯一碗，被蓋出汗立甦。新久瘡疾，臨發時水煎桃柳枝湯磨服。小兒急慢驚風，五疳五痢，脾病黃腫，癰瘡瘻瘤，牙關緊急，並用薄荷浸水磨濃，加蜜服之，仍搽腫上，年歲幼者，每錠分作數服。牙痛酒磨塗痛上，仍含少許良久嚥下。小兒父母遺毒，生下百日內皮塌爛斑，穀道眼眶損爛者，俱用清水磨塗。打撲傷損，用松節無灰酒研服。年深月近，頭脹頭痛太陽痛極，偏頭風，及諸瘡癰後，毒氣攻注腦門作脹者，俱用葱酒研服一錠，仍磨塗太陽穴上。婦人經水不通，紅花湯下。凡遇天行疫證，延街闔巷，相傳偏染者，用桃根湯磨濃滴入鼻孔，次服少許，任入病家，再不傳染。又治傳尸勞瘵，諸藥不能取效，每早磨服一錠至二錠，後逐下惡物尸蟲，異形怪類，後得脫然。以此相傳，活人不計其數，一女子久患勞瘵，爲尸蟲所噬，磨服一錠，片時吐下小蟲十餘條，後服蘇合香丸，其病頓失，調理月餘而癒，真濟世衛生之寶藥也。

〔紫雪丹〕 赤芍 石膏 寒水石 磁石 滑石 犀角屑 青木香 沉香 玄參 升麻 甘草 丁香 朴硝 石硝。

〔紫雪散〕 犀角_{一錢} 羚羊角_{一錢} 石膏 寒水石 升麻_{一錢} 元參_{二錢} 甘草_{半錢} 沉香_{半錢} 木香_{五分} 水五碗，煎藥剩湯一碗，將滓用絹濾去，將湯再煎滾，投提掙朴硝三兩六錢，文火慢煎水氣將盡，欲凝結之時，傾入碗內，下硃砂冰片各三錢，金箔一百張，各預研細和勻，將藥碗安入涼水盆中，候冷凝如雪爲度，大人每用一錢，小兒二分，十歲者五分，徐徐嚥之即效，或用淡竹葉燈心煎湯化服亦可，咽侯腫痛等證，吹之亦效。

〔琥珀膏〕 定粉_{二兩} 血餘_{一兩} 輕粉_{一錢} 銀朱_{一錢} 花椒_{十四分} 黃蠟_{四兩} 琥珀_{五分} 麻油_{二兩}

將血餘花椒麻油燂焦，撈去渣，下黃蠟溶化盡，用夏布濾淨，傾入磁碗內，預將定粉銀朱輕粉琥珀四味，各研極細，共合一處，徐徐下入油內，用柳枝不時攬之，以冷為度，用綿燕脂或紅綿紙攤貼。

十三劑

〔榆丁散〕 防風 地榆 紫花地丁 馬齒莧等分 共研細末，每服三錢，溫米湯調下。

〔萬應膏〕 此膏治一切癰疽發背，對口諸瘡痰核流注等毒。

川烏 草烏 生地 白蘚 白芨 象皮 官桂 白芷 當歸 赤芍 羌活 苦參 土木鱉 穿山甲 烏藥 甘草 獨活 元參 定粉 大黃等分 以上十九味，定粉在外，用淨香油五觔，將藥浸入油內，春五夏三，秋七冬十，候日數已足，入潔淨大鍋內，慢火熬至藥枯，浮起為度，住火片時，用布袋濾去渣，將油稱準，每油一觔，對定粉半觔，用桃柳枝不時攬之，以黑如漆，亮如鏡為度，滴入木內成珠，薄紙攤貼。

〔萬靈丹〕 蒼朮等分 全蠍 石斛 當歸 炙甘草 天麻 川芎 羌活 荆芥 防風 麻黃 細辛。

〔當歸四逆湯〕 當歸 桂枝 白芍 細辛 甘草 通草 大棗 水煎服。

〔當歸補血湯〕 當歸 黃耆 水煎服。

〔滋陰除濕湯〕 川芎 當歸 白芍 熟地 柴胡 黃芩 陳皮 知母 貝母 澤瀉 地骨皮 甘草 生薑 水煎 飯前服。

〔解毒消炎丸〕 地丁 腰黃 蠟酥 朱砂 米糊成丸劑 一日三次。

〔解毒濟生湯〕 當歸 遠志等分 川芎 花粉 柴胡 黃芩 犀角等分 麥冬等分 知母 黃柏 茯神 金銀花等分 紅花 牛膝 甘草等分 水二鍾，煎八分，食前服。如生手指間，去牛膝加升麻。

〔解毒膏〕 黃連粉等分 生綠豆粉等分 曬乾研末分藏，臨用水調如泥敷用。

〔解毒活命丹〕 木鱉子（切片） 斑蝥（陳土炒、去頭足） 米（炒）一撮 劉寄奴 大黃 茯苓 麝香 各研細末，和勻。 黃酒調下。 毒氣全解，不必二服。

〔楊梅一劑飲〕 麻黃 威靈仙 大黃 羌活 白芷 皂刺 金銀花 穿山甲 蟬蛻 防風 山羊肉一觔 河水煮熟，取清湯二碗，用黃酒一碗，將藥煎至一碗，令患者空心將羊肉啖食令飽，隨後用藥，蓋被出汗避風。

〔溺白散〕 溺垢即尿桶中自培火燄五錢 白霜梅等分 枯白礬等分 以上研細末，先用韭根松蘿茶，煎成濃汁，乘熱蘸洗患處，去淨腐肉，見津鮮血，再敷此藥。日敷三次，若爛至咽

喉，以蘆筒吹之。

十四 劍

〔碧丹〕 玉丹_{三分} 百草霜_{半錢} 研勻，燈心灰_{一錢} 甘草末_{三錢} 薄荷末_{三分} 冰片_{五厘}，研極細入瓶，勿令泄氣，每用少許吹之，宜臨用配合（最好不出三日），春夏多加薄荷末，秋冬多加玉丹，如欲去痰加製牙皂少許。（附製玉丹法：明礬敲碎如豆大，入銀罐內，木炭火煅頻頻攪之無缺爲度，再用火硝打碎投入十分之三，再用硼砂打碎亦投入十分之三，少頃再投入生礬，再如前投礬、硼，如是漸增待至罐口高度相齊方止，然後加火燒枯，用瓦覆片時，取出用牛黃少許，水和之滴丹上，仍入罐烘乾，連罐瓦覆地上，以紙蓋之，再用瓦覆之七日收用。）

〔碧玉散〕 黃柏末 紅棗肉 燒存性 共研極細末，香油調搽患處，日一~二次。

〔奪命丹〕 輕粉 白砒_{各五分}^{研成灰末} 麝香 白礬_{一錢} 辰砂_{一錢} 血竭_{一錢} 雄黃_{二錢} 蟲酥_{一錢}^{研成黃色} 乳香 没藥 寒水石_{各一錢} 銅綠_{二錢} 蝎牛_{半兩}^{研成黃色} 以上爲細末，先將蝎牛研爛如泥，匀合前藥，丸如不成，加好黃酒少許，打三五百下爲丸，如綠豆大，每服二三丸，先用葱白一寸，令病者嚼爛，自吐於手心內，男用左手用右手，將藥丸裹入葱泥內，用無灰酒一大鍾，溫熱送下，被蓋汗出爲度，重者不過三服，不可多用。

〔蜈蚣餳〕 蜈蚣 甘草 獨活 白芷_{各一錢} 桐油二兩，將藥煎滾，先以米泔水洗淨臙瘡，水和白麵作圈，圍在瘡之四邊，勿令洩氣，將腿放平，以茶匙桃油，漸漸乘熱加滿，待油溫取下，以後風毒自散，腐肉漸脫，甚功甚速。

〔蜈蚣星風散〕 蜈蚣_{一錢} 江蠶_{三分} 南星 防風_{各二錢} 共研細末，每用二錢，黃酒調服，一日二服。

〔鳳衣散〕 凤凰衣_{一錢}^{研成黃色} 輕粉_{四分} 冰片_{二分} 黃丹_{二錢} 共研細末，鴨蛋清調敷，或乾撒亦可。

〔銀翹散〕 連翹 銀花 桔梗 薄荷 竹葉 甘草 荆芥 豆鼓 牛蒡 蘆根。

〔銀花解毒湯〕 金銀花 地丁草 犀角 赤茯苓 連翹 丹皮 川連 夏枯草。

〔滲濕救苦散〕 密陀僧 滑石_{各二錢} 白芷_{五錢} 共研細末，乾用白蜜調搽，濕則乾撒。

〔鼻衄特效方〕 蒲黃 血竭 各等份共研末如粉，吹于鼻竅，或撒于棉片，紗條上，貼壓于出血處。

〔蒼耳散〕 蒼耳子 辛夷 白芷 薄荷。

〔蒼耳膏〕 蒼耳_{三七克}^{研成黃色} 切碎，入大鍋內煮爛，取汁絞濾過，再熬成膏，磁罐盛之，用時似桑木匙桃一匙，噙口內用黃酒送下，服後有風處，必出小瘡如豆粒大

，此風毒出也，刺破出汁盡即愈，忌豬肉。

〔蒼朮膏〕 南蒼朮十錢切片入砂鍋內水煮減半取汁再加水煮如前以東無珠爲度，每服二羹匙，空心白滾水調服。

〔潤喉湯〕 熟地、麥冬各二錢 米仁五錢 桑白皮、生地各三錢 山茱萸四錢 貝母 甘草各二錢 煎服十劑許，痛癢均除，再加肉桂一錢，空腹煎服，以善其後。

〔潤腸湯〕 當歸梢 甘草 生地 麻仁 桃仁泥 水煎服。

十五 劍

〔增液湯〕 玄參 蓼心 麥冬 細生地 水煎服。

〔增液解毒湯〕 生地 元參 麥冬 石斛 沙參 丹參 赤芍 天花粉 銀花連翹 龜甲 龜板 甘草。

〔廣筆鼠黏湯〕 生地黃 漢貝母各三錢 去心研 元參 甘草各二錢 素炒 鼠黏子炒 花粉 射干連翹各三錢 白僵蠶炒 苦竹葉二十片，水二鍾，煎八分，饑時服。

〔醉仙散〕 牛蒡子炒 胡麻 枸杞子 蔓荆子各一錢 苦參 白蒺藜 防風 花粉各五錢 共研細末，每一服錢，加輕粉一分三厘，研勻，茶清調服，晨午晚各一服，六七日後，先於牙縫內出臭黃涎，渾身疼悶如醉，然後利下膿血惡物臭氣，病根乃去矣。

〔導赤散〕 木通 生甘草梢 淡竹葉 生地 水煎服。

〔調胃承氣湯〕 大黃四錢酒浸 芒硝二錢 甘草二錢 水三鍾，煎一鍾，去渣少少溫服。

十六 劍

〔磨風丸〕 猪苓草 牛蒡子炒 麻黃 蒼耳草 細辛 川芎 當歸 荆芥 蔓荆子 防風 車前。

〔獨活散〕 獨活 羌活 防風 川芎各二錢 薄荷 生地 荆芥各一錢 細辛各二錢 以上爲粗末，每用二錢，水煎澄渣，食後服，日用三服。

〔獨活散〕 獨活、防風、蒼朮、黃柏、當歸、秦艽、防己、草薢、赤芍、川牛膝。

〔獨活寄生湯〕 獨活二錢 茯苓 川芎 當歸 防風 白芍 細辛 人參 桂心 杜仲 秦艽 牛膝 熟地各二錢 甘草各一錢 水二茶鍾煎八分食前服。治肝腎虛弱，風濕內攻，足脛緩縱，或膝痺攣重。

〔獨參湯〕 此湯治潰瘍膿水出多，元氣虛餒，外無邪氣，自汗、脈虛者。人參二錢只一味水二鍾棗十枚或蓮肉元眼肉，煎好徐徐服之，若煎至稠厚，即成膏矣，作三次用醇酒熱化服之亦可。

十七 劍

〔燉峒丸〕 三七 生大黃 阿魏 孩兒茶 天竹黃 血竭 乳香 没藥各二錢 雄黃二錢 山羊血五錢無者者子羊冰片 霽香 牛黃各二錢五分以上 各研細末 藤黃二兩以秋荷葉露泡之隔過黃十錢 次去浮沉取中將山羊血拌入覆乾 取秋露水化

藤黃，拌藥搗千餘下，如乾加煉蜜少許爲丸，重一錢，黃蠟封固，每用一丸，黃酒化服，外敷亦用黃酒磨塗。

[薏苡附子敗醬散] 附子三分 敗醬二錢 薏苡仁四錢 以上爲末，每服方寸七，以水二合煎，頓服，小水當下，三因云，薏苡附子同前敗醬，用一兩一分，每四錢，水盡半，煎七分，去渣空心服。

[營衛返魂湯] 當歸 何首烏 木通 赤芍 白芷 苜香 烏藥 枳殼 甘草。

十八 劍

[瀉熱湯] 黃連 黃芩 歸尾 連翹 木通 甘草。

[離宮錠子] 此錠子治療毒腫毒，一切皮肉不變，漫腫無頭，外搽之。

血竭三錢 硃砂二錢 膽礬一錢 京墨一錢 蟾酥五分 麝香五分 以上六味爲末，涼水調成錠，涼水磨濃塗之。

[歸芍異功湯] 人參 白朮半錢 廣陳皮 白芍酒炒 當歸身一錢 白茯苓五錢 甘草五分 燈心半錢 水煎空心服。

[雙砂湯] 砂仁 草果 威靈仙各等分 加砂糖少許煎服。

[雙解貴金丸] 大黃 白芷。

[雙解通聖散] 防風 荆芥 當歸 白芍酒炒 連翹去心 白朮半錢 川芎 薄荷 麻黃 梓子五錢 黃芩 石膏煅 桔梗一錢 甘草三錢 滑石一錢 共研粗末，每用五錢，水一鍾半，煎八分，澄渣溫服。

[鎖匙散] 冰片 煅焰硝 研細末，搽患處。

[雞子大黃丸] 錦文大黃 一兩 雞子黃 七枚 搗丸 分三、四次服用。

十九 劍

[類聚祛風散] 硫黃 寒水石 枯白礬 貢衆各一錢 蛇床子二錢 朴硝一錢 共研細末，豬脂搗爛調敷。

[藍葉散] 藍葉一錢 川芎 知母 生地 白芷 川升麻 柴胡 葛根 杏仁去皮尖 甘草各一錢 石膏煅 梓子仁五錢 共搗粗末，每用八錢，新汲水二鍾，煎八分去渣服。熱甚加黃芩元參。

[顛倒散] 大黃 硫黃 各等份，將上藥研細末，茶水調搽；紫白癩風用醋調搽。

二十 劍

[蠟礬丸] 黃蠟 白礬 雄黃，琥珀 硃砂 白蜜。

[礬精散] 白礬（不拘多少研末，用方磚一塊，以火燒紅，灑水於磚上，將礬末布於磚上，以磁盤覆蓋，四面灰攤一日夜，礬飛盤上掃下用）二錢 白霜梅（去核

)二個 真明雄黃 穿山甲(炙)各一錢 共研細末，以細筆管吹入喉內。

[蘆薈散] 蘆薈_{五錢} 黃柏_{五錢} 人言_{五分用紅棗五枚每膏去核每膏納入一百分火燒存性} 共研細末，先用米泔水漱淨瘡毒，後敷此藥於堅硬及腐處。

[蘆薈丸] 蘆薈 子青皮 白雷丸 白蕪荑 川黃連 胡黃連 鶴虱草 木香麝香 共研末，蒸餅糊丸如麻子大，每服一錢，空心清米湯送下。

[蘆柏地黃丸] 即六味地黃丸加蘆薈五錢，蜜炒黃柏一兩。

二十一割

[顧步湯] 黃耆 石斛 當歸 牛膝 紫花地丁 人參 甘草 銀花 蒲公英 菊花 水煎服。口渴者加天花粉。

[護面散] 女人頭髮 蝦存性 明雄黃 各三分 共研細，香油半酒鍾調勻，滾黃酒沖服，一日三服。

索引

一割

- 一掃光 243
一貫煎 243

二割

- 二妙丸 243
二參湯 243
二子消毒散 243
二冬散 243
二陳湯 243
人參敗毒散 243
人參茯苓粥 243
九味敗毒湯 243
七味地黃丸 243
八寶珍珠散 243
八將丹 243
八味丸 243
八寶生肌丹 243

三割

- 小柴胡湯 244
小薊散 244
千金葦莖湯 244
千搘膏 244
千里奔散 244
山甲內消散 244
川歸止血丸 244
三神丸

- 三油膏 244
三妙散 244

- 三因安腎丸 244
大補陰丸 244
大承氣湯 244
大薑散 244
大黃丹皮湯 244

四割

- 六味地黃丸 244
六君子湯 244
化毒除濕湯 244
化疔丹 244
化癬丹 245
內補十宣散 245
內疏黃連湯 245
升麻消毒飲 245
升陽散火湯 245
五香連翹湯 245
五味消毒飲 245
五虎丹 245
五香丸 245
五神湯 245
五寶丹 245
牛蒡解肌湯 245
牛黃清心丸 245
牛黃散 245

| | | | |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 水金散 | 245 | 合掌散 | 247 |
| 丹皮湯 | 245 | 地黃飲 | 247 |
| 五劑 | | 安宮牛黃丸 | 247 |
| 四君子湯 | 245 | 竹葉石膏湯 | 247 |
| 四黃散 | 246 | 存命湯 | 247 |
| 四妙勇安湯 | 246 | 托裡散 | 247 |
| 四物湯 | 246 | 托裡透膿湯 | 247 |
| 四妙丸 | 246 | 七劑 | |
| 四物消風飲 | 246 | 如意金黃散 | 248 |
| 必效散 | 246 | 如聖金刀散 | 248 |
| 生肌白玉膏 | 246 | 扶危散 | 248 |
| 生脈散 | 246 | 旱螺散 | 248 |
| 左歸丸 | 246 | 何首烏酒 | 248 |
| 甘露飲 | 246 | 防風當歸散 | 248 |
| 甘麥大棗湯 | 246 | 防已散 | 248 |
| 甘露消毒丹 | 246 | 夾紙膏 | 248 |
| 平肝鎮心丹 | 246 | 赤霜散 | 248 |
| 白膏藥 | 246 | 沖和膏 | 248 |
| 白虎熄風湯 | 246 | 角刺粥 | 249 |
| 白虎湯 | 246 | 沙參清肺飲 | 249 |
| 田螺水 | 246 | 辛夷清肺飲 | 249 |
| 本事利膈湯 | 247 | 八劑 | |
| 加味甘桔湯 | 247 | 承氣湯 | 249 |
| 仙遺糧湯 | 247 | 季芝鯽魚膏 | 249 |
| 六劑 | | 青蛤散 | 249 |
| 回春脫疳散 | 247 | 青蓮膏 | 249 |
| 冰硼散 | 247 | 拔疔毒丸 | 249 |
| 至寶丹 | 247 | 拔疔散 | 249 |
| 羊蹄根散 | 247 | 拔疔散(外用) | 249 |
| 江蠶丸 | 247 | 虎潛丸 | 249 |

| | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 陀僧膏 | 249 | 栝石湯 | 251 |
| 陀僧散 | 249 | 栝蔞牛蒡湯 | 251 |
| 肥油膏 | 249 | 臭靈丹 | 251 |
| 枇杷清肺飲 | 250 | 時珍正容散 | 251 |
| 枇杷葉丸 | 250 | 浮萍丸 | 251 |
| 知柏地黃湯 | 250 | 射干麻黃湯 | 252 |
| 金黃散(即如意金黃散) | 250 | 真武湯 | 252 |
| 金鈴子散 | 250 | 秦艽丸 | 252 |
| 羌麻湯 | 250 | 秦艽鼈甲散 | 252 |
| 羌活勝濕湯 | 250 | 益胃湯 | 252 |
| | | 柴胡疏肝飲 | 252 |
| 九 劑 | | 柴胡清肝湯 | 252 |
| 枯痔散 | 250 | 柴胡地骨皮湯 | 252 |
| 拘橋湯 | 250 | 海桐皮湯 | 252 |
| 胡桐淚散 | 250 | 桂附八味丸 | 252 |
| 祛風換肌丸 | 250 | 桂枝加當歸湯 | 252 |
| 祛濕消邪湯 | 250 | 烏藥順氣散 | 252 |
| 祛風地黃丸 | 250 | 烏辛散 | 252 |
| 追風散 | 250 | 烏賊骨散 | 252 |
| 保和丸 | 251 | 消毒神聖湯 | 252 |
| 紅花散瘀湯 | 251 | 消癩丸 | 252 |
| 紅油 | 251 | 消痔止痛方 | 252 |
| 紅靈丹 | 251 | 消腫膏 | 252 |
| 柳花散 | 251 | 消風導赤湯 | 252 |
| 芩桂朮甘湯 | 251 | 神效瓜萎散 | 253 |
| 香貝養榮湯 | 251 | 神應消風散 | 253 |
| 活血補中湯 | 251 | 通竅活血湯 | 253 |
| 草龍膽散 | 251 | 通聖消毒散 | 253 |
| | | 逍遙散 | 253 |
| 十 劑 | | | |
| 桑菊飲 | 251 | 十一 劑 | |
| 荆防敗毒散 | 251 | 參附龍牡救逆湯 | 253 |

| | | | |
|------------|-----|------------|-----|
| 參附湯 | 253 | 黃連膏 | 255 |
| 參麥散 | 253 | 黃連消毒飲 | 255 |
| 參苓白朮散 | 253 | 黃連解毒湯 | 255 |
| 脫痔膏 | 253 | 散風苦參丸 | 255 |
| 理中湯 | 253 | 貴金丸 | 255 |
| 勒馬聽微絲 | 253 | 黑花蛇散 | 255 |
| 梔子丸 | 253 | 換肌散 | 255 |
| 麻黃一劑飲 | 253 | 搜風解毒湯 | 256 |
| 麻黃宣肺酒 | 253 | 犀角升麻湯 | 256 |
| 紺珠膏 | 253 | 犀角升麻丸 | 256 |
| 清胃湯 | 254 | 犀角飲子 | 256 |
| 清骨散 | 254 | 草薢化毒湯 | 256 |
| 清瘟敗毒飲 | 254 | 草薢滲濕湯 | 256 |
| 清營湯 | 254 | 腋香散 | 256 |
| 清燥救肺湯 | 254 | 補腎湯 | 256 |
| 清涼露 | 254 | 補氣瀉榮湯 | 256 |
| 清涼飲 | 254 | 補中槐莢湯 | 256 |
| 清涼散 | 254 | 復元通氣散 | 256 |
| 清脾除濕飲 | 254 | 溫肺止流丹 | 256 |
| 清涼膏 | 254 | 溫肺湯 | 256 |
| 涼血四物湯 | 254 | 雄黃解毒散 | 256 |
| 掃風丸 | 254 | 雄麝散 | 256 |
| 蛇藥片 | 254 | 紫歸油 | 256 |
| 蛇床子散 | 254 | 紫金錠 | 256 |
| 陽和湯 | 254 | 紫雪丹 | 257 |
| 陽和解凝膏 | 254 | 紫雪散 | 257 |
| 掃雪散 | 255 | 琥珀膏 | 257 |
| 華佗累效散 | 255 | | |
| 十二劑 | | 十三劑 | |
| 黃耆內托散 | 255 | 欒丁散 | 258 |
| 黃蠟膏 | 255 | 萬應膏 | 258 |
| | | 萬靈丹 | 258 |

| | | | |
|------------|-----|------------|-----|
| 當歸四逆湯 | 258 | 導赤散 | 260 |
| 當歸補血湯 | 258 | 調胃承氣湯 | 260 |
| 滋陰除濕湯 | 258 | | |
| 解毒消炎丸 | 258 | 十六劑 | |
| 解毒濟生湯 | 258 | 磨風丸 | 260 |
| 解毒膏 | 258 | 獨活散 | 260 |
| 解毒活命丹 | 258 | 獨活湯 | 260 |
| 楊梅一劑飲 | 258 | 獨活寄生湯 | 260 |
| 溺白散 | 258 | 獨參湯 | 260 |
| 十四劑 | | 十七劑 | |
| 碧丹 | 259 | 礞峒丸 | 260 |
| 碧玉散 | 259 | 薏苡附子敗醬散 | 261 |
| 奪命丹 | 259 | 營衛返魂湯 | 261 |
| 蜈蚣餸 | 259 | | |
| 蜈蚣星風散 | 259 | 十八劑 | |
| 鳳衣散 | 259 | 瀉熱湯 | 261 |
| 銀翹散 | 259 | 離宮錠子 | 261 |
| 銀花解毒湯 | 259 | 歸芍異功湯 | 261 |
| 滲濕救苦散 | 259 | 雙砂湯 | 261 |
| 鼻衄特效方 | 259 | 雙解貴金丸 | 261 |
| 蒼耳散 | 259 | 雙解通聖散 | 261 |
| 蒼耳膏 | 259 | 鎖匙散 | 261 |
| 蒼朮膏 | 260 | 雞子大黃丸 | 261 |
| 潤喉湯 | 260 | | |
| 潤腸湯 | 260 | 十九劑 | |
| | | 類聚祛風散 | 261 |
| 十五劑 | | 藍葉散 | 261 |
| 增液湯 | 260 | 顛倒散 | 261 |
| 增液解毒湯 | 260 | | |
| 廣筆鼠黏湯 | 260 | 二十劑 | |
| 醉仙散 | 260 | 蠟燭丸 | 261 |

| | |
|-------|-----|
| 攀精散 | 261 |
| 蘆薈散 | 262 |
| 蘆薈丸 | 262 |
| 蘆柏地黃丸 | 262 |

二十一劑

| | |
|-----|-----|
| 顏步湯 | 262 |
| 護面散 | 262 |

國立中央圖書館出版品預行編目資料

外科正宗新解／朱士宗編著。—初版。—臺北縣
新店市：中醫研所，民83
面： 公分。—（中國古典醫籍新解叢書）
ISBN 957-00-3503-X（精裝）

1. 外科（中醫）

413.4

83002765

外科正宗新解

編著者：朱士宗

發行人：陳介甫

出版者：國立中國醫藥研究所

所址：台北縣新店市北宜路二段391巷2號

電話：(02)217-2990

定 價：精裝新台幣陸佰元整

郵政劃撥：0001606-0

印 刷 者：三聯彩色印刷有限公司

地址：台北市木柵路一段238巷24號

電話：(02)9369184・9363151

中華民國八十三年四月初版

ISBN 957-00-3503-X（精裝）